

فهرست مطالب

فصل سوم: تابع (پایه یازدهم)

۱۱۳ قسمت اول: توابع ثابت، چند ضابطه‌ای و همانی

۱۲۷ قسمت دوم: توابع پلکانی و قدرمطلقی

۱۴۲ قسمت سوم: اعمال روی توابع

فصل چهارم: کار با داده‌های آماری

۱۶۰ قسمت اول: گردآوری داده‌ها، انواع متغیرها

۱۶۸ قسمت دوم: معیارهای گرایش به مرکز (حدوسط)

۱۷۸ قسمت سوم: معیارهای (شاخص‌های) پراکندگی

فصل پنجم: نمایش داده‌ها

۱۹۱ قسمت اول: نمودارهای تک متغیره

۲۰۲ قسمت دوم: نمودارهای چند متغیره

فصل ششم: آمار

۲۰۸ قسمت اول: شاخص‌های آماری

۲۲۰ قسمت دوم: سری‌های زمانی

فصل صفرم

۸ یادآوری اتحادها، تجزیه و عبارت‌های گویا

۲۵ قسمت اول: معادله درجه دوم

۳۰ قسمت اول: معادله درجه اول و روش‌های حل آن

۴۶ قسمت سوم: کاربردهای معادله درجه دوم

۵۵ قسمت چهارم: معادله‌های شامل عبارت‌های گویا

فصل دوم: تابع (پایه دهم)

۶۲ قسمت اول: مفهوم رابطه و روش‌های نمایش آن

۶۶ قسمت دوم: مفهوم تابع و روش‌های نمایش آن

۷۵ قسمت سوم: مقدار تابع در یک نقطه، دامنه و بُعد تابع

۸۳ قسمت چهارم: توابع خطی و کاربرد آن‌ها در حل مسائل

۹۷ قسمت پنجم: سه‌می (نمودار تابع درجه دوم)

فهرست مطالب

فصل دهم: الگوهای غیرخطی	فصل هفتم: آشنایی با منطق و استدلال ریاضی
۳۴۶ قسمت اول: دنباله هندسی	۲۲۸ قسمت اول: گزاره ها، منطق ریاضی
۳۶۴ قسمت دوم: ریشه آم و توان های گویا	۲۳۳ قسمت دوم: ترکیب عطفی و فصلی
۳۷۷ قسمت سوم: تابع توابی	۲۴۲ قسمت سوم: گزاره های شرطی و دوشرطی
۳۸۵ آزمون های جامع	۲۵۴ قسمت چهارم: استدلال های ریاضی
۴۰۳ پاسخ نامه تشریحی	فصل هشتم: آمار و احتمال
۵۸۵ آزمون نوبت اول ۱۴۰۲	۲۶۳ قسمت اول: اصول شمارش
	۲۷۳ قسمت دوم: تبدیل، ترکیب
	۲۸۰ قسمت سوم: احتمال (۱)
	۲۹۹ قسمت چهارم: احتمال (۲)
	۳۰۵ قسمت پنجم: چرخه آمار در حل مسائل
	فصل نهم: الگوهای خطی
	۳۱۸ قسمت اول: مدل سازی و دنباله
	۳۲۹ قسمت دوم: دنباله حسابی (عددی)



درستامه و تست

فصل صفر

یادآوری اتحادها، تجزیه و عبارت‌های گویا

قبل از این‌که درس رو شروع کنم دوس دارم یه سلام و احوالپرسی کنم باهاتون. سلام، خوبین داشجوهای آینده؟ آقایان و خانم‌های رشته انسانی، همین شروع کتاب، دوس دارم برآتون آزو کنم که هم تو مسائل درسی هم غیردرسی، به هر چی که خوبه برسید. شما در سال‌های قبل با مفهوم عبارت جبری و اتحاد و تجزیه آشنایی داشتید پس فقط می‌خواهیم این مباحث را یادآوری کنیم برآتون. دوستان خوبم، خواهشان فرمول اتحادها رو حتماً حفظ کنید چون تا آخر کتاب باهاشون سروکار داریم. اینقدر که اسم اتحادها توی ریاضی میاد اسم فروید توی روانشناسی نمیاد! این فصل به طور غیرمستقیم در تمام کتاب، کاربرد دارد.

برای مشاهده فلم آموزش
این درس QR-code
را اسکن کنید.

انواع اتحادهای جبری مشهور

۱ اتحادهای مربع دوجمله‌ای: در این اتحادها دو جمله‌ای‌های $a + b$ و $a - b$ به توان ۲ می‌رسند. $a - b$ را جمله اول و b را جمله دوم می‌نامیم:

$$(a \oplus b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{مثال: } (\frac{m}{3} - \frac{6z}{3})^2 = (\frac{m}{3})^2 - 2(\frac{m}{3})(6z) + (6z)^2 = \frac{m^2}{9} - 4mz + 36z^2$$

دو برابر اولی در دومی
اولی به توان ۲
دو می به توان ۲
↓ a ↓ b

$$(a \ominus b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{مثال: } (\frac{m}{3} + \frac{6z}{3})^2 = (\frac{m}{3})^2 + 2(\frac{m}{3})(6z) + (6z)^2 = \frac{m^2}{9} + 4mz + 36z^2$$

یه لحظه به من توجه کن! در محاسبه $(\frac{m}{3})^2$ دقت کنید که توان ۲ هم برای m است و هم برای 3 ، یعنی: $(\frac{m}{3})^2 = \frac{m^2}{3^2} = \frac{m^2}{9}$ ابتدا به عددها توجه کنید، یعنی اول عدد 6 را با عدد 3 ساده می‌کنیم که جوابش برابر 2 می‌شود. حالا 2 به دست آمده را در 2 سمت چپ ضرب می‌کنیم: $2(\frac{m}{3})(\frac{6z}{3}) = 4mz$ در محاسبه $(6z)^2$ هم باید دقت کنید که توان ۲ هم برای 6 است، هم برای z : $(6z)^2 = 6^2 \times z^2 = 36z^2$

مثال: حاصل $(1 - \sqrt{2})^2 + (1 + \sqrt{2})^2$ را به دست آورید.

پاسخ: به کمک اتحادهای مربع دوجمله‌ای حاصل هر کدام از عبارت‌های $(1 + \sqrt{2})^2$ و $(1 - \sqrt{2})^2$ را حساب کرده، جوابها را با هم جمع می‌کنیم:

$$(1 + \sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{2})^2 = [1^2 + 2(1)(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2] + [1^2 - 2(1)(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2] = 1 + 2\sqrt{2} + 2 + 1 - 2\sqrt{2} + 2 = 6$$

تست: اگر $x - y = 3$ باشد، حاصل $x^2 + y^2$ کدام است؟

۲۴

۲۰

۱۷

۱۴

پاسخ: مقدار $y - x$ به ماداده شده ولی مقدار $x^2 + y^2$ را باید به دست آوریم، در این جور سوالات، باید خودمان دو طرف رابطه داده شده را به توان ۲ برسانیم: $x - y = 3 \rightarrow (x - y)^2 = 3^2$ سمت چپ رو به کمک اتحاد دوم باز کن دوطرف رو به توان ۲ برسون

$$x^2 - 2xy + y^2 = 9$$

به جای $y \cdot X$. مقدارش رو
که در متن سوال داده شده بذار

$$x^2 - 8 + y^2 = 9 \rightarrow x^2 + y^2 = 9 + 8 \Rightarrow x^2 + y^2 = 17 \Rightarrow \text{گزینه (۲) صحیح است.}$$

عدد - رو به راست ببر
چون $x^2 + y^2$ رو میخوایم

تست: اگر $x^2 + \frac{1}{x^2}$ باشد، حاصل کدام است؟

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

 پاسخ:

$$\begin{aligned} x + \frac{1}{x} = 4 &\xrightarrow[\text{برسون}]{\text{دو طرف را به توان ۲ برسون}} \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 4^2 \\ \Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 &= 16 \xrightarrow[\text{عدد ۲ را بر سمت راست}]{\text{گزینه (۳) صحیح است.}} x^2 + \frac{1}{x^2} + 2(x)\left(\frac{1}{x}\right) = 16 \end{aligned}$$

۲ اتحاد مزدوج: در این اتحاد، دو پرانتز به شکل $(a+b)$ و $(a-b)$ در هم ضرب می‌شوند، در این حالت خیلی سریع می‌گوییم جواب برابر می‌شود با $a^2 - b^2$.

به عبارت دیگر در این اتحاد، جملاتی مانند a و b عیناً در دو پرانتز تکرار می‌شوند. فقط در یکی از پرانتزها علامت بین a و b مثبت و در پرانتز دیگر علامت بین a و b منفی است.

$$\begin{aligned} (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 \\ &\xrightarrow{\text{مثال}} (\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = \sqrt{5}^2 - \sqrt{2}^2 = 5 - 2 = 3 \\ &\xrightarrow{\text{مثال}} \left(\frac{x}{2} - \frac{y}{5}\right)\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{5}\right) = \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \left(\frac{y}{5}\right)^2 = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{25} \end{aligned}$$

تست: حاصل عبارت $(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$ به ازای $x=\sqrt{2}$ چقدر است؟

۱

-1

 $\sqrt{2}-1$ $\sqrt{2}+1$

پاسخ: اگر همین الان به جای x ها $\sqrt{2}$ را قرار دهیم، محاسبات پیچیده‌ای خواهیم داشت، پس ابتدا پرانتزهای اول و آخر را در کنار هم می‌نویسیم و به کم اتحاد مزدوج حاصل ضرب آن‌ها را محاسبه می‌کنیم:

$$A = \underbrace{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}}(x+1) = ((\sqrt{x})^2 - 1^2)(x+1) = \underbrace{(x-1)(x+1)}_{\text{اتحاد مزدوج}} = x^2 - 1$$

$$\xrightarrow[\text{عدد } \sqrt{2} \text{ را بنار}]{\text{حالا به جای }} A = (\sqrt{2})^2 - 1 = 2 - 1 = 1 = 1 \xrightarrow{\text{گزینه (۴) صحیح است.}}$$

تست: حاصل عبارت $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})(a^2 + b^2)$ کدام است؟

 $a^2 - b^2$ $a^2 - b^2$ $a^2 - b^2$ $a^2 - b^2$

پاسخ: ابتدا حاصل ضرب دو پرانتز سمت چپ را حساب می‌کنیم:

$$(\underbrace{\sqrt{a} - \sqrt{b}}_{\text{اتحاد مزدوج}})(\underbrace{\sqrt{a} + \sqrt{b}}_{\text{اتحاد مزدوج}}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$$

حالا حاصل ضرب عبارت $b-a$ را در $a+b$ به دست می‌آوریم:

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

دوباره اتحاد مزدوج

و در نهایت، عبارت $a^2 - b^2 + a^2$ را در $a^2 - b^2$ ضرب می‌کنیم:

$$\underbrace{(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)}_{\text{باز هم، اتحاد مزدوج}} = (a^2)^2 - (b^2)^2 = a^4 - b^4 \xrightarrow{\text{گزینه (۴) درست است.}} a^4 - b^4$$

یه لحظه به من توجه کن! انسانی‌ها، در مبحث اتحادها، نیازی به حفظ فرمول اتحاد جمله مشترک نیست (ذیال علتش نباشین لطفاً) بلکه فقط در تجزیه که کمی جلوتر آموزش می‌دهیم به این اتحاد نیاز داریم پس فعلاً فراموشش کنید و اگر دو پرانتز دیدید که یک عبارت در آن‌ها تکرار شده، پرانتزها را به شکل معمولی در هم ضرب کنید؛ مثلاً

$$(6x+2)(6x-3) = 36x^2 - 18x + 12x - 6 = 36x^2 - 6x - 6$$

مفهوم تجزیه

اگر یک عبارت جبری را بتوانیم به صورت حاصل ضرب دو یا چند عبارت دیگر (با توان کمتر ممکن) بنویسیم، می‌گوییم آن عبارت را تجزیه کردادیم، این عمل را تا جایی ادامه می‌دهیم که دیگر نتوان عبارتها را تجزیه کرد. به هر کدام از عبارتهای جبری به دست آمده از تجزیه، یک عامل اول می‌گوییم. مثلاً عبارت $x^6 - x^3$ را به شکل $(x+4)(x-4)$ تجزیه می‌کنیم (نموده گفته روش تجزیه می‌شود) یعنی در ابتدا توان x برابر ۲ بود ولی بعد از تجزیه، توان x در هر کدام از پرانتزها برابر ۱ شد، یعنی با تجزیه، توان x کوچک‌تر می‌شود. هر عبارت جبری به عامل‌هاییش بخش‌پذیر است. مثلاً وقتی عبارت $6x^5 - 5x^3$ را به صورت $(x+1)(x-6)$ تجزیه می‌کنیم، $(x+1)$ و $(x-6)$ هر دو، عوامل اول عبارت اصلی هستند و ضمناً عبارت اصلی یعنی $6x^5 - 5x^3$ هم بر $x+1$ و هم بر $x-6$ بخش‌پذیر است.

روش‌های تجزیه یک عبارت جبری

۱ فاکتوری: در این روش از عوامل مشترک با توان کوچک‌تر، فاکتور می‌گیریم. اول به عده‌ها نگاه می‌کنیم. عدد ۱۰ بر ۵ بخش‌پذیر است پس از ۵ فاکتور می‌گیریم. حالا به متغیرها توجه می‌کنیم بین x^3 و x^5 باید از x^3 فاکتور بگیریم چون توانش کوچک‌تر است پس در کل $5x^3 - 10x^5 = 5x^3(x - \dots)$ فاکتور می‌گیریم:

حالا می‌خواهیم جملات داخل پرانتز را بسازیم. $5x^3$ چطوری به $5x^3$ تبدیل می‌شود؟ باید در x ضرب شود، همچنین برای تبدیل $5x^5$ به $5x^3$ باید $5x^3 - 10x^5 = 5x^3(x - 2)$ را در ۲ ضرب کنیم. پس جملات داخلی پرانتز هم به دست آمدند:

به لحظه به من توجه کن! گاهی باید از یک پرانتز هم فاکتور بگیریم پس لطفاً وحشت نکنید به عبارت زیر توجه کنید:

$$12x^3y(x-y)^4 - 7xy^3(x-y)^3$$

۷ و ۱۲ عامل مشترکی ندارند، از بین x^3 و x باید از x ، از بین y و y^3 باید از y و از بین $(x-y)^4$ و $(x-y)^3$ باید از $(x-y)$ فاکتور بگیریم، پس در $xy(x-y)^3(12x(x-y) - 7y) = xy(x-y)^3(12x^3 - 12xy - 7y)$ عبارت بالا کل، از $(x-y)$ فاکتور می‌گیریم:

مثال: عبارت‌های زیر را تجزیه کنید.

$$2xy^3 - 6x^3y^2z^2 \quad \text{پ} \quad (a+b)^3 - 2(a+b) \quad \text{۱}$$

$$12x^4(x^2 - 5)^2 + 3x^3(x^2 - 5)^3 \quad \text{ت} \quad 15y(x-y)^3 - 18x^3(x-y)^2 \quad \text{پ} \quad \text{۲}$$

$$(a+b)^3 - 2(a+b) = (a+b)(a+b-2)$$

پاسخ: ۱ از $(a+b)$ فاکتور می‌گیریم:

$$2xy^3 - 6x^3y^2z^2 = 2xy^3(y - 3xz^2)$$

پاسخ: ۲ از $2xy^3$ فاکتور می‌گیریم:

دقیق: دقت کنید که ۱۸ و ۱۵ هر دو به ۳ بخش‌پذیرند پس خواهیم داشت:

$$15y(x-y)^3 - 18x^3(x-y)^2 = 3(x-y)^2[5y(x-y) - 6x^2] = 3(x-y)^2[5yx - 5y^2 - 6x^2]$$

۳

$$12x^4(x^2 - 5)^2 + 3x^3(x^2 - 5)^3 = 3x^3(x^2 - 5)^2[4x + (x^2 - 5)]$$

تست: عبارت جبری $10x^2z^2 - 15xy^3$ بر کدام عبارت، بخش‌پذیر است؟

$$2z^2 - 3y^3 \quad \text{۲}$$

$$5x^2 \quad \text{۳}$$

$$15x \quad \text{۴}$$

$$5x \quad \text{۱}$$

پاسخ: ۱۵ و ۱۰ هر دو بر ۵ بخش‌پذیرند. ضمناً x^2 و x^3 مشاهده می‌کنیم که باید از x فاکتور بگیریم چون توانش کوچک‌تر است.

$$\frac{\text{فاکتور از } 10x^2z^2 - 15xy^3}{5x(2xz^2 - 3y^3)} = \text{گزینه (۱) صحیح است.} \Rightarrow$$

تست: در تجزیه $(x^2 + 3)^3 - 10x^3(x^2 + 3)^2 - 20x^5$ کدام عامل وجود ندارد؟

$$x^2 - 3 \quad \text{۲}$$

$$x^2 + 3 \quad \text{۳}$$

$$x^2 + 3 \quad \text{۴}$$

$$10x^3 \quad \text{۱}$$

$$20x^5(x^2 + 3)^3 - 10x^3(x^2 + 3)^2 = 10x^3(x^2 + 3)^2 \underbrace{[2x^2 - (x^2 + 3)]}_{2x^2 - x^2 - 3} = 10x^3(x^2 + 3)^2(x^2 - 3)$$

پاسخ:

مالحظه می‌کنید که عبارت تجزیه شده بالا شامل $(x^2 + 3)^2$ نیست، پس جواب گزینه (۲) است.

۱ استفاده از اتحادها: در این روش از اتحادها برای تجزیه کردن کمک می‌گیریم.

۲ تجزیه از طریق اتحاد مربع دوچمله‌ای: اگر یک عبارت سه تا جمله داشت و دلتای آن، صفر شد ($\Delta = b^2 - 4ac = 0$) قطعاً می‌توانیم از اتحادهای اول یا دوم برای تجزیه آن استفاده کنیم.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \Rightarrow \text{تجزیه به کمک اتحاد اول}$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \Rightarrow \text{تجزیه به کمک اتحاد دوم}$$

به عبارت دیگر در مبحث اتحادها در متن سؤال، عبارت $(a+b)^2$ یا $(a-b)^2$ داده می‌شد و ما می‌گفتیم جواب‌هایشان می‌شود $a^2 + 2ab + b^2$ یا $a^2 - 2ab + b^2$ ولی در مبحث تجزیه، بر عکس است یعنی عبارت‌های $a^2 + 2ab + b^2$ یا $a^2 - 2ab + b^2$ به ما داده می‌شوند و ما باید آن‌ها را به شکل اولیه آن‌ها یعنی $(a+b)^2$ یا $(a-b)^2$ تبدیل کنیم. البته کمی جلوتر خواهید دید که برای تجزیه از بقیه اتحادها نیز به صورت بر عکس استفاده می‌کنیم.

$$\begin{matrix} 4x^2 - 4x + 1 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ a=4 \quad b=-4 \quad c=+1 \end{matrix}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(4)(+1) = 16 - 16 = 0$$

می‌خواهیم آن را تجزیه کنیم، ابتدا دلتا را تشکیل می‌دهیم:

دلتا صفر شد پس متوجه می‌شویم که می‌توانیم از اتحاد مربع دوچمله‌ای (اول یا دوم) برای تجزیه این عبارت استفاده کنیم. ضریب x منفی است پس از اتحاد دوم کمک می‌گیریم، از $4x^2$ و ۱ جذر می‌گیریم تا a و b در اتحاد مشخص شوند.

حالا عبارت داده شده را به شکل $(a-b)^2$ می‌نویسیم:

$$4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$$

مثال: تجزیه شده چند تا از عبارت‌های زیر، نادرست است؟

$$2x^5(x-1)^3 - 8x^3(x-1)^4 = 2x^3(x-1)^3(x-2)^2 \quad \text{پ} \quad x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} = \left(x - \frac{1}{9}\right)^2 \quad \text{پ} \quad 4x^2 + 4x + 1 = (2x+1)^2 \quad \text{پ}$$

۳ پ

۲ پ

۱ پ

صفر پ

پاسخ: ۱

$$4x^2 + 4x + 1 \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 4 \\ c = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (+4)^2 - 4(4)(1) = 16 - 16 = 0$$

دلتا صفر شد ضمناً ضریب x مثبت است، پس از اتحاد اول استفاده می‌کنیم:

$$4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2$$

$$x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -\frac{2}{3} \\ c = \frac{1}{9} \end{cases}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - 4\left(\frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{9}\right) = \frac{4}{9} - \frac{4}{81} = 0$$

پ

دلتا صفر شد و ضریب x عددی منفی است پس از اتحاد دوم برای تجزیه عبارت استفاده می‌کنیم:

$$x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9} = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2$$

$$2x^5(x-1)^3 - 8x^3(x-1)^4 = 2x^3(x-1)^3[x^2 - 4(x-1)] = 2x^3(x-1)^3[x^2 - 4x + 4] = 2x^3(x-1)^3(x-2)^2 \quad \text{پ}$$

تجزیه با اتحاد دوم

پس گزینه (۳) درست است.

تست: اگر $a - 2b = 1$ باشد، حاصل $2a^3b - 8a^3b^3 + 8ab^3$ کدام است؟

$$-8ab \quad 1$$

$$2ab \quad 2$$

$$ab \quad 1$$

$$-ab \quad 1$$

پاسخ: ببینید که $2ab$ موجود در تمام جملات فاکتور می‌گیریم:

$$2a^3b - 8a^3b^3 + 8ab^3 = 2ab(a^3 - 4ab + 4b^3)$$

دلتای عبارت داخل پرانتز را حساب می‌کنیم (متغیر را مثلاً a فرض کنید و b رو عدد فرض کنید یا بر عکس)

$$\begin{array}{c} 1 \\ a^3 - 4ab + 4b^3 \\ \downarrow a \quad \downarrow b \quad \downarrow c \end{array} \Rightarrow \Delta = b^3 - 4ac = (-4b)^3 - 4(1)(4b^3) = 16b^3 - 16b^3 = 0$$

دلتا صفر شد پس از اتحاد دوم برای تجزیه استفاده می‌کنیم جذر a^3 می‌شود a و جذر $4b^3$ می‌شود $2b$ پس داریم:
پس گزینه (۳) درست است.

ب **تجزیه به کمک اتحاد مزدوج:** اگر دو جمله داشته باشیم و بین آن‌ها علامت همیشه می‌توانیم، برای تجزیه آن از این اتحاد استفاده کنیم.

برای تجزیه هم کافی است از این دو جمله جذر بگیریم تا a و b معلوم شوند:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a + b)$$

مثال ۱: $x^3 - 1 = (x - 1)(x + 1)$

مثال ۲: $(2x - 3)^3 - 25 = ((2x - 3) - 5)((2x - 3) + 5)$

شاگرد: استاد، حتماً باید جملات توان ۲ داشته باشد؟

دیگر: لزومی نداره که جملات داده شده، حتماً توان ۲ داشته باشند فقط کافیه بین اونها علامت $-$ باشند:

مثال ۱: $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

مثال ۲: $25x^4 - 3 = (5x^2 - \sqrt{3})(5x^2 + \sqrt{3})$

تست: در کدام گزینه، عبارت داده شده اشتباہ تجزیه شده است؟

$$x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \quad 2$$

$$1 - 9x^3 = (1 - 3x)(1 + 3x) \quad 1$$

$$18x^5(x^2 + 5)^3 - 15x^7(x^2 + 5)^4 = 3x^3(x^2 + 5)^3(x + 5)(x - 5) \quad 3$$

$$x^8 - 81x^4 = x^4(x^2 + 9) \quad 2$$

پاسخ: بررسی گزینه‌ها

$$1 - 9x^3 = (1 - 3x)(1 + 3x)$$

1

$$x^4 - 16 = (x^2 + 4)(x^2 - 4) = (x^2 + 4)(x - 2)(x + 2)$$

2

$$x^8 - 81x^4 = x^4(x^4 - 81) = x^4(x^4 + 9)(x^2 - 9) = x^4(x^4 + 9)(x - 3)(x + 3)$$

3

$$18x^5(x^2 + 5)^3 - 15x^7(x^2 + 5)^4 = 3x^3(x^2 + 5)^3[6x^2 - 5(x^2 + 5)]$$

4

$$= 3x^3(x^2 + 5)^3(x^2 - 5) = 3x^3(x^2 + 5)^3(x - 5)(x + 5)$$

پس گزینه (۴) درست است.

تست: اگر $a - b = -6$ و $a^2 - b^2 = 66$ باشد، حاصل عبارت $a + b$ کدام است؟

$$-\sqrt{11}$$

$$11\sqrt{2}$$

$$-11\sqrt{2}$$

$$\sqrt{11}$$

پاسخ: دقت کنید که وقتی $a - b = -6$ است حاصل $a + b$ برابر $+6$ خواهد بود.

$$\begin{aligned} b^2 - a^2 &= 66 \Rightarrow (b-a)(b+a) = 66 \Rightarrow 6(b+a) = 66 \xrightarrow{\text{روباهم ساده کن}} b+a = 11 \\ &\text{تجزیه با مزدوج} \end{aligned}$$

ب) تجزیه به کمک اتحاد یک جمله مشترک: اگر یک عبارت به شکل $\bigcirc^2 + m\bigcirc + n$ داشته باشیم (○ هر عبارت دلفاوای میتوانه باشه) و m و n دو عدد باشند، فقط با داشتن دو شرط مهم، می‌توانیم به کمک اتحاد جمله مشترک، آن را تجزیه کنیم:

شرط اول: دو عدد مثل a و b پیدا شوند که ضربشان برابر با n شود.

شرط دوم: جمع a و b هم برابر با m شود.

شگرد: استاد زراندوزا من نفهمیدم a و b یهو از کجا ظاهر شدن؟

دیگر: مگه نمیدونی که من شعبده بازی هم بلدم؟ عزیز دل برادر، خدمون دنبال دو تا عدد مثل a و b می‌گردیم که ضربشون بشه n و جمعشون بشه m ، حالا فهمیدی؟ اگه نفهمیدی یه دقیقه گوش کن تا ادامه درس رو بگم! بذار کلامم منعقد بشه لطفاً بعدش سؤال بپرس!

پس از یافتن a و b عبارت به شکل زیر تجزیه می‌شود:

$$\bigcirc^2 + m\bigcirc + n = (\bigcirc + a)(\bigcirc + b)$$

مثالاً می‌خواهیم عبارت $5 - 4x - x^2$ را تجزیه کنیم، جمله مشترک x است (همون x و مربعش یعنی x^2 رود، عبارت، مشاهده می‌کنیم) حالا باید بینیم آیا دو عدد پیدا می‌شوند که ضربشان (-5) و جمعشان (-4) شود، جواب، مثبت است و این اعداد (-5) و $(+1)$ هستند پس خواهیم داشت:

$$\begin{array}{c} x^2 - 4x - 5 = (x - 5)(x + 1) \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{جمع دو عدد} \quad \text{ضرب دو عدد} \\ \text{باید } -4 \text{ شود.} \\ \text{باید } -5 \text{ شود.} \end{array}$$

یک عبارت دیگر را با هم تجزیه می‌کنیم. به عبارت $(x - 3)^2 + 5(x - 3) + 6$ دقت کنید، جمله مشترک برابر $(x - 3)$ است چون $(x - 3)^2$ و مربعش یعنی $(x - 3)^2$ مشاهده می‌شوند پس آن را داخل پرانتزها قرار می‌دهیم:

$$(x - 3)^2 + 5(x - 3) + 6$$

حالا دنبال دو عدد هستیم که ضربشان برابر $+6$ و جمعشان برابر $+5$ شود. این دو عدد $+3$ و $+2$ هستند لذا با این دو عدد، پرانتزهای بالا را کامل می‌کنیم:

$$(x - 3 + 3)(x - 3 + 2) = \text{عبارت اصلی}$$

اگر داخل پرانتزهای بالا را ساده کنیم به جواب $(x - 1)x$ خواهیم رسید.

شگرد: استاد چه روش باحالی بود، پس من دیگه، همه سه جمله‌ای‌ها را این جوری تجزیه می‌کنم!

دیگر: شگرد خوب من، این طورم نیست که همیشه بشه از این اتحاد استفاده کرد. مثلاً به عبارت $5 - 2x - x^2$ دقت کن؛ چه اعدادی ضربشون می‌شوند (-5) و $(+1)$ ؟ هیچ دو عددی پیدانمیشون. پس این عبارت به کمک اتحاد جمله مشترک، قابل تجزیه نیست و کلاً چنین عبارتی رو به شما نمیدن سرکنکور یه چیز جالبم بگم، توی یک سه جمله‌ای، چه دلتا صفر بشه چه نشه شما میتوانی از اتحاد جمله مشترک استفاده کنی، فقط شرطش اینه که اون جمله مشترک وجود داشته باشه و اون دو تا عدد هم پیدا بشن.

تست: یکی از عامل‌های اول $-8x^3 + 6x^2 + 2x$ کدام است؟

$$x + 4$$

$$x + 3$$

$$x + 1$$

$$x - 4$$

پاسخ:

$$2x^3 + 6x^2 - 8x = 2x(x^2 + 3x - 4) \xrightarrow{\text{فاکتور گیری}} 2x(x + 4)(x - 1)$$

تجزیه با اتحاد جمله مشترک

تست: عبارت $2 - x^2 + 4x$ را تجزیه می‌کنیم. کدام عامل در تجزیه شده آن وجود ندارد؟

$x^2 + 2$

$x^2 - 2$

$x - 1$

$x + 1$

پاسخ: x^4 را می‌شود به صورت $(x^2)^2$ نوشت. پس الان جمله مشترک x^2 است:

$$(x^2)^2 + 1x^2 - 2 = (x^2 \quad)(x^2 \quad)$$

حالا به دنبال دو عدد هستیم که ضربشان -2 و جمعشان $+1$ شود این اعداد $+2$ و -1 هستند: $(x^2 + 2)(x^2 - 1) = (x^2 + 2)(x - 1)(x + 1)$ تجزیه با مزدوج پس گزینه (۳) درست است.

تجزیه سه جمله‌ای‌هایی که ضریب x در آن‌ها مربع کامل است

گاهی اوقات یک سه جمله‌ای به ما داده می‌شود که در آن ضریب x^2 عددی مربع کامل (به جز ۱) است. (۴۹, ۳۶, ۲۵, ۱۶, ۹, ۴ و ...) اعداد معروف مربع کامل هستند) در این حالت، برای تجزیه این سه جمله‌ای، کافی است از جمله شامل x^2 جذر گرفته تا جمله مشترک معلوم شود سپس این جمله مشترک را از درون جمله دیگر که شامل x است بیرون می‌کشیم. مثلاً می‌خواهیم عبارت $(9x^2 + 18x + 8)$ را تجزیه کنیم 9 مربع کامل است، و جذر $9x^2$ می‌شود $3x$ ، پس $3x$ جمله مشترک است و باید $18x$ را طوری بنویسیم که در آن $3x$ دیده شود. می‌توانیم $18x$ را به صورت $(3x + 6)$ بنویسیم.

حالا دنبال دو عدد می‌گردیم که ضربشان بشود 8 و جمعشان بشود 6 این اعداد 4 و 2 هستند:

$$9x^2 + 18x + 8 = (3x)^2 + 6(3x) + 8 = (3x + 4)(3x + 2)$$

↑
جمله مشترک
↑
ضرب ۲ و ۴ می‌شود
+ ۸ می‌شود
↑
و جمعشان می‌شود
+ ۶

تست: در یکی از عوامل اول $7 - 30x^2 + 25x^4$ عدد ثابت کدام است؟

-6

6

-1

1

پاسخ: ضریب x^4 یعنی عدد 25 مربع کامل است. پس از $25x^4$ جذر می‌گیریم، جذرش برابر با $5x$ می‌شود پس باید x^3 را طوری بنویسیم که در آن $5x$ دیده شود لذا آن را به شکل $(5x + 6)$ بنویسیم:

$$25x^4 + 30x^2 - 7 = (5x)^2 + 6(5x) - 7 = (5x + 7)(5x - 1)$$

↑
جمله مشترک
↑
ضرب (+7) و (-1) می‌شود
- ۷ و جمعشان می‌شود
+ ۶

در عامل $(5x + 6)$ عدد ثابت $(+6)$ است و در عامل $(5x - 1)$ عدد ثابت (-1) است. پس گزینه (۲) درست است.

تجزیه سه جمله‌ای‌هایی که در آن‌ها ضریب x مربع کامل نیست

فرض کنید می‌خواهیم عبارت $2 - x^2 - 3x^3$ را تجزیه کنیم. الان ضریب x^3 یعنی عدد 3 مربع کامل نیست. در چنین عبارت‌هایی، بهترین روش این است که ابتدا ضریب x^2 را در عدد ثابت ضرب کنیم، بنابراین در اینجا 3 را در -2 ضرب کرده و به عبارت $2 - x^2 - 3x^3$ می‌رسیم. حال عبارت به دست آمده را به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه می‌کنیم:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

در مرحله آخر، باید عدد ثابت یکی از پرانترها را بر ضریب x^3 اولیه یعنی 3 تقسیم کرده و x پرانتر دیگر را در 3 ضرب کنیم. البته مهم نیست از کدام پرانتر شروع کنیم اما در این عبارت بهتر است پرانتری را که 3 دارد انتخاب کرده و 3 را بر 3 تقسیم کنیم و در پرانتر دیگر یعنی $(x + 2)$ عدد 3 را در x در x^3 ضرب کنیم، در نتیجه عبارت مطلوب برابر است با:

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)(3x + 2) = (x - 1)(3x + 2)$$

نیست: عبارت $2x^3 + 5x^2 + 2x$ بر کدام عبارت زیر، بخش پذیر نیست؟

X + 2

X - 2

2X + 1

X

$$\frac{2x^3 + 5x^2 + 2x}{x} = x(2x^2 + 5x + 2) = x(x+2)(2x+1)$$

فاکتور از x این عبارت را به روش گفته شده تجزیه می‌کنیم.

پاسخ: ابتدا از X فاکتور گرفته و سپس عبارت داخل پرانتز را تجزیه می‌کنیم:

عامل $(-x)$ در تجزیه شده عبارت بالا دیده نمی‌شود. پس گزینه (۳) صحیح است.

شاید: استاد اگه میشه یه توضیح بدین که $(2x^3 + 5x^2 + 2)$ رو چه جوری تجزیه کردین، مجکرم.

دیگر: ضرب x^3 عدد ۲ هست که مربع کامل هم نیست پس ۲ رو در جمله آخر ضرب می‌کنیم:

حالا عبارت حاصل رو به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه می‌کنیم:

آخر سرهم، در یکی از پرانتزها عدد ثابت رو بر ۲ تقسیم و در پرانتز دیگه، x رو در ۲ ضرب می‌کنیم: جواب

۳ تجزیه به کمک دسته‌بندی: وقتی تعداد جملات یک عبارت زیاد باشد (بیش از ۳)، برای تجزیه به دسته‌بندی احتیاج پیدا می‌کنیم. فقط باید دقت کنیم که کدام جمله‌ها را با هم در نظر بگیریم. در واقع جملات را طوری دسته‌بندی می‌کنیم که یا با هم تشکیل اتحاد بدنهند، یا این‌که دارای قسمت مشترک باشند و بعد از فاکتورگیری، بتوانیم دوباره آن‌ها را تجزیه کنیم.

مثال: عبارت‌های زیر را تجزیه کنید.

$$x^2 + y^2 - 1 - 2xy$$

$$ax - by - ay + bx$$

$$a \underbrace{x - b}_{\text{فاکتور از } x} \underbrace{y - a}_{\text{فاکتور از } y} \underbrace{y + b}_{\text{فاکتور از } x} \underbrace{x}_{\text{فاکتور از } (a+b)} = x(a+b) - y(a+b) = (a+b)(x-y)$$

پاسخ: ۱ و bx را یک دسته و ay و $-ay$ را یک دسته دیگر در نظر می‌گیریم:

$$x^2 + y^2 - 2xy - 1 = (x-y)^2 - 1^2 \quad \text{انحدامزدوج}$$

۲

$$(x-y-1)(x-y+1)$$

تجزیه با انحداد دوم

نیست: کدام عامل در تجزیه $4 - 8x - x^3 - 2x^3 + x^2$ وجود ندارد؟

2X + 1

2X - 1

X + 2

X - 2

پاسخ:

$$\frac{x^3}{\text{فاکتور از } (-)}} + \frac{x^2}{\text{فاکتور از } (-)}} - \frac{8x}{\text{فاکتور از } (-)}} - \frac{4}{\text{فاکتور از } (-)}} = x^2(2x+1) - 4(2x+1) \xrightarrow{\text{فاکتور از } (2x+1)} (2x+1)(x^2 - 4) = (2x+1)(x-2)(x+2) \Rightarrow$$

انحدامزدوج

گزینه (۳) صحیح است.

نیست: اگر $a + b = 1$ باشد، حاصل $4a^3 + b^3 - 4a - 2b + 4ab$ کدام است؟

-1

1

3

صفر

پاسخ: به روش دسته‌بندی، عبارت داده شده را تجزیه می‌کنیم:

$$\frac{4a^3 + b^3 + 4ab}{\text{تجزیه با انحداد اول}} - \frac{4a - 2b}{\text{فاکتور از } (-)}} = (2a+b)^3 - 2(2a+b) = 1 - 2 = -1 \Rightarrow$$

ب.م و ک.م دو عبارت جبری

* بزرگترین عبارت (چندجمله‌ای) که عبارت‌های P و Q بر آن بخش‌پذیر باشند را بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک (ب.م.م) دو عبارت P و Q می‌گویند.

نکته معمولاً از ب.م.م در فاکتورگیری و ساده کردن کسرها کمک می‌گیرند.

* کوچک‌ترین عبارت (چندجمله‌ای) که بر عبارت‌های P و Q بخش‌پذیر باشد را کوچک‌ترین مضرب مشترک (ک.م.م) دو عبارت P و Q می‌گویند.

نکته معمولاً از ک.م.م در مخرج مشترک‌گیری دو عبارت استفاده می‌شود. (البته در هل معادلات گویا هم از آن بهره می‌گیریم)

این تعاریف برای بیش از ۲ عبارت (یا بیش‌تر) نیز برقرار هستند.

برای بهدست آوردن ب.م.م و ک.م.م دو عبارت، آن دو را تا حد امکان تجزیه می‌کنیم، سپس خواهیم داشت:

$$ب.م.م \Leftarrow \text{حاصل ضرب عوامل مشترک با کم ترین توان}$$

$$ک.م.م \Leftarrow \text{حاصل ضرب عوامل مشترک با بیش ترین توان در عوامل غیرمشترک}$$

مثال: ب.م.م و ک.م.م عبارت‌های $x^3 + 9x^2 - 6x^3 - 6x - 6$ را بهدست آورید.

پاسخ: ابتدا هر دو عبارت را تا جایی که امکان دارد تجزیه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} x^3 - 6x^2 + 9x &= x(x^2 - 6x + 9) = x(x - 3)^2 \\ &\quad \text{(تجزیه بالاتحدادوم)} \end{aligned}$$

$$x^2 - 6x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

تجزیه با جمله مشترک

برای محاسبه ب.م.م فقط با عوامل مشترک با توان کوچک‌تر کار داریم. الان عامل مشترک با توان کوچک‌تر فقط $(x - 3)$ است پس ب.م.م را بهدست آورديم.

حالا به سراغ ک.م.م می‌رویم تمام عوامل را درهم ضرب می‌کنیم (په مشترک، په غیرمشترک) و از توان‌های بزرگ‌تر استفاده می‌کنیم:

$$ک.م.م = x(x - 3)^2(x + 2)$$

شاید: ببخشید نمیشه $(x^3 - 6x^2 + 9)$ رو به کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه کرد؟ آخه من خیلی این اتحاد رو دوس دارم.

دیگر: چرا که نه! چه اعدادی ضربشون میشه $+9$ و جمیشون -6 ! خب معلومه (-3) و (-3) پس داریم: $(x - 3)(x - 3)$

خب حاصل $(x - 3)(x - 3)$ هم که برابر میشه با $(x - 3)^2$

تست: بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک در چندجمله‌ای‌های $x^3 - 10x^2 + 21$ و $x^3 - 9x$ کدام است؟

$$(x + 3)^2$$

$$(x - 7)(x^2 + 9x)$$

$$x - 3$$

$$x + 3$$

پاسخ: ابتدا عبارت‌ها را تجزیه می‌کنیم تا عوامل مشترک، مشخص شوند:

$$\begin{cases} x^3 - 10x^2 + 21 = (x - 3)(x - 7) \\ x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x - 3)(x + 3) \end{cases}$$

بنابراین بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک یا همان ب.م.م دو عبارت برابر با $-x - 3$ می‌باشد در نتیجه گزینه (۲) صحیح است.

تعریف عبارت‌های گویا و با معنی بودن آن‌ها

به کسرهایی که صورت و مخرج آن‌ها چندجمله‌ای باشد، عبارت گویا می‌گویند. مانند $\frac{\sqrt{2}x}{x^2+1}, \frac{1}{x}, \frac{5x}{5}, \frac{x}{x-1}$. واضح است که اگر صورت یا مخرج یک کسر

چندجمله‌ای نباشد، آن کسر، عبارت گویا نیست. مثلاً عبارت‌های \sqrt{x} , $\frac{|x|}{2y+6}$ و $\frac{5\sqrt{x}}{2x-1}$ گویا نیستند چون متغیر زیر رادیکال یا داخل قدرمطلق است.

حالا می‌خواهیم بدانیم یک عبارت گویا چه وقت با معنی است؟

می‌دانیم که مخرج یک کسر نباید صفر باشد، پس مقدار یک عبارت گویا وقتی با معنی است که مخرج آن صفر نباشد. یعنی جاهایی که مخرج یک عبارت گویا

صفر می‌شود، مقدار عبارت گویا تعریف نشده است. مثلاً عبارت $\frac{x}{x-1}$ به ازای $x = 1$ تعریف نشده است، چون عدد ۱ مخرج آن را به صفر تبدیل می‌کند. در

این حالت می‌گوییم دامنه این عبارت گویا برابر است با: $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$ یعنی x هر عدد حقیقی می‌تواند باشد به جز عدد ۱.

مثال: ابتدا عبارت‌های گویا را مشخص کنید، سپس بگویید عبارت‌های گویا به ازای چه مقادیری تعریف نشده‌اند؟

$$\frac{\sqrt{x}}{x^2 - 1}$$

$$\frac{|x|}{1 - |x|}$$

$$\frac{x^2 - x}{x^2 + 1}$$

$$\frac{\sqrt{2x - 1}}{x + 1}$$

$$\frac{x - 2}{x^2 - 4}$$

$$3x^2 + 2x - 1$$

پاسخ: عبارت‌های (آ)، (ب)، (ت) و (ث)، گویا هستند، چون صورت و مخرج آن‌ها چندجمله‌ای هستند.

۱ مخرج را مساوی صفر قرار می‌دهیم و معادله حاصل را حل می‌کنیم:

$$\frac{x - 2}{x^2 - 4} \xrightarrow[\text{مخرج}]{\quad} x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{4} = \pm 2$$

دقیقت کنید وقتی از دو طرف یک رابطه، پذر هم‌گیریم به عدد سمت راست، علامت‌های \oplus و \ominus می‌گیریم.

$$\frac{x^2 - 2}{x^2 + 1} \xrightarrow[\text{مخرج}]{\quad} x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow \text{(غقق)} \text{ مخرج ریشه ندارد، پس عبارت گویا به ازای هر عدد حقیقی، تعریف شده است.}$$

لذکر: مقدار x^2 نمی‌تواند با عددی منفی مساوی شود.

$$3x^2 + 2x - 1 = \frac{3x^2 + 2x - 1}{1} \Rightarrow \text{مخرج اصلاً متغیر ندارد، در نتیجه این عبارت، همه جا تعریف شده است.}$$

$$\frac{\sqrt{2x - 1}}{x + 1} \xrightarrow[\text{مخرج}]{\quad} x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \Rightarrow \text{عبارت گویای مورد نظر، فقط به ازای } x = -1 \text{ تعریف نشده است.}$$

مسئلہ: عبارت گویای $\frac{x^2 - 3x^2 + 2x}{(x^2 - x)(x^2 - 4)}$ به ازای چند مقدار طبیعی برای x تعریف نشده است؟

۴

۳

۲

۱

$$\frac{x^2 - x}{(x^2 - x)(x^2 - 4)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ و } x = 1 \\ x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2 \end{cases}$$

پاسخ:

پس عبارت گویای داده شده، به ازای ۴ مقدار، برای x تعریف نشده است ولی فقط اعداد ۱ و ۲ طبیعی هستند پس جواب برابر با گزینه (۲) است.

مسئلہ: اگر عبارت گویای $\frac{3mx^2 - 6m^2 x}{x^2 - mx}$ به ازای $x = 1$ تعریف نشده باشد، مقدار عبارت گویا، به ازای $x = -1$ کدام است؟

-۹

-۹

۹

۹

پاسخ: کافی است مخرج را مسلوی صفر قرار داده و به جای x آن، عدد ۱ را جایگذاری کنیم:

$$x^2 - mx = 0 \xrightarrow{x=1} 1^2 - m \times 1 = 0 \Rightarrow m = 1$$

حالا در عبارت گویای متن سؤال، به جای تمام m ها عدد ۱ را قرار می‌دهیم؛

$$\frac{3(1)x^2 - 6(1)^2 x}{x^2 - 1x} = \frac{3x^2 - 6x}{x^2 - x} \xrightarrow{x=-1} \frac{3(-1)^2 - 6(-1)}{(-1)^2 - (-1)} = \frac{9}{2} \Rightarrow \text{گزینه (۲) صحیح است.}$$

قلقه زرآندوزی: گاهی اوقات لازم است دامنه یک کسر به شکل $\frac{A}{B - \frac{C}{D}}$ را تعیین کنیم (در مبحث اعمال روی توابع سال یازدهم):

برای یافتن دامنه، ابتدا معادلات $B = 0$ ، $C = 0$ و $D = 0$ را حل می‌کنیم و سپس جواب‌ها را از \mathbb{R} حذف می‌کنیم؛

مثالاً می‌خواهیم دامنه تابع $y = \frac{\frac{x-1}{x-4}}{\frac{2x}{x^2-9}}$ را تعیین کنیم:

$$\begin{cases} x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4 \\ 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \\ x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \end{cases}$$

$$D_y = \mathbb{R} - \{-3, 0, 3, 4\}$$

↓
یعنی دامنه تابع y

پس دامنه کسر (تابع) به شکل مقابل است:

ساده کردن عبارت های گویا

برای ساده کردن یک عبارت گویا، صورت و مخرج آن را به عوامل اولش تجزیه می کنیم. (برای تجزیه از فاکتور گیری و اتحاد ها کمک هی گیریم). سپس عوامل های مشترک را از صورت و مخرج حذف می کنیم، با این کار عبارت گویا را ساده کرده ایم. توجه کنید عبارت را باید تا جایی ساده کنیم که دیگر، ساده تر نشود.

شاگرد: استاد میشه گفت در واقع ب.م.رو از صورت و مخرج ساده می کنیم؟

دیگر: آفرین به تو!

تست: در ساده شده عبارت گویای $\frac{x^3 - 2x^2 - 35x}{(x^2 - 25)(x^2 - 49)}$ مخرج کسر، کدام است؟

۴x ۲

$x^2 + 2x - 35$ ۲

$x^2 - 2x + 35$ ۲

$4x(x - 1)$ ۱

پاسخ:

$$\frac{\overbrace{x^3 - 2x^2 - 35x}^{\text{فاکتور از}}}{\underbrace{(x^2 - 25)}_{\text{تجزیه با مزدوج}} \underbrace{(x^2 - 49)}_{\text{تجزیه با مزدوج}}} = \frac{\overbrace{x(x^2 - 2x - 35)}^{\text{اتحاد جمله مشترک}}}{(x - 5)(x + 5)(x - 7)(x + 7)} = \frac{x(x - 7)(x + 5)}{(x - 5)(x + 5)(x - 7)(x + 7)} = \frac{x}{(x - 5)(x + 7)}$$

$$\text{گزینه (۳) درست است.} \\ \text{مخرج کسر} = \frac{(x - 5)(x + 7)}{\text{ضرب می کنیم}} = x^2 + 2x - 35 \Rightarrow$$

تست: ساده شده کدام عبارت، نادرست است؟

$$\frac{a^3 x^3 b + a^4 x^3}{a^2 b^3 x + a^2 b^2 x} = \frac{ax^2}{b^2} \quad ۱$$

$$\frac{x^3(x^2 + 4)^3 - x^3(x + 6)(x^2 + 4)^2}{x^6 - 16x^3} = \frac{x(x^2 + 4)(x + 1)}{x + 2} \quad ۲$$

$$\frac{3a^3 - 6a^3 m}{m^2 a - 25a} = \frac{6a^2}{m + 5} \quad ۱$$

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 + 7x + 3} = \frac{x - 1}{2x + 1} \quad ۲$$

پاسخ: بررسی گزینه ها

$$\frac{\overbrace{3a^3 - 6a^3 m}^{\text{فاکتور از}}}{\underbrace{m^2 a - 25a}_{\text{فاکتور از}}} = \frac{6a^3(m - 5)}{a(m^2 - 25)} = \frac{6a^3(m - 5)}{a(m - 5)(m + 5)} = \frac{6a^2}{m + 5} \quad ۱$$

یه لحظه به من توجه کن! وقتی دو عبارت قرینه را از صورت و مخرج کسر ساده می کنیم به جای یکی از آنها ۱ و به جای دیگری (-۱) قرار می دهیم. الان

$$\frac{a^3 x^3 b + a^4 x^3}{a^2 b^3 x + a^2 b^2 x} = \frac{a^3 x^3(b + a)}{a^2 b^2 x(b + a)} = \frac{a^2 x^2}{a^2 b^2 x} = \frac{ax^2}{b^2} \quad ۲$$

(۵ - m) و (m - 5) قرینه بودند پس همین کار را کردیم.

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{2x^2 + 7x + 3} = \frac{(x - 1)(x + 3)}{(x + 3)(2x + 1)} = \frac{x - 1}{2x + 1} \quad ۳$$

صورت و مخرج رابه کمک اتحاد جمله مشترک تجزیه می کنیم:

$$\frac{x^3(x^2 + 4)^3 - x^3(x + 6)(x^2 + 4)^2}{x^6 - 16x^3} = \frac{x^3(x^2 + 4)^2(x^2 + 4 - (x + 6))}{x^3(x^4 - 16)} = \frac{x^3(x^2 + 4)^2(x^2 - x - 2)}{x^3(x^2 - 4)(x^2 + 4)} \quad ۴$$

$$= \frac{x^2(x^2 + 4)^2(x - 2)(x + 1)}{x^2(x^2 - 4)(x + 2)(x^2 + 4)} = \frac{x(x^2 + 4)(x + 1)}{x + 2}$$

پس گزینه (۱) صحیح است.

جمع و تفریق عبارت‌های گویا



برای جمع و تفریق دو عبارت گویا مثل جمع و تفریق دو عدد کسری عمل می‌کنیم. (برای مخرج مشترک‌گیری استفاده می‌کنیم. (برای مخرج مشترک‌گیری کافیه، ابتدا مخرج‌ها را تجزیه کنیم سپس ک.م.م مخرج‌ها را پیدا کنیم و اون رو به عنوان مخرج مشترک بنویسیم، هالا مخرج‌ها برای تبدیل شدن به ک.م.م در هر چیز که ضرب شده باشند، صورت‌ها رو هم در همون عبارت ضرب می‌کنیم و در نهایت، جمع و تفریق رو انجام می‌دم).

مثال: حاصل عبارت‌های زیر را بیابید.

$$\frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x^2-1} \quad \text{(۱)}$$

$$\frac{x-1}{x+2} - \frac{x-2}{x+1} \quad \text{(۲)}$$

پاسخ: (۱) الان مخرج‌ها قبل تجزیه شدن نیستند پس با ضرب آنها ک.م.م به دست می‌آید:

$$(x+2)(x+1) \Rightarrow \frac{x-1}{x+2} - \frac{x-2}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1) - (x-2)(x+2)}{(x+2)(x+1)} = \frac{(x^2-1) - (x^2-4)}{(x+2)(x+1)}$$

$$= \frac{x^2-1-x^2+4}{(x+2)(x+1)} = \frac{3}{(x+2)(x+1)}$$

$$\begin{cases} x^2-x=x(x-1) \\ x^2-1=(x-1)(x+1) \end{cases} \Rightarrow \text{ک.م.م مخرج‌ها} = x(x+1)(x-1)$$

(۲) ابتدا مخرج‌ها را تا حد امکان تجزیه می‌کنیم:

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{x(x-1)} + \frac{1}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+1+x}{x(x+1)(x-1)} = \frac{2x+1}{x(x+1)(x-1)}$$

مثال: حاصل $\frac{x}{x-1} + \frac{2}{x+1} - \frac{x-3}{x^2-1}$ کدام است؟

$$\frac{x+2}{x^2-1} \quad \text{(۱)}$$

$$\frac{x-1}{x+1} \quad \text{(۲)}$$

$$\frac{x+1}{x-1} \quad \text{(۳)}$$

$$\frac{x+1}{x^2-1} \quad \text{(۴)}$$

پاسخ: عبارت $x^2 - 1$ به کمک اتحاد مزدوج برابر می‌شود با $(x-1)(x+1)$. پس ک.م.م مخرج‌ها برابر با $(x-1)(x+1)(x+1)$ است، لذا داریم:

$$\frac{x}{x-1} + \frac{2}{x+1} - \frac{x-3}{x^2-1} = \frac{x(x+1)+2(x-1)-(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x+2x-2-x+3}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+2x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+1}{x-1}$$

بنابراین گزینه (۲) صحیح است.

قلقه رساندویی برای حل سوالات مربوط به عبارت‌های گویا، می‌توانیم به جای تجزیه صورت و مخرج‌ها، عددگذاری کنیم. یعنی به جای متغیرها یک عدد دلخواه قرار دهیم، ساده‌ترین اعداد ۰، ۱، ۲ و ۳ هستند فقط باید حواستان باشد که هیچ مخرجی نباید صفر شود. حالا تست قبلی را به همین روش حل می‌کنیم الان x را مثلاً ۲ فرض می‌کنیم (به x نمی‌توانیم یک بردیم چون دو تا مخرج صفر می‌شون).

$$\text{عبارت} = \frac{x}{x-1} + \frac{2}{x+1} - \frac{x-3}{x^2-1} \xrightarrow{x=2} \text{عبارت} = \frac{2}{1} + \frac{2}{3} - \frac{-1}{3} = \frac{6+2+1}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

حالا در گزینه‌ها نیز عدد ۲ را قرار می‌دهیم، باید به جواب ۳ برسیم:

$$\frac{x^2+1}{x^2-1} \xrightarrow{x=2} \frac{5}{3} \quad \text{(نادرست) (۱)}$$

$$\frac{x+1}{x-1} \xrightarrow{x=2} \frac{3}{1} = 3 \quad \text{(درست) (۲)}$$

$$\frac{x-1}{x+1} \xrightarrow{x=2} \frac{1}{3} \quad \text{(نادرست) (۳)}$$

$$\frac{x+2}{x^2-1} \xrightarrow{x=2} \frac{4}{3} \quad \text{(نادرست) (۴)}$$

ضرب و تقسیم عبارت‌های گویا



برای ضرب و تقسیم دو عبارت گویا نیز مثل ضرب و تقسیم عده‌های کسری عمل می‌کنیم و سپس عبارت گویای به دست آمده را تا حد امکان ساده می‌کنیم، یعنی:

$$\text{۱} \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad (\text{صورت رو در صورت و مخرج رو در مخرج ضرب هی کنیم})$$

$$\text{۲} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} \quad (\text{کسر اول رو در مکلوس کسر دوم ضرب هی کنیم})$$

$$\text{مسئله: حاصل تقسیم} \quad \frac{4x^3 - 25y^2}{2x^2 y + 5xy^2} \div \frac{6x^2 - 15xy}{9x^2 y^2}$$

۳x ۱

۴ ۲

۳y ۲

۳ ۱

پاسخ :

$$\begin{aligned} \frac{4x^3 - 25y^2}{2x^2 y + 5xy^2} \div \frac{6x^2 - 15xy}{9x^2 y^2} &= \frac{4x^3 - 25y^2}{2x^2 y + 5xy^2} \times \frac{9x^2 y^2}{6x^2 - 15xy} \\ &= \frac{(4x^3 - 25y^2)}{(2x^2 y + 5xy^2)} \times \frac{(9x^2 y^2)}{(6x^2 - 15xy)} \\ &= \frac{(2x - 5y)(2x + 5y)}{xy(2x + 5y)} \times \frac{(9x^2 y^2)}{(3x)(2x - 5y)} \\ &= \frac{9x^2 y^2}{3x^2 y} = 3y \end{aligned}$$

تجزیه با مزدوج
فاکتور از ۳x
فاکتور از ۵y

گزینه (۲) صحیح است.

لذکر: می‌توانیم از روش عددگذاری هم استفاده کنیم، مثلاً به X ها عدد ۱ و به y ها عدد ۲ را نسبت می‌دهیم:

$$\frac{4(1)^3 - 25(2)^2}{2(1)^2(2) + 5(1)(2)^2} \div \frac{6(1)^2 - 15(1)(2)}{9(1)^2(2)^2} = \frac{-96}{24} \div \frac{-24}{36} = \frac{-96}{24} \times \frac{-36}{36} = 6$$

عبارت اصلی

در گزینه‌ها هم به جای X و y به ترتیب ۱ و ۲ را قرار می‌دهیم و ملاحظه می‌کنیم که فقط جواب گزینه (۲) برابر با ۶ می‌شود.

$$\text{مسئله: حاصل ضرب کدام عبارت گویا در} \quad \frac{x^2 - y^2}{2xy} \quad \text{برابر با} \quad x - y \quad \text{می‌گردد؟}$$

۳x ۱

۴ ۲

۳y ۲

۳ ۱

پاسخ :

اگر آن عبارت گویا را A در نظر بگیریم، خواهیم داشت:

$$A \times \frac{x^2 - y^2}{2xy} = x - y \Rightarrow A = (x - y) \div \left(\frac{x^2 - y^2}{2xy} \right) \Rightarrow A = \frac{x - y}{1} \div \frac{x^2 - y^2}{2xy} = \frac{x - y}{1} \times \frac{2xy}{x^2 - y^2} = \frac{2xy(x - y)}{(x - y)(x + y)} = \frac{2xy}{x + y}$$

بنابراین گزینه (۱) صحیح است.

یادداشت:

اتحاد مربع دوجمله‌ای، مزدوج و یک جمله مشترک

۱. حاصل $(1 - \sqrt{2})^2 - (\sqrt{2} + 1)^2$ کدام است؟ ۱★
- ۴ ۱۶ ۴\sqrt{2} ۴\sqrt{2}
۲. عبارت A در تساوی $\frac{x}{3} - 4 = \frac{x^2}{9} + A + 16$ کدام است؟ ۲★
- \frac{1}{3}x -\frac{4}{3}x \frac{4}{3}x \frac{1}{3}x
۳. اگر $xy^2 = \frac{4}{3}$ باشد، حاصل $(x+3y^2)^2 - (x-3y^2)^2$ کدام است؟ ۳★
- ۸ ۱۲ ۱۶ ۱۸
۴. حاصل عبارت $A = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})$ به ازای $x = \sqrt{2}$ و $y = \sqrt{5}$ کدام است؟ ۴★
- ۳ -۴ -۵ -۶
۵. اگر مساحت مربع مقابله A و مساحت مثلث B بنامیم، حاصل $A + 2B$ کدام است؟ ۵★
- ۵x^2 + 1 ۵x^2 - 2x x^2 + 7x x^2 - 5x
۶. اگر $2x + \frac{5}{x} = 9$ باشد حاصل $4x^2 + \frac{25}{x^2}$ کدام است؟ ۶★
- ۴۳ ۵۱ ۵۷ ۶۱
۷. اگر $5x - \frac{3}{4x} = 4$ باشد، حاصل $(25x^2 + \frac{9}{4x^2})$ کدام است؟ ۷★
- ۲۴ ۲۹ ۳۲ ۳۱
۸. اگر $3x + \frac{1}{2x} = 5$ باشد، حاصل $(9x^2 + \frac{1}{4x^2})$ کدام است؟ ۸★
- ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۲۲
۹. در تساوی $\frac{1-x^4}{A} = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$ عبارت A کدام است؟ ۹★
- ۱-X^4 ۱-X^2 ۱-X X^2 - 12
۱۰. دوجمله‌ای $40x^3y^2 - 30xy^4 - 30x^2y^2$ بر کدام عبارت زیر بخش‌پذیر است؟
- ۱۰xy^3 ۱۰x^2y^2 ۴x^2 + 3y^2 ۴x^2 - 3y^2
۱۱. در تجزیه $2x(x^2 - 6)^3 - x^3(x^2 - 6)^3$ کدام عامل زیر وجود ندارد؟
- X^2 - 6 X X^2 - 13 X^2 - 12

استفاده از فاکتورگیری در تجزیه

۱۰. دوجمله‌ای $40x^3y^2 - 30xy^4 - 30x^2y^2$ بر کدام عبارت زیر بخش‌پذیر است؟
- ۱۰xy^3 ۱۰x^2y^2 ۴x^2 + 3y^2 ۴x^2 - 3y^2
۱۱. در تجزیه $2x(x^2 - 6)^3 - x^3(x^2 - 6)^3$ کدام عامل زیر وجود ندارد؟
- X^2 - 6 X X^2 - 13 X^2 - 12

استفاده از اتحاد مربع دوجمله‌ای و اتحاد مزدوج

۱۲. عبارت $16x^3y + 40x^2y^2 + 25xy^3$ بر کدام عامل بخش‌پذیر است؟ ۱۲★
- (5x + 4y)^2 x^2y^2 (4x + 5y)^2 4x - 5y
۱۳. در تجزیه $x^2y^6 - x^3y^2$ کدام عامل وجود ندارد؟ ۱۳★
- (x + y)^2 x - y x + y x^2 + y^2

دانش آموزان عزیز! در صورت کمبود وقت، پاسخ‌گویی به تست‌های دارای ★ الزامی است. تست‌های دارای ★ دشوار هستند و حل آنها اختیاری است، ضمناً تست‌هایی که در آنها هیچ ستاره‌ای وجود ندارد را بعد از حل سوالات با علامت ★ در صورت داشتن فرصت کافی حل کنید.

۱۴. دو جمله‌ای $-2x^4 - 256$ بر کدام عبارت زیر بخش‌پذیر نیست؟

X - ۲

X - ۴

X³ + ۴X⁴ + ۱۶

۱۵. اگر $c^3 + d^3 + 2cd$ باشد مقدار $c^3 - d^3 = ۷۷$ و $c - d = -۷$ کدام است؟

۱۴۴

۱۲۱

۸۱

۶۴

۱۶. کدام عبارت در تجزیه شده عبارت $(x^3 - 2x^4 + 1)$ وجود دارد؟

(x - ۲)^۳(x - ۱)^۳(x + ۱)^۳(x - ۱)^۳

۱۷. اگر عبارت $5x^3 + mx^2 + mx + ۱۰$ به صورت توان دوم مجموع دو جمله باشد، مقدار m کدام است؟

۵√۲

۱۰√۲

۲√۵

۲√۱۰

۲

-۴

۴

صفر

۱۸. اگر $x + y = ۱۲$ و $4x^3 - y^3 = ۲x - y$ باشد، x, y کدام است؟

۳۱

۳۳

۶۵

۶۳

صفر

-۳

۲

۵

استفاده از اتحاد یک جمله مشترک

(سراسری - ۸۳)

۱۸. عبارت $-4x^3 - 4x^2 + 2x^3 + 2x^2$ بر کدام دو جمله‌ای بخش‌پذیر نیست؟

۲X

X + ۲

X - ۱

X + ۱

(سراسری خارج از کشور - ۹۳)

۱۹. عبارت $4x^3 + 2x^2 - 6x^3 - 4x^2$ بر کدام عبارت بخش‌پذیر است؟

X + ۲

X + ۱

۲X - ۱

۲X + ۱

X + ۱

X - ۲

X + ۲

X³ + ۱

(سراسری خارج از کشور - ۹۷)

۲۰. در تجزیه عبارت $(x^2 - 12)^2 - 16x^2$ کدام عامل ضرب وجود ندارد؟

X + ۶

X + ۳

X + ۲

X - ۶

۲X + ۱

۲X³ + ۷۴X³ + ۷

۲X - ۱

(سراسری خارج از کشور - ۸۸)

a - ۴

a + ۱

a - ۲

a - ۱

(سراسری - ۹۰)

a + ۲

a - ۲

a - ۳

a - ۶

۲۱. در تجزیه $a(a - ۳)(a - ۴) - ۱۲a + ۳۶$ کدام عامل وجود ندارد؟

X + ۲

X - ۲

X + ۱

X³ + X - ۱

X + ۱

X - ۳

X - ۲

X - ۱

(سراسری خارج از کشور - ۹۰)

X + ۴

X + ۲

X - ۴

X - ۸

۲۲. در تجزیه $(x^2 - 6x - ۴)^2 - ۱۴۴$ کدام عامل وجود ندارد؟

استفاده از روش دسته‌بندی در تجزیه

۳۱★ . در تجزیه عبارت $2x^3 - x^2 - 8x + 4$ کدام دو جمله‌ای وجود ندارد؟

$x+1$

$x+2$

$2x-1$

$x-2$

(سراسری خارج از کشور-۸۹)

۳۲★ . اگر $a(a+2) + 4b(b+1) + 4ab = 3$ باشد، حاصل $a+2b$ است؟

18

17

16

15

$x+3$

$x+1$

$x-1$

$x-3$

۳۳★ . عبارت $x^3 - (x-1)(x^2 - x + 3) - x$ بر کدام عامل بخش‌پذیر است؟

۳۴★ . محاسبه ب.م.م و ک.م.م عبارت‌های جبری

(سراسری-۸۷)

۳۵★ . بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک سه جمله‌ای‌های $12x^2 - 9x + 4$ و $16x^3 + 16x^2 - 12x$ کدام است؟

$4x+2$

$4x+1$

$2x+2$

$2x+1$

۳۶★ . کوچک‌ترین مضرب مشترک دو عبارت $x^3 - 2x^2 - 2x^3 + x^2 + x^3$ کدام است؟

$x^2(x-1)^2(x+2)$

$x(x-1)^2$

$x^2(x-1)^2$

$x(x-1)(x+2)$

$x+1$

x^2-2

x^2+2

$x-1$

۳۷★ . اگر A و B به ترتیب کوچک‌ترین مضرب مشترک و بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک چند جمله‌ای‌های $9x^3 - 9x^2 - 3x$ باشند، حاصل $\frac{A}{B}$ کدام است؟

$3x^2 + 9x$

$x^2 + 3x$

$3x^2 - 9x$

$x^2 - 3x$

با معنا بودن عبارات گویا

۳۸★ . کدام عبارت گویا بوده و همه جا تعریف شده است؟

$\frac{1+x(x+1)}{x^2+1}$

$\frac{\sqrt{x}}{x+x^2}$

$\frac{1+x^2}{x^2}$

$\frac{1}{|x|+1}$

۳۹★ . اگر عبارت گویای $\frac{mx^2+x-2}{x(2x-m)}$ به ازای $-1 < x < 1$ تعریف نشده باشد، مقدار عبارت گویا به ازای $x=1$ کدام است؟

$-\frac{1}{4}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4}$

۴۰★ . عبارت گویای $\frac{x+a}{x+b}$ به ازای $-1 < x < 1$ تعریف نشده و به ازای $x=1$ برابر a باشد، مقدار a کدام است؟

2

-2

1

-1

ساده کردن عبارات گویا

۴۱ . ساده شده عبارت گویای $\frac{-6x(x^2-4)^2 + 2(x^2-4)^3}{2(x^2-4)^2(x+1)}$ کدام است؟

$x-4$

$x+4$

$2x$

$x-1$

۴۲★ . اگر $a = \sqrt{2} + 1$ و $b = \sqrt{2} - 1$ باشد، حاصل $\frac{ab^3 + a^3b + 2a^2b^2}{a^3b - ab^3}$ کدام است؟

1

$2\sqrt{2}$

$\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sqrt{2}$

جمع و تفکیق عبارات گویا

۴۳★ . حاصل $\frac{x^2+3x}{x^2+3x+2} - \frac{5x+3}{x+1}$ کدام است؟

$\frac{2(2x+3)}{x+2}$

$\frac{-2(2x+3)}{x+2}$

$\frac{2x+3}{x+1}$

$-\frac{2x+3}{x+1}$

(سراسری خارج از کشور-۹۱)

۴۴★ . حاصل عبارت $\frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+1} - \frac{4x-2}{x^2-1}$ کدام است؟

2

1

-1

-2

سراسری خارج از کشور - ۹۸

$$.\text{ حاصل عبارت با معنی } \frac{2a}{a^2 - 4b^2} + \frac{1}{a+2b} - \frac{1}{a-2b} \text{ کدام است؟}$$

$\frac{a}{a-2b}$

$\frac{a}{a+2b}$

$\frac{2}{a-2b}$

$\frac{2}{a+2b}$

سراسری - ۹۸

$$.\text{ حاصل عبارت با معنی } \frac{P(x)}{4x^2 - 1} \text{ است. } P(x) \text{ کدام است؟}$$

$4x - 3$

$-4x + 1$

$-4x$

$-8x$

سراسری - ۹۹

$$.\text{ اگر مخرج کسرها صفر نباشند، حاصل عبارت } \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x(x+1)(x^2 - 4)} - \frac{2}{x^2 - 2x} \text{ کدام است؟}$$

$\frac{x}{x-2}$

$\frac{2}{x}$

$\frac{1}{x-2}$

$\frac{1}{x}$

سراسری خارج از کشور - ۹۹

$$.\text{ با فرض این‌که مخرج کسرها صفر نیستند، حاصل عبارت } \frac{x+2}{x^2 + x - 2} - \frac{2x}{x^2 - x} \text{ کدام است؟}$$

$\frac{x-2}{x+1}$

$\frac{x-2}{x-1}$

$\frac{1}{x-1}$

$\frac{1}{x+1}$

ضرب و تقسیم عبارات گویا

سراسری - ۹۶

$$.\text{ خلاصه شده عبارت } \frac{4x^2 + 4x + 1}{2x^2 + x} \div \left(x - 2 - \frac{x^2 + 1}{x} \right) \text{ کدام است؟}$$

-1

1

$\frac{-1}{x+1}$

$\frac{1}{x-1}$

سراسری - ۹۳

$$.\text{ حاصل عبارت } (2x+1 - \frac{3}{x}) \div \left(2 + \frac{1}{x+1} \right) \text{ کدام است؟}$$

$x - \frac{1}{x}$

$x + \frac{1}{x}$

$2 + \frac{1}{x}$

$2 - \frac{2}{x}$

سراسری خارج از کشور - ۹۳

$$.\text{ حاصل عبارت } \left(1 + \frac{3x}{x^2 - 4} \right) \times \left(1 - \frac{1}{x-1} \right) \text{ کدام است؟}$$

$\frac{x+4}{x-2}$

$\frac{x-4}{x+2}$

$\frac{x-4}{x-2}$

$\frac{x+4}{x+2}$

سراسری - ۹۲

$$.\text{ حاصل عبارت } \left(x + \frac{2}{x-3} \right) \times \left(1 - \frac{1}{x-2} \right) \text{ کدام است؟}$$

$2x + 1$

$x + 2$

$x + 1$

$x - 1$

سراسری - ۹۰

$$.\text{ خلاصه شده عبارت } 1 - \frac{6}{x+2} \left(\frac{\Delta x - 2}{x-4} + x \right) \text{ کدام است؟}$$

$x + 2$

$x + 1$

$x - 1$

$x - 2$

سراسری خارج از کشور - ۹۰

$$.\text{ خلاصه شده عبارت } \left(x - \frac{x+6}{x-4} \right) \left(\frac{x^2 + 9}{x+1} - 5 \right) \text{ کدام است؟}$$

$x^2 - 7x + 6$

$x^2 + 5x + 6$

$x^2 - 3x + 4$

$x^2 + 3x - 4$

سراسری خارج از کشور - ۹۲

$$.\text{ حاصل عبارت } 2 + \frac{x^2}{x-4} \div \left(1 + \frac{8}{x-4} \right) \text{ کدام است؟}$$

$x + 2$

$x + 1$

$x - 2$

$2x - 2$

سراسری خارج از کشور - ۹۴

$$.\text{ حاصل عبارت } \left(1 - \frac{2}{x^4 + x^2} \right) \left(1 + \frac{2}{x^2 - 1} \right) - \frac{2}{x^2} \text{ برای کدام است؟}$$

صفر

$1 + \frac{1}{x^2}$

1

$\frac{1}{x^2}$

سراسری خارج از کشور - ۹۶

$$.\text{ ساده شده عبارت } \frac{4x^2 - 12x + 9}{4x - 6} \div \left(2 - \frac{4x - 3}{x} \right) \text{ کدام است؟}$$

$\frac{2x - 3}{x}$

$\frac{-1}{2x}$

$\frac{x}{2}$

$\frac{-x}{2}$



پاسخ‌های تشریحی

$$\begin{aligned} \left(5x - \frac{3}{2x}\right)^2 &= 4 \xrightarrow{\text{طرفین به توان ۲}} \left(5x - \frac{3}{2x}\right)^2 = 4^2 \\ \Rightarrow (5x)^2 - 2(5x)\left(\frac{3}{2x}\right) + \left(\frac{3}{2x}\right)^2 &= 16 \\ \Rightarrow 25x^2 - 15 + \frac{9}{4x^2} &= 16 \\ \xrightarrow[\text{راست ببر}]{{\color{red}(+)15}} 25x^2 + \frac{9}{4x^2} &= 15 + 16 \Rightarrow 25x^2 + \frac{9}{4x^2} = 31 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(3x + \frac{1}{2x}\right)^2 &= 5 \xrightarrow{\text{طرفین به توان ۲}} \left(3x + \frac{1}{2x}\right)^2 = 5^2 \\ \Rightarrow (3x)^2 + 2(3x)\left(\frac{1}{2x}\right) + \left(\frac{1}{2x}\right)^2 &= 25 \\ \Rightarrow 9x^2 + 3 + \frac{1}{4x^2} &= 25 \Rightarrow 9x^2 + \frac{1}{4x^2} = 25 - 3 = 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\begin{array}{c} \text{جذر} \\ \sqrt{1-x^6} \end{array} = \underbrace{(1-x^4)}_{\substack{\text{تجزیه با مزدوج} \\ \text{دوباره تجزیه}}} (1+x^4) = \underbrace{(1-x^4)}_{\substack{\text{باز هم تجزیه} \\ \text{با مزدوج}}} (1+x^4)(1+x^4) \\ &= \underbrace{(1-x^2)}_{\substack{\text{باز هم مزدوج}}} (1+x^2)(1+x^4)(1+x^4) \\ &= (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^4) \\ &\xrightarrow[\substack{\text{داده شده} \\ \text{جایگذاری در رابطه}}]{\substack{\text{آغاز}} A} (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^4) \\ &= (1-x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^4) \xrightarrow{\substack{\text{آغاز}} A} \frac{1-x}{A} = 1 \Rightarrow A = 1-x \end{aligned}$$

اعداد ۳۰ و ۴۰ هر دو بر ۱۰ بخش‌پذیرند، ضمناً بین x^3 و x از x فاکتور می‌گیریم و بین y^2 و y از y^2 فاکتور می‌گیریم پس در کل از $10^0 xy$ فاکتور $40x^3y^2 - 30xy^4 = 10xy^2(4x^2 - 3y^2)$ می‌گیریم: عامل $(4x^2 - 3y^2)$ در گزینه ۱ دیده می‌شود، پس دوچمله‌ای داده شده بر آن بخش‌پذیر است.

از عبارت $x^3 - 6x$ فاکتور می‌گیریم:

$$\begin{aligned} 2x(x^2 - 6) - x^3(x^2 - 6) &= x(x^2 - 6)^2(2(x^2 - 6) - x^2) \\ &= x(x^2 - 6)^2(2x^2 - 12 - x^2) = x(x^2 - 6)^2(x^2 - 12) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 16x^3y + 40x^2y^2 + 25xy^3 &\xrightarrow{\substack{\text{فاکتور از} \\ \text{xy}}} xy(16x^2 + 40xy + 25y^2) \\ &= xy(4x + 5y)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^6y^2 - x^2y^6 &\xrightarrow{\substack{\text{فاکتور از} \\ \text{xy}}} x^2y^2 \underbrace{(x^4 - y^4)}_{\substack{\text{تجزیه با مزدوج}}} \\ &= x^2y^2(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) = x^2y^2(x^2 + y^2)(x - y)(x + y) \end{aligned}$$

بنابراین در تجزیه به دست آمده، عامل $(x + y)^2$ وجود ندارد.

یادآوری اتحادها، تجزیه و عبارت‌های گویا

فصل ۱

حاصل تک تک عبارات $(1 + \sqrt{2})^2$ و $(1 - \sqrt{2})^2$ را به کمک اتحاد مربع دوچمله‌ای به دست آورده و جواب‌هایشان را از هم کم می‌کنیم:

$$(1 + \sqrt{2})^2 = 1 + 2(1)(\sqrt{2}) + \sqrt{2}^2 = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2}$$

$$(\sqrt{2} - 1)^2 = \sqrt{2}^2 - 2(\sqrt{2})(1) + 1^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 3 - 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow (3 + 2\sqrt{2}) - (3 - 2\sqrt{2}) = \text{جواب نهایی}$$

$$= 3 + 2\sqrt{2} - 3 + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

۱۲

بنابراین اتحاد مربع دوچمله‌ای داریم:

$$\left(\frac{x}{3} - 4\right)^2 = \left(\frac{x}{3}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{3}\right)(4) + 4^2 = \frac{x^2}{9} - \frac{8}{3}x + 16$$

این جمله خواسته شده

$$\Rightarrow A = -\frac{8}{3}x$$

۱۳

$$\begin{cases} (x + 3y^2)^2 = x^2 + 6xy^2 + 9y^4 \\ (x - 3y^2)^2 = x^2 - 6xy^2 + 9y^4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{عبارت مطلوب} = x^2 + 6xy^2 + 9y^4 - x^2 + 6xy^2 - 9y^4 = 12xy^2$$

$$\frac{12}{xy^2} = \frac{4}{3} = 16$$

۱۴

پرانترهای اول و آخر، تشکیل اتحاد مزدوج می‌دهند پس آن‌ها را کنار هم می‌نویسیم:

$$A = \underbrace{(x - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})}_{\substack{\text{مزدوج} \\ \text{دوباره مزدوج}}} (x + y) = (\sqrt{x} - \sqrt{y})(x + y)$$

$$= (x - y)(x + y) = x^2 - y^2 \xrightarrow[y=\sqrt{y}]{\substack{\text{مزدوج} \\ \text{دوباره مزدوج}}} x = \sqrt{y}$$

$$A = \sqrt{2} - \sqrt{5} = 2 - 5 = -3$$

۱۵

$$A = \underbrace{(x - 1)^2}_{\substack{\text{مزدوج} \\ \text{اتحاد دوم}}} = x^2 - 2x + 1$$

$$B = \frac{\text{ارتفاع} \times \text{قاعده}}{2} = \frac{\underbrace{(2x-1)(2x+1)}_{\substack{\text{مساحت مثلث}}}}{2}$$

$$= \frac{(2x)^2 - 1^2}{2} = \frac{4x^2 - 1}{2}$$

$$A + 2B = x^2 - 2x + 1 + \frac{4x^2 - 1}{2}$$

$$= x^2 - 2x + 1 + 4x^2 - 1 = 5x^2 - 2x$$

۱۶

$$2x + \frac{5}{x} = 9 \xrightarrow{\substack{\text{طرفین به توان ۲}}} (2x + \frac{5}{x})^2 = 81$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 2(2x)\left(\frac{5}{x}\right) + \frac{25}{x^2} = 81$$

$$\Rightarrow 4x^2 + \frac{25}{x^2} = 81 - 20 \Rightarrow 4x^2 + \frac{25}{x^2} = 61$$

۱۴

$$x^3 + 4y^3 = 4xy \Rightarrow x^3 + 4y^3 - 4xy = 0$$

از دو طرف
تجزیه با اتحاد دوم
 $(x - 2y)^2 = 0 \rightarrow x - 2y = 0$
جذر بگیر.

$$x^3 - 4y^3 = (x - 2y)(x + 2y) = 0$$

۱۵

$$2x^3 + 2x^2 - 4x = 2x(x^2 + x - 2) = 2x(x + 2)(x - 1)$$

تجزیه با جمله مشترک

بنابراین در بین گزینه‌ها تنها بر $(x + 1)$ بخش پذیر نیست.

۱۶

$$4x^3 - 6x^2 + 2x = x(4x^2 - 6x + 2) = x(2x - 1)(2x - 2) = 2x(2x - 1)(x - 1)$$

تجزیه با اتحاد اول

توضیح حل بالا: در عبارت $4x^3 - 6x^2 + 2x$ ضریب x^2 یعنی عدد ۴ مربيع کامل است پس از x^2 جذر می‌گیریم که برابر می‌شود با $(2x)$ حالا جمله $6x$ را طوری نوشته‌یم که در آن $2x$ ایجاد شود یعنی به شکل $(2x)^3 - 2x^2 + 1$ نوشته‌یم و در نهایت از اتحاد جمله مشترک برای تجزیه استفاده کردیم.

شاگرد: استاد نمی‌شند اولش از $2x$ فاکتور بگیریم!
دیگر: چرا نمی‌شند، اون وقت باید به شکل زیر عمل می‌کردیم:

$$4x^3 - 6x^2 + 2x = 2x(2x^2 - 3x + 1)$$

در داخل پرانتز حالا ضریب X ، مربيع کامل نیست پس از روش گفته شده در درسنامه برای تجزیه آن استفاده می‌کنیم یعنی ابتدا رو در جمله آخر (عدد ۱) ضرب می‌کنیم:

$$\frac{x}{2x^2 - 3x + 1} \Rightarrow x(x - 2)(x - 1) \quad \text{تجزیه با جمله مشترک}$$

حالا در یکی از پرانتزها، عدد ثابت رو بر ۲ تقسیم و در پرانتز دیگه، X رو در ۲ ضرب می‌کنیم:

$$(x - \frac{1}{2})(2x - 1) = (x - 1)(2x - 1) \quad \text{پس کل عبارت داده شده در متن سؤال به شکل } (x - 1)(2x - 1)(2x)(x - 1) \text{ تجزیه خواهد شد. بنابراین بر } (1) \text{ بخش پذیر است.}$$

روش دوم: **حلق رزاردوزی** می‌توانیم عبارت‌های موجود در گزینه‌ها را مساوی صفر قرار دهیم و مقدار X را به دست آوریم. این مقدار X را در چند جمله‌ای متن سؤال قرار می‌دهیم، اگر حاصل صفر شود چند جمله‌ای ما بر آن عبارت بخش پذیر است.

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \quad \text{گزینه (1)}$$

$$\frac{1}{2} - 6(-\frac{1}{2})^2 + 2(-\frac{1}{2}) \neq 0 \quad \text{در چند جمله‌ای متن سؤال قرار می‌دیم}$$

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{گزینه (2)}$$

$$\frac{1}{2} - 6(\frac{1}{2})^2 + 2(\frac{1}{2}) = 0 \quad \text{در چند جمله‌ای متن سؤال قرار می‌دیم}$$

پس حاصل چند جمله‌ای داده شده به ازای $x = \frac{1}{2}$ برابر صفر شد. لذا گزینه (2) درست است.

بین دو جمله، علامت تفاضل وجود دارد پس قطعاً باید از اتحاد مزدوج برای تجزیه آن استفاده کنیم:

$$\begin{array}{c} \text{تجزیه} \\ \text{با مزدوج} \\ \hline x^4 - 256 = (x^4 - 16)(x^4 + 16) = (x^3 - 4)(x^3 + 4)(x^4 + 16) \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{جذر} \quad \text{جذر} \quad \text{جذر} \quad \text{جذر} \quad \text{جذر} \quad \text{با مزدوج} \\ \text{با مزدوج} \end{array}$$

$$= (x - 2)(x + 2)(x^3 + 4)(x^4 + 16)$$

$$\begin{array}{c} d^2 - c^2 = 77 \Rightarrow (d - c)(d + c) = 77 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{تجزیه با مزدوج} \end{array}$$

$$\Rightarrow d + c = \frac{77}{\sqrt{7}} = 11 \Rightarrow c^2 + d^2 + 2cd = (c + d)^2 = 11^2 = 121$$

دقت دارید که چون $d - c = -7$ است لذا $d - c = 7$ خواهد بود.

$$\begin{array}{c} x^3 \text{ رامی توانیم به شکل } (x^3)^2 \text{ در نظر بگیریم پس در عبارت } 1 - 2x^3 - 2x^2 + 1 \text{ جمله مشترک } X \text{ است حالا به کمک اتحاد جمله مشترک، دنبال دو عدد می‌گردیم که ضربشان ۱ و جمعشان ۲ شود. این دو عدد } (-1) \text{ و } (1) \text{ هستند:} \\ (x^3 - 1)(x^3 + 1) = (x^2 - 1)(x^2 + 1) \quad \text{تجزیه با مزدوج} \end{array}$$

$= (x - 1)(x + 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)^2(x + 1)^2$
البته به کمک اتحاد دوم هم می‌توانستیم عبارت را تجزیه کنیم.

در درسنامه گفتیم که اگر $\Delta = 0$ باشد، می‌توانیم عبارت را به شکل توان دوم مجموع دو جمله (یا تفاضل دو جمله) بنویسیم:
 $5x^2 + mx + 1 = \Delta = 0 \Rightarrow b^2 - 4ac = 0$

$$\Rightarrow m^2 - 4(5)(1) = 0 \Rightarrow m^2 = 200 \Rightarrow m = \pm \sqrt{200} = \pm 10\sqrt{2}$$

ولی جواب $10\sqrt{2}$ در گزینه‌ها وجود ندارد.

$$4x^2 - y^2 = 12 \quad \text{تجزیه با مزدوج} \Rightarrow (2x - y)(2x + y) = 12$$

$$\frac{2x - y = 6}{2x + y = 2} \Rightarrow 6(2x + y) = 12 \Rightarrow 2x + y = \frac{12}{6} = 2$$

$$\begin{array}{l} 2x - y = 6 \\ + 2x + y = 2 \\ \hline 4x = 8 \Rightarrow x = 2 \end{array} \Rightarrow 2(2) - y = 6 \Rightarrow y = 4 - 6 = -2$$

بنابراین $x + y = 2 + (-2) = 0$ می‌باشد.

$$a^2 - 4b^2 + 15 = a^2 - 4b^2 = 15 \Rightarrow (a - 2b)(a + 2b) = 15$$

$$\frac{a - 2b = 5}{a + 2b = 3} \Rightarrow 5(a + 2b) = 15 \Rightarrow a + 2b = \frac{15}{5} = 3$$

حالا از دو رابطه موجود، مقادیر a و b را می‌یابیم:

$$\begin{cases} a - 2b = 5 \\ a + 2b = 3 \end{cases} \Rightarrow 2a = 8 \Rightarrow a = 4 \Rightarrow 4 - 2b = 5 \Rightarrow 2b = 4 - 5 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a^2 - 2b = 4^2 - 2(-\frac{1}{2}) = 16 + 1 = 17$$

۴ ۲۹

$$(x^2 - 4x + 2)^2 + 3(x^2 - 4x + 2) + 2$$

روش اول:

$$\text{تجزیه با جمله مشترک} ((x^2 - 4x + 2) + 1)((x^2 - 4x + 2) + 2)$$

$$= (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 4x + 4) = (x - 1)(x - 3)(x - 2)$$

تجزیه با اتحاد دوم تجزیه با جمله مشترک

 بنابراین بر $(x + 1)$ بخش پذیر نیست.

روش دوم: اگر طبق روش تستی گفته شده (قلق زباندویی) عمل کنیم، متوجه

می شویم که مقدار عبارت متن سؤال به ازای $-1 = X$ صفر نمی شود -1 ریشه^۱ گرینه (4) است (ولی مقدار آن به ازای $1 = X = 2$ ، $X = 3$ و $X = 4$ همگی برابر صفر است. پس عبارت داده شده فقط بر $(x + 1)$ بخش پذیر نیست.

۴ ۳۰

$$(x^2 - 6x - 4)^2 - 144 = (x^2 - 6x - 4)^2 - 12^2$$

تجزیه با اتحاد

$$= (x^2 - 6x - 4 + 12)(x^2 - 6x - 4 - 12)$$

$$= (x^2 - 6x + 8)(x^2 - 6x - 16) = (x - 4)(x - 2)(x - 8)(x + 2)$$

 تجزیه با جمله مشترک
جمله مشترک

 بنابراین در تجزیه عبارت، عامل $(x + 4)$ وجود ندارد.

۴ ۳۱

$$\frac{x^2 - x^1}{2x^3 - x^2 - 8x + 4} = \frac{\text{فاکتور از } (-4)}{\text{فاکتور از } (2x-1)} \cdot \frac{(2x-1)}{x^2(2x-1) - 4(2x-1)}$$

$$= (2x - 1) \cdot (x^2 - 4) = (2x - 1)(x - 2)(x + 2)$$

تجزیه با اتحاد

 بنابراین بر $(2x + 1)$ بخش پذیر نیست.

روش اول:
روش دوم: اگر به روش تستی عمل کنیم متوجه می شویم که ریشه گرینه (4) یعنی $X = \frac{-1}{2}$ عبارت داده شده در متن سؤال را به صفر تبدیل نمی کند، پس این عبارت بر $(2x + 1)$ بخش پذیر نیست. ولی چند جمله ای متن سؤال به ازای $x = \frac{1}{2}$ و $x = 2$ برابر صفر می شود؛ پس این عبارت بر تمام عبارت های $2x - 2$ و $x + 2$ بخش پذیر است.

۴ ۳۲

$$a(a+2) + 4b(b+1) + 4ab = a^2 + 2a + 4b^2 + 4b + 4ab$$

مربع دو جمله ای

$$= (a^2 + 4b^2 + 4ab) + 2(a + 2b) = \underbrace{(a + 2b)^2}_{3} + \underbrace{2(a + 2b)}_{3}$$

$$= 9 + 6 = 15$$

۴ ۳۳

$$x^2 - (x - 1)(x^2 - x + 3) - x = \frac{\text{فاکتور از } (-1)}{\text{فاکتور از } x} \cdot x(x - 1) - (x - 1)(x^2 - x + 3)$$

$$= -(x - 1)(x^2 - x + 3 - x) = -(x - 1)(x^2 - 2x + 3)$$

تذکر: عبارت $(x^2 - 2x + 3)$ قابل تجزیه نیست چون دلتای آن منفی می شود.

تجزیه با جمله مشترک

$$x^4 - 3x^2 - 4 = (x^2)^2 - 3x^2 - 4 = (x^2 + 1)(x^2 - 4)$$

$$= (x^2 + 1)(x - 2)(x + 2)$$

 بنابراین بر $(x + 1)$ بخش پذیر نیست.

۴ ۲۴

$$(x^2 - 12)^2 - (4x)^2 = (x^2 - 12 - 4x)(x^2 - 12 + 4x)$$

تجزیه به کمک اتحاد مزدوج

$$= (x^2 - 4x - 12)(x^2 + 4x - 12) = (x - 6)(x + 2)(x + 6)(x - 2)$$

تجزیه با جمله مشترک

تجزیه با جمله مشترک

 از بین گرینه ها فقط عبارت $(x + 3)$ در تجزیه شده عبارت مشاهده نمی شود.

۴ ۲۵

 عبارت $16x^4$ مربع کامل است و جذر آن برابر می شود با $4x^2$ ، پس باید

 از دل جمله $24x^2$ عبارت $4x^2$ را بکشیم بیرون. پس $24x^2$ را به شکل

 $(4x^2)^6$ نویسیم و از اتحاد جمله مشترک برای تجزیه این سه جمله ای استفاده می کیم:

$$16x^4 + 24x^2 - 7 = (4x^2)^2 + 6(4x^2) - 7 = (4x^2 - 1)(4x^2 + 7)$$

تجزیه با مزدوج

$$= (2x - 1)(2x + 1)(4x^2 + 7)$$

۴ ۲۶

$$a(a - 2)(a - 3) \underset{-4}{\cancel{-4a + 8}} = a(a - 2)(a - 3) - 4(a - 2)$$

$$\underset{(a-2)}{\cancel{\text{فاکتور از }}} (a - 2)(a(a - 3) - 4) = (a - 2) \underset{(a^2 - 3a - 4)}{\cancel{(a^2 - 4a - 12)}}$$

تجزیه با جمله مشترک

$$= (a - 2)(a + 1)(a - 4)$$

 بنابراین در تجزیه عبارت، عامل $(a - 1)$ وجود ندارد.

۴ ۲۷

$$a(a - 3)(a - 4) \underset{-12}{\cancel{-12a + 36}} = a(a - 3)(a - 4) - 12(a - 3)$$

$$\underset{(a-3)}{\cancel{\text{فاکتور از }}} (a - 3)(a(a - 4) - 12) = (a - 3) \underset{(a^2 - 4a - 12)}{\cancel{(a^2 - 3a - 4)}}$$

تجزیه با جمله مشترک

$$= (a - 3)(a + 2)(a - 6)$$

 بنابراین در تجزیه عبارت، عامل $(a - 2)$ وجود ندارد.

۴ ۲۸

 عبارت $(x^2 + x)$ دوبار تکرار شده، پس جمله مشترک خواهد بود. پس $x^2 + x$

 رادر هر دو پرانتز قرار می دهیم حال به دنبال دو عدد هستیم که ضربشان -2 و

 جمعشان -1 شود که عبارتنداز -2 و $+1$:

$$(x^2 + x)^2 - 1(x^2 + x) - 2 = ((x^2 + x) + 1)((x^2 + x) - 2)$$

$$= (x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = (x^2 + x + 1)(x + 2)(x - 1)$$

تجزیه با جمله مشترک

 بنابراین تنها بر $(x + 2)$ بخش پذیر است.

۱۴۲

روش اول: در صورت کسر از $(x^2 - 4)^2$ فاکتور می‌گیریم:

$$\begin{aligned} \text{عبارت} &= \frac{\cancel{x^2 - 4}^2(-3x + (x^2 - 4))}{\cancel{x^2 - 4}^2(x+1)} = \frac{\overbrace{x^2 - 3x - 4}^{\text{تجزیه با جمله مشترک}}}{x+1} \\ &= \frac{(x-4)(x+1)}{(x+1)} = x-4 \end{aligned}$$

روش دوم (عددگذاری): می‌توانیم به جای x ها یک عدد دلخواه مثل

$$x = 0 \quad \text{قرار دهیم:} \\ \begin{aligned} \text{در سر قرار بده} &\quad \text{صفر} \\ x = 0 &= \frac{-6(0)(-4)^2 + 2(-4)^3}{2(-4)^2(1)} = \frac{2(-64)}{2(16)} = -4 \end{aligned}$$

حالا در گزینه‌ها هم به جای x ها عدد صفر را قرار می‌دهیم فقط حاصل گزینه «۴» برابر -4 می‌شود.

۱۴۳

ابتدا صورت و مخرج را تا حد امکان تجزیه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{\text{فاکتور از } ab^2 + a^3b + 2a^2b^2}{\text{فاکتور از } a^3b - ab^3} &= \frac{\text{تجزیه با اتحاد اول}}{\text{تجزیه با مزدوج}} \\ &= \frac{ab(b^2 + a^2 + 2ab)}{ab(a^2 - b^2)} = \frac{(a+b)^3}{(a-b)(a+b)} \\ &= \frac{a+b}{a-b} \quad \frac{a=\sqrt{-1}}{b=\sqrt{-1}} \quad \frac{\sqrt{-1}+1+\sqrt{-1}-1}{\sqrt{-1}+1-\sqrt{-1}+1} = \frac{2\sqrt{-1}}{2} = \sqrt{-1} \end{aligned}$$

۱۴۴

$$\frac{x^2 + 3x}{x^2 + 3x + 2} - \frac{5x + 3}{x+1} = \frac{x(x+3)}{(x+1)(x+2)} - \frac{5x+3}{x+1}$$

$$= \frac{x(x+3) - (x+2)(5x+3)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x^2 + 3x - (5x^2 + 3x + 10x + 6)}{(x+1)(x+2)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2 + 3x - 5x^2 - 13x - 6}{(x+1)(x+2)} = \frac{\overbrace{-4x^2 - 10x - 6}^{\text{فاکتور از منفی}}}{(x+1)(x+2)} \\ &= \frac{-((2x)^2 + 5(2x) + 6)}{(x+1)(x+2)} = \frac{-(2x+3)\overbrace{(2x+2)}^{2(x+1)}}{(x+1)(x+2)} = \frac{-2(2x+3)}{x+2} \end{aligned}$$

روش دوم:

قلق زردوزی در تست‌های مربوط به ساده‌کردن عبارت‌های گویا یا اعمال جبری روی عبارت‌های گویا می‌توانیم به جای تجزیه عبارت‌ها از عددگذاری استفاده کنیم. یعنی به متغیر، عددی دلخواه را نسبت می‌دهیم به شرطی که مخرج هیچ کسری صفر نشود، سپس همان عددی را که به متغیردادیم در گزینه‌های نیز به جای متغیرها قرار می‌دهیم و گزینه درست را انتخاب می‌کنیم.

همان طور که گفتیم می‌توانیم از روش عددگذاری هم استفاده کنیم. مثلاً به

عدد ۱ را نسبت می‌دهیم:

$$\frac{1^2 + 3(1)}{1^2 + 3(1) + 2} - \frac{5(1) + 3}{1+1} = \frac{4}{6} - \frac{8}{2} = \frac{-20}{6} = \frac{-10}{3}$$

۱۴۳

$$\begin{aligned} 12x^2 - 12x - 9 &= 3((4x^2 - 4x - 3) = 3((2x)^2 - 2(2x) - 3) \\ &= 3(2x+1)(2x-3) \\ 16x^2 + 16x + 4 &= 4(4x^2 + 4x + 1) = 4(2x+1)^2 \\ \Rightarrow \text{ب.م.م.} &= (2x+1) \end{aligned}$$

۱۴۴

ابتدا دو عبارت را تجزیه می‌کنیم:

$$\begin{cases} x^4 + x^3 - 2x^2 = x^2(x^2 + x - 2) = x^2(x-1)(x+2) \\ x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1) = x(x-1)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{ب.م.م.} = x^2(x-1)^2(x+2)$$

۱۴۵

$$\begin{cases} x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2) \\ \text{تجزیه با مزدوج} \\ x^4 + x^2 - 2 = (x^2 - 1)(x^2 + 2) = (x-1)(x+1)(x^2 + 2) \\ \text{تجزیه با جمله مشترک} \\ \Rightarrow \text{ب.م.م.} = (x^2 + 2) \end{cases}$$

۱۴۶

$$\begin{cases} \text{تجزیه با مزدوج} \\ x^3 - 9x = x(x^2 - 9) = x(x-3)(x+3) \\ 3x - 9 = 3(x-3) \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \text{ب.م.م.} = 3x(x-3)(x+3) \quad B = \text{ب.م.م.} = (x-3)$$

$$\Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{3x(x-3)(x+3)}{(x-3)} = 3x(x+3) \Rightarrow \frac{A}{B} = 3x^2 + 9x$$

۱۴۷

ابتدا عبارت‌ها را تجزیه می‌کنیم:
گزینه‌های (۱) و (۳) عبارت گویا نیستند. چون x در آن‌ها داخل قدرمطلق یا زیر رادیکال است. گزینه (۲) به ازای $x = 0$ (ریشهٔ مخرج) تعریف نمی‌شود. در گزینه (۴) مخرج کسر را مساوی صفر قرار می‌دهیم:

همواره تعريف شده است. $\Rightarrow x^2 = -1 \Rightarrow x = \pm i$ \Rightarrow جواب ندارد

۱۴۸

ریشهٔ مخرج است: $x = -1$

$$x(2x-m) = 0 \xrightarrow{x=-1} -1(2(-1)-m) = 0 \Rightarrow -(-2-m) = 0$$

$$\Rightarrow 2+m = 0 \Rightarrow m = -2$$

$$\frac{mx^2 + x - 2}{x(2x-m)} = \frac{-2x^2 + x - 2}{x(2x-(-2))} = \frac{-2x^2 + x - 2}{x(2x+2)}$$

$$\xrightarrow{x=1} \frac{-2+1-2}{1(2+2)} = \frac{-3}{4}$$

۱۴۹

گفته شده $x = -1$ عبارت را تعريف نشده می‌کند یعنی باید مخرج را مساوی صفر قرار داده و به جای x آن عدد -1 را قرار دهیم:
 $x+b = 0 \xrightarrow{x=-1} -1+b = 0 \Rightarrow b = 1$

ضمناً عبارت گویا به ازای $x = -1$ برابر $\frac{1}{3}$ می‌شود پس همه جاعد (۱) را به جای x ها قرار می‌دهیم و حاصل کسر را مساوی با $\frac{1}{3}$ می‌گذاریم:

$$\frac{x+a}{x+b} = \frac{x+a}{x+1} \xrightarrow{x=-1} -\frac{1}{2} = \frac{1+a}{1+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1+a}{2} = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1+a = -1 \Rightarrow a = -1-1 = -2$$

$$\text{عبارت} = \frac{(2x+1)^4}{x(2x+1)} \div \left(\frac{x^2 - 2x - x^2 - 1}{x} \right)$$

$$= \frac{2x+1}{x} \div \left(\frac{-(2x+1)}{x} \right)$$

$$= \frac{2x+1}{x} \times \frac{x}{-(2x+1)} = -1$$

$$(2x+1 - \frac{3}{x}) \div (2 + \frac{1}{x+1}) = \frac{x(2x+1) - 3}{x} \div \frac{2(x+1) + 1}{x+1}$$

$$= \frac{2x^2 + x - 3}{x} \times \frac{x+1}{2x+2+1} = \frac{2x^2 + x - 3}{x} \times \frac{x+1}{2x+3}$$

$$\frac{(2x+3)(x-1)}{x} \times \frac{x+1}{2x+3} = \frac{\overbrace{(2x+3)(x-1)(x+1)}^{\text{اتحاد مزدوج}}}{x(2x+3)} = \frac{x^2 - 1}{x}$$

$$= \frac{x^2}{x} - \frac{1}{x} = x - \frac{1}{x}$$

لذکر در مرحله آخر، از خاصیت زیر در کسرها استفاده کردیم:

$$\frac{A \pm B}{C} = \frac{A}{C} \pm \frac{B}{C}$$

۱۴۹

حال در گزینه های زیر جای x هاعددا را می گذاریم. جواب باید $\frac{-1}{3}$ شود. فقط جواب عبارت گزینه (۳) برابر $\frac{-1}{3}$ می شود (بقیه گزینه ها را خودتون امتحان کنید).

$$\text{گزینه (۳)}: \frac{-2(2x+3)}{x+2} = \frac{-2(2(1)+3)}{1+2} = \frac{-1}{3}$$

شماگرد: استاد اگه حاصل دو تا گزینه برابر $\frac{-1}{3}$ شد چی؟

دیگر: اون وقت عددی که به x دادی رو عوض کن مثلًا x رو با 3 فرض کن قطعاً مشکل حل می شه. در تمام سؤالات بعدی، میشه از روش عددگذاری هم استفاده کرد.

۱۴۰

$$\frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+1} - \frac{4x-2}{\underbrace{x^2-1}_{(x-1)(x+1)}} \text{ مخرج مشترک بگیر}$$

$$\frac{x(x+1) + 3(x-1) - 4x + 2}{(x-1)(x+1)}$$

$$= \frac{x^2 + 3x - 3 - 4x + 2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2 - 1}{(x-1)(x+1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)} = 1$$

$$\text{۱۴۱} \quad \text{عبارت} = \frac{2a}{(a-2b)(a+2b)} + \frac{1}{a+2b} - \frac{1}{a-2b}$$

$$= \frac{2a+a-2b-(a+2b)}{(a-2b)(a+2b)} = \frac{2a-4b}{(a-2b)(a+2b)}$$

$$= \frac{2(a-2b)}{(a-2b)(a+2b)} = \frac{2}{a+2b}$$

$$\text{۱۴۲} \quad \text{عبارت} = \frac{x(2x-1)}{(2x-1)(2x+1)} + \frac{x-1}{2x+1} - \frac{2x+1}{2x-1}$$

$$= \frac{x(2x-1) + (x-1)(2x-1) - (2x+1)(2x+1)}{(2x+1)(2x-1)}$$

$$= \frac{4x^2 - 4x + 1 - 4x^2 - 4x - 1}{4x^2 - 1} = \frac{-8x}{4x^2 - 1} \Rightarrow P(x) = -8x$$

۱۴۳ **تجزیه با جمله مشترک**

$$\text{عبارت} = \frac{x(\underbrace{x^2 + 3x + 2}_{x(x+1)(x+2)})}{x(x+1)(\underbrace{x^2 - 4}_{x(x-2)})} - \frac{2}{x(x-2)}$$

تجزیه با مزدوج

$$= \frac{x(x+1)(x+2)}{x(x+1)(x-2)(x+2)} - \frac{2}{x(x-2)}$$

$$= \frac{1}{x-2} - \frac{2}{x(x-2)} = \frac{x-2}{x(x-2)} = \frac{1}{x}$$

۱۴۴ **عبارت** = $\frac{x+2}{(x+2)(x-1)} - \frac{2x}{x(x-1)(x+1)}$

$$= \frac{x+1-2}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1}$$

$$(x - \frac{x+6}{x-4})(\frac{x^2+9}{x+1} - 5)$$

$$= (\frac{x(x-4)-(x+6)}{x-4})(\frac{x^2+9-5(x+1)}{x+1})$$

$$= \frac{x^2-4x-x-6}{x-4} \times \frac{x^2+9-5x-5}{x+1} = \frac{x^2-5x-6}{x-4} \times \frac{x^2-5x+4}{x+1}$$

$$= \frac{(x+1)(x-6)}{x-4} \times \frac{(x-1)(x-4)}{(x+1)}$$

$$= \frac{(x+1)(x-6)(x-1)(x-4)}{(x-4)(x+1)} = \overbrace{(x-6)(x-1)}^{\text{ضرب می کنیم}} = x^2 - 7x + 6$$

۱۴۶۱

تمام جملات را در 20° ضرب می‌کنیم تا مخرج‌ها حذف شوند:

$$20 \cdot \left(\frac{2x-1}{5} - \frac{1-2x}{4} = 3 \right) \Rightarrow 4(2x-1) - 5(1-2x) = 60$$

$$\Rightarrow 8x - 4 - 5 + 10x = 60$$

$$\Rightarrow 18x = 60 + 4 + 5 \Rightarrow 18x = 69 \Rightarrow x = \frac{69}{18}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{69}{18}}{1} = \frac{69}{2 \times 18} = \frac{69}{36}$$

طول و عرض مستطیل را به ترتیب x و y در نظر می‌گیریم، بنابراین عرض مستطیل برابر با $y = \frac{x}{2}$ است و داریم:

$$\text{محیط} = 2(x+y) = 2\left(x + \frac{X}{2}\right) = 2 \times \frac{3}{2}x = 3x$$

$$\xrightarrow{\text{محیط}=15} 3x = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{3} = 5$$

$$\Rightarrow y = \frac{x}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$\text{عرض} - \text{طول} = 5 - 2.5 = 2.5$$

$$\text{محیط} = (x+4) + x + (2x-1) = 3x + 3 = 3x$$

$$\Rightarrow 4x = 3x + 3 \Rightarrow 4x = 32 \Rightarrow x = \frac{32}{4} = 8$$

$$= 15 \quad \begin{matrix} 2(8)-1, 8, 8+4 \\ 15 \quad 12 \end{matrix} \quad \text{؛ اضلاع مثلث}$$

۱۴۶۲

$$\left(2 + \frac{x^2}{x-4} \right) \div \left(1 + \frac{1}{x-4} \right) = \frac{2(x-4)+x^2}{x-4} \div \frac{x-4+1}{x-4}$$

$$= \frac{2x-8+x^2}{x-4} \div \frac{x+1}{x-4} = \frac{x^2+2x-8}{x-4} \times \frac{x-4}{x+1}$$

$$= \frac{(x-2)(x+4)(x-1)}{(x+4)(x+1)} = x-2$$

۱۴۶۳

$$\left(1 - \frac{2}{x^2+x^2} \right) \left(1 + \frac{2}{x^2-1} \right) - \frac{2}{x^2} = \frac{x^4+x^2-2}{x^4+x^2} \times \frac{x^2-1+2}{x^2-1} - \frac{2}{x^2}$$

$$= \frac{(x^2+2)(x^2-1)(x^2+1)}{x^2(x^2+1)(x^2-1)} - \frac{2}{x^2} = \frac{x^2+2}{x^2} - \frac{2}{x^2}$$

$$= \frac{x^2+2-2}{x^2} = \frac{x^2}{x^2} = 1$$

۱۴۶۴

$$\text{عبارت} = \frac{(2x-3)^2}{2(2x-2)} \div \frac{2x-4x+3}{x}$$

$$= \frac{2x-3}{2} \times \frac{x}{-2x+3} = \frac{2x-3}{2} \times \frac{x}{-(2x-3)} = -\frac{x}{2}$$

معادله درجه دوم

۱

۱۴۶۵

روش اول: ابتدا معادله را تا حد امکان ساده می‌کنیم:

$$(x+1)^2 + (x+2)^2 = 2x(x-1) + 3$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 + x^2 + 4x + 4 = 2x^2 - 2x + 3$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 6x + 5 = 2x^2 - 2x + 3$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 6x - 2x^2 - 2x = 3 - 5 \Rightarrow 4x = -2 \Rightarrow x = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

روش دوم:

نکته تستی در این گونه سوالات می‌توانیم اعداد گزینه‌ها را به جای x های معادله قرار دهیم؛ اگر به ازای یک عدد مشخص، دو طرف معادله با هم برابر شدند، می‌گوییم آن عدد، ریشه معادله است.

اعداد گزینه‌هارا به جای x های معادله قرار می‌دهیم، فقط به ازای $\frac{-1}{4}$

دو طرف معادله با هم مساوی می‌شوند؛ پس جواب معادله $\frac{1}{4}$ است.

۱۴۶۶

پرانتزها رو در هم ضرب می‌کنیم

$$(x-1)(x^2+x+1) = x(x^2-2)$$

$$\Rightarrow x^3 + x^2 + x - x^3 - x - 1 = x^3 - 2x \Rightarrow x^3 - 1 = x^3 - 2x$$

$$\Rightarrow x^3 - x^3 + 2x = 1 \Rightarrow 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

۱۴۶۷

جواب معادله در معادله صدق می‌کند:

$$mx + m - 1 = 1 + \frac{x}{2} \xrightarrow{x=2} 2m + m - 1 = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\Rightarrow 3m - 1 = 2 \Rightarrow 3m = 2 + 1 \Rightarrow 3m = 3 \Rightarrow m = \frac{3}{3} = 1$$