

مقدمه ناشر

قطعاً بیشترین علامتهایی که در درس‌های ریاضی (به‌خصوص حسابان) دیده می‌شود ایناست: $=$ ، \neq ، $>$ و $<$. به جورایی می‌شه گفت ریاضی بیشتر دنبال اینه که بگه چی با چی مساویه، چی با چی مساوی نیست. تساوی‌های مطلق ریاضی، دقیق و براساس منطق جبری و مولای درزش نمی‌ره. به نظرم یکی از چیزایی که ریاضی رو جذاب کرده، همینیه که برابریش واقعاً برابریه!

اما تساوی بازی‌ها، تساوی حقوق آدم‌ها، تساوی همگان در برابر قانون و ...!

برابری‌هایی که خیلی وقتاً برابر نیستند! مثلاً می‌بینید که دو تیم با هم مساوی می‌کنن، ولی یکیشون حذف می‌شه. اون یکی می‌ره مرحله بعد. می‌گن بازی با تساوی به پایان رسید، ولی به دلیل گل زده بیشتر در خانۀ حریف، فلان تیم می‌ره مرحله بعد! خب پس در واقع منظورشون اینه که این بازی مساوی، مساوی نشده! داوری و ناداوری و سلیقه شخصی و ... رو هم اضافه کنید به این داستان. از این مثال تو بازی‌ها و مسابقات فراوانه. اوضاع توی تساوی آدم‌ها و حق و حقوقشون خیلی پیچیده‌تر و عجیب‌تره؛ به قول جورج اورول در کتاب قلعه حیوانات (که کتابی بس جذاب است):

all animals are equal but some animals are more equal than others!

بی‌خیال تا گیج‌تر نشدم بریم سر همون ریاضی خودمون که لااقل راست و حسینی مساویش مساویه، نامساویش هم نامساوی! ممنونم از رسول محسنی‌منش و علی شهبابی که با نوشتن این کتاب فرصتی برای موفقیت بیشتر علاقه‌مندان به ریاضی را فراهم کردند و همین‌طور ممنونم از مسعود شفیعی، سروش موبینی و کوروش اسلامی که در تألیف این کتاب نقش مؤثری داشتند.

ممنونم از آقای محسن فراهانی و کیوان صارمی عزیز که برای آماده‌شدن این کتاب از قدیم تا الان واقعاً جنگیدند.

ممنونم از خانم زهرا خردمند و یگانه فلاحتی به خاطر زحماتی که برای این کتاب کشیدند.

ممنونم از ویراستاران خوبمون که می‌دونم تمام تلاششون رو کردن تا کتاب بی‌غلط بشه.

ممنونم از تیم منسجم و منظم تولیدمون که در خاورمیانه همتا ندارن!

ما دوستتون داریم < آن‌چه شما فکر می‌کنید

مقدمه مؤلفان

با همه عطف دامنتم از صبا عجب کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی‌کند (مافظ)

آدم باید این جوری عاشق باشد، حتی حساب تغییر علامت مشتق دوم (f'') دامن معشوقش را هم داشته باشد! این کتاب هم برای عاشقان ریاضی و مهندسی نوشته شده است، آن هم با عشق زیاد به یاد دادن! به کتاب حسابان ۲ خوش آمدید.





نحوه استفاده از کتاب:

الف اگر به مدرسه یا کلاس می‌روید، در مورد نحوه استفاده از کتاب حتماً از معلمان بپرسید. ما به شدت اعتقاد داریم که «درس معلم زمزمه محبت و موفقیت است»، با راهنمایی معلمان در مورد ترتیب خواندن درس‌نامه‌ها و حل کردن تست‌ها و بررسی پاسخ‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا کنید.


ب اگر به شکل خودآموز از کتاب استفاده می‌کنید، توصیه ما این است که: **۱** اول درس‌نامه را خوب و کامل بخوانید. **۲** چیزهایی که از درس‌نامه مهم است مشخص کنید یا برای خودتان یادداشت بردارید و خلاصه کنید. **۳** یک بار دیگر فقط تست‌های درس‌نامه را حل کنید. **۴** بروید سراغ تست‌ها، پاسخ تست‌ها را اول از پاسخ‌نامه کلیدی چک کنید و بعد بروید پاسخ‌ها را بخوانید. خیلی از وقت‌ها خواندن پاسخ تست‌هایی که درست حل کرده‌اید هم بسیار کمکتان می‌کند.


ساختار کتاب:

۱ این کتاب مثل کتاب درسی‌تان، ۵ فصل دارد با همان ترتیب. در اول هر فصل مباحث مهم و پرسؤال و مباحث پیش‌نیاز را آورده‌ایم. حواستان باشد که وقتی می‌گوییم پیش‌نیاز، منظورمان این است که بهتر است روش‌های اصلی و مطالب بنیادی فصل‌های پیش‌نیاز را قبل از خواندن فصل مورد نظر بلد باشید.

۲ در تست‌های هر درس، کنار تست‌های عادی یک آیکن  گذاشته‌ایم. قرار است شما بعد از حل تست‌ها و بررسی پاسخ‌نامه این آیکن‌ها را به  یا  یا  تبدیل کنید: یعنی تست آسان. یعنی تست متوسط. یعنی تست دشوار.

این نمادگذاری باعث می‌شود تا بعداً که خواستید فصل را دوره کنید، بتوانید تصمیم بگیرید که از کدام تست‌ها برای این کار استفاده کنید و روی سؤال‌ها با نماد مورد نظر تمرکز کنید تا خوب یادشان بگیرید. (البته برای این‌ها از هر نماد دیگری هم که خودتان می‌خواهید می‌توانید استفاده کنید، چون هدف اصلی این است که بتوانید بعداً به این سؤال‌ها برگردید.)

۳ برای بعضی از تست‌ها هم نماد  را داریم که نشان‌دهنده تست‌های دشوار یا ترکیبی است. این تست‌ها مختص دانش‌آموزان علاقه‌مند است و قرار نیست همه دانش‌آموزان به این تست‌ها پاسخ دهند.

۴ نماد کنار بعضی از تست‌ها به رنگ قرمز  آمده است. این‌ها تست‌های نشان‌دار برای دوره سریع فصل هستند و دوتا کاربرد دارند: **الف** دوره و جمع‌بندی فصل **ب** اگر قبل از یک آزمون وقت خیلی کمی دارید، می‌توانید فقط این تست‌ها را حل کنید. ما معتقدیم که جمع‌بندی واقعی با این روش انجام می‌شود نه با جدول و نمودار و ...!

۵ در تست‌ها کامنت‌هایی می‌بینید. این‌ها صرفاً برای یک یادآوری ساده مطالب درس‌نامه یا یک اشاره کوچک به استراتژی حل تست است.

۶ در درس نامه و پاسخ تست‌ها، آیکن‌های زیر را می‌بینید:

نماد آیکن	توضیح
	یه مفهوم مطلب، رابطه، فرمول یا ... است که باید بدانید تا بتوانید سؤال را سریع‌تر و بهتر حل کنید.
	مثل یک تلنگر است که به شکل درست و مفهومی به سؤال نگاه کنید. گاهی وقت‌ها هم در اشاره : سؤالی پرسیده‌ایم که باعث می‌شود بیشتر با مفاهیم سؤال درگیر شوید.
	همان‌طور که از اسمش پیداست یک یادآوری سریع در مورد مفهوم، فرمول، رابطه یا ... آن مبحث درسی است.
راه اول: راه دوم: عددگذاری:	اگر سؤالی دو راه حل داشته، سعی کردیم هر دو راه (حتی بیشتر!) را بیاوریم. بعضی وقت‌ها هم یکی از راه‌های حل‌مان، عددگذاری بوده است. البته حواسمان بوده که در استفاده از این روش، افراط نکنیم.

۷ در درس‌نامه کتاب سعی کرده‌ایم از جدول، نمودار، دسته‌بندی و هر چیزی که باعث می‌شود درس را بهتر و مؤثرتر یاد بگیرید استفاده کنیم. حواستان باشد که برای بررسی بعضی از جدول‌ها باید حسابی وقت بگذارید.

۸ تک‌تک مثال‌ها و تست‌های درس‌نامه به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که اولاً کاربرد نکته‌ها و مفاهیم گفته‌شده را ببینید و یاد بگیرید و ثانیاً نمونه‌های اصلی و پرتکرار تست‌های کنکور را ببینید. باز هم توصیه می‌کنیم بعد از این که درس‌نامه هر درس را خوب و کامل خواندید، برگردید و یک بار دیگر تست‌های درس‌نامه را حل کنید.

۹ در تست‌ها، سؤالات کنکورهای جدید و سؤالاتی شبیه کنکورهای جدید آورده‌ایم که آن‌ها را با آدرس **«مثل کنکور»** مشخص کرده‌ایم. هم‌چنین تعدادی از سؤالات ایده‌دار **آزمون‌های آزمایشی خیلی سبز** را هم برایتان آورده‌ایم. همه این‌ها باعث می‌شود کتابمان پوشش بیشتری از نظر **ایده‌های جدید** داشته باشد.

۱۰ برای هر کدام از فصل‌ها برایتان آزمون با پاسخ تشریحی آماده کرده‌ایم. برای استفاده از این‌ها کافی است QRCode صفحه شناسنامه را اسکن کنید. فقط توصیه اکیدمان این است که وقتی بروید سراغ این آزمون‌ها که تمام مطالب لازم را خوب خوانده، یاد گرفته و دوره کرده باشید. **توصیه** ما برای استفاده از پاسخ‌نامه (که در انتهای کتاب آمده است) این است:

الف تعداد مشخصی تست برای یک نشست انتخاب و حل کنید (مثلاً ۳۰ تا).

ب درستی پاسخ‌ها را از روی پاسخ‌نامه کلیدی بررسی کنید.

پ برگردید و سعی کنید تست‌هایی را که جواب نداده‌اید یا غلط زده‌اید، دوباره حل کنید (این بار بدون محدودیت وقت).

ت بروید سراغ پاسخ‌نامه تشریحی، اول پاسخ تست‌هایی را که جواب نداده‌اید و یا غلط زده‌اید، ببینید و بعد از اینکه این‌ها را خوب فهمیدید و یاد گرفتید شروع کنید از اول نگاهی به همه پاسخ‌ها بیندازید. بررسی راه‌های اول و دوم پاسخ، **نکته**: ها، **اشاره**: ها و **عددگذاری**: باعث می‌شود به همه نکته‌ها و ریزه‌کاری‌های درس مسلط شوید.

تشکرنامه:

- تشکر از مهندس سبزمیدانی و مهندس شاهی عزیز
 - تشکر خیلی ویژه از مسعود شفیعی که در چینش تست‌های جدید خیلی کمک کرد.
 - تشکر از کیوان صارمی عزیز بابت همه دلسوزی‌ها و وقت‌گذاشتن‌هایش
 - تشکر از خانم فلاحی و خانم خردمند
 - تشکر ویژه از تمام دوستانمان در واحد تولید که زیبایی کتاب را مدیونشان هستیم.
- در آخر اگر اشتباه، غلط، جابه‌جایی یا ... در کتاب دیدید، حتماً برایمان بفرستید تا هم اصلاح و هم تشکر کنیم. از پیشنهادهایتان هم استقبال می‌کنیم.

فهرست

تست

درس نامه

فصل اول: تابع

۳۵	۱۰	درس ۱: تبدیل نمودارها (انتقال، قرینه‌یابی، انبساط و انقباض)
۴۳	۱۸	درس ۲: توابع چندجمله‌ای - تابع درجه ۳
۴۶	۲۱	درس ۳: توابع یکنوا (توابع صعودی و نزولی)
۵۰	۲۸	درس ۴: تقسیم

فصل دوم: مثلثات

۷۸	۵۶	درس ۱: توابع متناوب
۸۰	۵۹	درس ۲: نمودار توابع سینوسی و کسینوسی
۸۵	۶۳	درس ۳: تانژانت
۹۲	۶۹	درس ۴: معادله مثلثاتی

فصل سوم: حدهای نامتناهی - حد در بی‌نهایت - مجانب‌ها

۱۱۷	۹۹	درس ۱: حد بی‌نهایت
۱۲۱	۱۰۴	درس ۲: حد در بی‌نهایت
۱۲۷	۱۱۱	درس ۳: مجانب‌ها (قائم و افقی)

فصل چهارم: مشتق

۱۷۱	۱۳۴	درس ۱: آشنایی با مفهوم مشتق (تعریف مشتق)
۱۷۳	۱۳۸	درس ۲: قواعد مشتق‌گیری (تمام فرمول‌های مشتق)
۱۷۸	۱۴۵	درس ۳: مشتق‌گیری با چشم‌های باز (عامل صفرشونده - ساده‌کردن) - مشتق دوم
۱۸۲	۱۴۹	درس ۴: معادله خط مماس بر منحنی
۱۸۵	۱۵۳	درس ۵: مشتق چپ و راست - مشتق‌گیری در حضور براکت و قدرمطلق - نیم‌مماس چپ و راست
۱۸۷	۱۵۶	درس ۶: پیوستگی و مشتق‌پذیری (در نقطه و بازه)
۱۸۹	۱۵۷	درس ۷: نقاط مشتق‌ناپذیر - نقاط گوشه‌ای - مماس قائم
۱۹۳	۱۶۲	درس ۸: دامنه و نمودار تابع مشتق (رسم نمودار f')
۱۹۵	۱۶۵	درس ۹: مشتق تابع مرکب - قاعده هوییتال
۲۰۰	۱۶۸	درس ۱۰: آهنگ تغییر (متوسط و لحظه‌ای)

فصل پنجم: کاربرد مشتق

تست

درس نامه

۲۳۶	۲۰۳	درس ۱: بررسی یکنوایی تابع به کمک مشتق (آزمون مشتق اول)
۲۳۸	۲۰۷	درس ۲: نقطه بحرانی
۲۴۰	۲۱۱	درس ۳: اکسترم‌های نسبی
۲۴۴	۲۱۶	درس ۴: اکسترم‌های مطلق
۲۴۷	۲۱۹	درس ۵: بهینه‌سازی
۲۵۱	۲۲۳	درس ۶: تقعر و نقطه عطف
۲۵۷	۲۳۲	درس ۷: رسم نمودار (تابع درجه ۳ و ۴ و هموگرافیک)


پاسخ نامه

پاسخ نامه

۲۶۳	پاسخ نامه تشریحی
۴۶۹	پاسخ نامه کلیدی

درس ۳: توابع یکنوا

نمودار روبه‌رو را ببینید:



۱ هر وقت با حرکت روی نمودار در یک بازه، مقدار y افزایش پیدا کند (یا نمودار رو به بالا برود)، می‌گوییم تابع در آن بازه **صعودی** اکید است.

مثلاً بازه‌های $[-1, 0]$ و $[3, 8]$ در نمودار روبه‌رو.

۲ هر وقت با حرکت روی نمودار در یک بازه، مقدار y کاهش پیدا کند (یا نمودار رو به پایین برود)، می‌گوییم تابع در آن بازه **نزولی** اکید است.

مثلاً بازه‌های $[-4, -2]$ و $[1, 3]$ در نمودار بالا.

نکته: اگر تابعی در بازه‌ای **صعودی** اکید یا **نزولی** اکید باشد، می‌گوییم تابع در آن بازه **یکنوا** اکید است.

مثلاً نمودار رسم‌شده در بازه‌های $[-1, 0]$ ، $[-4, -2]$ ، $[1, 3]$ و $[3, 8]$ ، یکنوا اکید است.

صعودی اکید نزولی اکید نزولی اکید صعودی اکید

۳ هر وقت با حرکت روی نمودار در یک بازه، مقدار y افزایش پیدا کند یا ثابت بماند (نمودار رو به بالا یا ثابت باشد)، می‌گوییم تابع در آن بازه **صعودی** است. مثلاً بازه‌های $[-1, 0]$ و $[3, +\infty)$ در نمودار بالا.

۴ هر وقت با حرکت روی نمودار در یک بازه، مقدار y کاهش پیدا کند یا ثابت بماند (نمودار رو به پایین یا ثابت باشد)، می‌گوییم تابع در آن بازه **نزولی** است. مثلاً بازه‌های $[-4, 3]$ و $[8, +\infty)$ در نمودار بالا.

نکته: اگر تابعی در بازه‌ای **صعودی** یا **نزولی** باشد، می‌گوییم تابع در آن بازه **یکنوا** است.

مثلاً نمودار رسم‌شده در بازه‌های $[-1, 0]$ ، $[-4, 3]$ و $[3, +\infty)$ یکنوا است.

صعودی نزولی صعودی

اشاره: در تعریف تابع صعودی، در جمله «مقدار y افزایش پیدا کند یا ثابت بماند» به کلمه «یا» دقت کنید؛ یعنی هم‌گامش اتفاق بیفتد. صعودی است. حتی اگر فقط یک خط افقی باشد. (برای تابع نزولی، عکس همین جمله)

۵ اگر در بازه‌ای، نمودارمان یک خط افقی باشد، تابع در آن بازه ثابت است. مثلاً بازه‌های $[-2, 1]$ و $[8, +\infty)$ در نمودار بالا.

نکته: تابع ثابت تنها تابعی است که هم صعودی محسوب می‌شود و هم نزولی. پس اگر گفتند «تابع $f(x) = \sqrt{x}$ تابعی صعودی و نزولی است»، جمله درستی است.

اشاره: فرق بین «صعودی» و «صعودی اکید» در آن است که صعودی اکید فقط نمودار رو به بالا حرکت می‌کند ولی در صعودی، تابع می‌تواند هم رو به بالا برود و هم ثابت بماند (فقط حق ندارد رو به پایین برود). پس می‌توانیم نتیجه بگیریم «هر صعودی اکیدی، حتماً صعودی هم است» ولی عکسش درست نیست.


۶ اگر در بازه‌ای، قسمتی از نمودار صعودی اکید و قسمتی از آن نزولی اکید باشد، تابع در آن بازه غیر یکنوا است. مثلاً تابع رسم‌شده در بازه $[-6, -3]$ غیر یکنواست، چون در بازه $[-6, -4]$ صعودی اکید و در بازه $[-4, -3]$ نزولی اکید است.

+ جمع‌بندی

در جدول زیر خلاصه مطالب بالا را ببینید:

تعریف ریاضی	مثال نموداری	وضعیت نمودار	نوع یکنوایی
$a > b \Leftrightarrow f(a) > f(b)$		فقط رو به بالا می‌رود.	صعودی اکید
$a > b \Leftrightarrow f(a) < f(b)$		فقط رو به پایین می‌رود.	نزولی اکید
$a > b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$		یا رو به بالا می‌رود یا ثابت است.	صعودی
$a > b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$		یا رو به پایین می‌رود یا ثابت است.	نزولی
$a, b \in D_f \Rightarrow f(a) = f(b)$		روی یک خط افقی است.	ثابت
		قسمتی رو به بالا و قسمتی رو به پایین	غیر یکنوا

تست: با توجه به نمودار رسم‌شده، چه تعداد از جملات زیر درست است؟



الف) f در بازه $[-3, 4]$ صعودی است.

ب) f در بازه $[5, 9]$ یکنوا اکید است.

پ) f در بازه $[-1, 1]$ هم صعودی است و هم نزولی.

ت) f در بازه $[2, 5]$ غیر یکنوا است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

پاسخ ۴: همه جملات را بررسی می‌کنیم.

الف چون نمودار در این بازه یا رو به بالا رفته یا ثابت بوده، پس صعودی است.

ب در بازه $[5, 9]$ نمودار فقط رو به پایین رفته، پس نزولی اکید است. تابعی که نزولی اکید است، یکنوا اکید هم می‌باشد.

پ در بازه $[-1, 1]$ تابع ثابت می‌باشد پس هم صعودی هم نزولی است.

ت در بازه $[2, 5]$ ، قسمتی از نمودار صعودی اکید و قسمتی نزولی اکید است، پس غیریکنواست:

پس هر ۴ جمله درست بودند.

بررسی یکنوایی توابع (به کمک ضابطه) در جدول زیر معروف‌ترین توابع یکنوا آورده شده‌اند.

اسم تابع	ضابطه	شرط اکیداً صعودی بودن	شرط اکیداً نزولی بودن
خطی	$y = mx + h$	$m > 0$	$m < 0$
درجه ۳	$y = a(x + \alpha)^3 + \beta$	$a > 0$	$a < 0$
رادیکالی	$y = \sqrt{ax + b} + c$	$a > 0$	$a < 0$
نمایی	$y = a^x$	$a > 1$	$0 < a < 1$
لگاریتمی	$y = \log_a x$	$a > 1$	$0 < a < 1$
آبشاری	$y = x - a - x - b $	$b \geq a$ (صعودی)	$a \geq b$ (نزولی)

اشاره: تابع آبشاری، اکیداً یکنوا نیست، بلکه فقط یکنوا است.

تست: اگر تابع $f(x) = (4 - a^2)x + a - 1$ و $g(x) = \sqrt{(2a - 1)x + 3} - a$ توابعی اکیداً صعودی باشند، محدوده کامل a کدام است؟

$$(1) \frac{1}{2} < a < 2 \quad (2) \frac{1}{2} \leq a < 1 \quad (3) 0 < a < \frac{1}{2} \quad (4) -2 < a < \frac{1}{2}$$

پاسخ ۱: f تابعی خطی است، برای اکیداً صعودی بودن باید شیب مثبت باشد:

$4 - a^2 > 0 \Rightarrow a^2 < 4 \Rightarrow |a| < 2 \Rightarrow -2 < a < 2$

g تابعی رادیکالی به فرم $y = \sqrt{Ax + B} + C$ است. برای اکیداً صعودی بودن باید ضریب x مثبت باشد:

$2a - 1 > 0 \Rightarrow a > \frac{1}{2}$

بین شرط (۱) و (۲) اشتراک می‌گیریم:

$$\Rightarrow (1) \cap (2) = \left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

پاسخ ۳: ابتدا ضابطه را به شکل $y = A^x$ درمی‌آوریم:

برای آن که f صعودی باشد (دقت کنید گفته f نمایه و کلمه اکیداً هم نیامده)، پس $\frac{3}{a-6}$ باید بزرگ‌تر یا مساوی ۱ باشد. (اگر بزرگ‌تر از ۱ باشد، تابع نمایی اکیداً صعودی

و اگر ۱ باشد، تابع ثابت $y = 1$ می‌شود.)

پس مقادیر صحیح a ، سه عدد ۷، ۸ و ۹ هستند.

تست: تابع $f(x) = \left(\frac{a}{3} - 2\right)^{-x}$ یک تابع صعودی است. a چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟

$$(1) 1 \quad (2) 2 \quad (3) 3 \quad (4) 4$$


پاسخ ۳: ابتدا ضابطه را به شکل $y = A^x$ درمی‌آوریم:

برای آن که f صعودی باشد (دقت کنید گفته f نمایه و کلمه اکیداً هم نیامده)، پس $\frac{3}{a-6}$ باید بزرگ‌تر یا مساوی ۱ باشد. (اگر بزرگ‌تر از ۱ باشد، تابع نمایی اکیداً صعودی

و اگر ۱ باشد، تابع ثابت $y = 1$ می‌شود.)

پس مقادیر صحیح a ، سه عدد ۷، ۸ و ۹ هستند.

بررسی یکنوایی توابع (به کمک رسم نمودار) خیلی وقت‌ها تشخیص یکنوایی از روی ضابطه کار سختی است. در این صورت باید سراغ رسم نمودار برویم.



مثلاً تابع $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \geq 0 \\ x - 1 & x < 0 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. نمودارش را رسم می‌کنیم:

همان‌طور که معلوم است وقتی روی نمودار از چپ به راست حرکت می‌کنیم، نمودار فقط رو به بالا می‌رود، پس تابع ما یک تابع اکیداً صعودی است.


اشاره: برای جواب‌دادن به سوالات این قسمت باید نمودار توابع معروف را بلد باشید.

تست: کدام گزینه یک تابع اکیداً یکنوا است؟

$$(1) y = x^2 + \frac{x}{|x|} \quad (2) y = x|x| - \frac{|x|}{x} \quad (3) y = x^2 + \frac{x}{|x|} \quad (4) y = x^2 - \frac{x}{|x|}$$



پاسخ ۳: اول هر تابع را دوضابطه‌ای می‌نویسیم، بعد نمودار هر ۴ گزینه را رسم می‌کنیم.




با توجه به نمودارها، گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ غیریکنوا هستند ولی ۳، چون نمودار فقط رو به بالا حرکت کرده، تابعی اکیداً صعودی است.

بعضی وقت‌ها بازه‌های یکنوایی را می‌خواهند. مثلاً می‌پرسند تابع در کدام بازه، اکیداً نزولی است؟ نمودار را می‌کشیم و بازه را پیدا می‌کنیم.

تست: بزرگ‌ترین بازه‌ای که تابع $f(x) = |x+1| - |2x-4|$ در آن اکیداً نزولی است، کدام بازه می‌باشد؟

- (۱) $(-\infty, -1]$ (۲) $(-\infty, 2]$ (۳) $(-1, +\infty)$ (۴) $(2, +\infty)$



	A	B	C	D
ریشه قبلی	-2	-1	2	3
ریشه بعدی	-7	-6	3	2

پاسخ ۴: ریشه قدرمطلق‌ها را پیدا می‌کنیم و با نقطه‌یابی، نمودار f را رسم می‌کنیم:

۴ نقطه بالا را به ترتیب به هم وصل می‌کنیم تا نمودار f به دست آید.

بزرگ‌ترین بازه‌ای که نمودار رو به پایین می‌رود (اکیداً نزولی می‌باشد)، بازه $[2, +\infty)$ است.

یکی از توابع مورد علاقه طراحان سؤال در این قسمت، توابع به فرم $|x| \pm |y|$ هستند. برای بررسی یکنوایی آن‌ها، می‌توانیم آن‌ها را دوضابطه‌ای بنویسیم و بعد از نکته زیر استفاده کنیم.

تابع به فرم $|x| \pm |y|$ را اگر دوضابطه‌ای بنویسیم، به دو معادله خط می‌رسیم. حالا با توجه به علامت شیب‌ها:

- ۱ اگر هر دو مثبت باشند، تابع اکیداً صعودی است.
- ۲ اگر هر دو منفی باشند، تابع اکیداً نزولی است.
- ۳ اگر یکی مثبت و یکی صفر باشد، تابع صعودی است.
- ۴ اگر یکی مثبت و یکی منفی باشد، تابع نزولی است.
- ۵ اگر یکی مثبت و دیگری صفر باشد، تابع غیریکنواست.

مثلاً تابع $y = |2x-4| + 3x$ را در نظر بگیرید. با توجه به ریشه قدرمطلق $(x=2)$ ، آن را دوضابطه‌ای می‌نویسیم:

$$y = |2x-4| + 3x = \begin{cases} (2x-4) + 3x & x \geq 2 \\ (-2x+4) + 3x & x < 2 \end{cases} = \begin{cases} 5x-4 & x \geq 2 \\ x+4 & x < 2 \end{cases}$$

چون شیب هر دو ضابطه مثبت شد پس تابع اکیداً صعودی است.

تست: اگر تابع $f(x) = |2x+1| + ax$ تابعی اکیداً نزولی باشد، محدوده a کدام است؟

- (۱) $a < -2$ (۲) $a > -2$ (۳) $-2 < a < 2$ (۴) $a < 2$

پاسخ ۱: شیب ضابطه‌ها مهم است. شیب یکی $2+a$ و شیب دیگری $-2+a$ می‌شود.

$$\left. \begin{matrix} a+2 < 0 \Rightarrow a < -2 \\ a-2 < 0 \Rightarrow a < 2 \end{matrix} \right\} \text{اشتراک} \rightarrow a < -2$$

باید هر دو منفی باشند:

بررسی یکنوایی در نمایش زوج مرتبی برای بررسی یکنوایی تابعی با نمایش زوج مرتبی، ابتدا زوج مرتب‌ها را از x کوچک به بزرگ مرتب می‌نویسیم.

الان ۵ حالت ممکن است رخ دهد:

- ۱ با افزایش x ها، y ها هم زیاد شوند. ← اکیداً صعودی
- ۲ با افزایش x ها، y ها یا زیاد شوند یا ثابت بمانند. ← صعودی
- ۳ با افزایش x ها، y ها هم کم شوند. ← اکیداً نزولی
- ۴ با افزایش x ها، y ها یا کم شوند یا ثابت بمانند. ← نزولی
- ۵ با افزایش x ها، y ها هم کم شوند، هم زیاد. ← غیریکنوا

تست: تابع $f = \{(2, 5-m), (-1, m+11), (6, 2m-1)\}$ تابعی اکیداً نزولی است. محدوده m کدام است؟

- (۱) $m > 2$ (۲) $m < -3$ (۳) $-3 < m < 2$ (۴) $-3 \leq m \leq 2$

$$f = \{(2, 5-m), (-1, m+11), (6, 2m-1)\}$$

$$\begin{matrix} \downarrow & & \downarrow \\ m+11 & > & 5-m > 2m-1 \end{matrix}$$

پاسخ ۳: زوج مرتب‌ها را از x کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم:

در تابع اکیداً نزولی با افزایش x ها، y ها کم می‌شوند، پس:

نامعادله بالا تبدیل به دو نامعادله می‌شود:

$$(1) \quad m + 11 > 5 - m \Rightarrow 2m > -6 \Rightarrow m > -3$$

$$(2) \quad 5 - m > 2m - 1 \Rightarrow -3m > -6 \Rightarrow m < 2$$

$$-3 < m < 2$$

بین دو شرط بالا، اشتراک می‌گیریم:

معروف‌ترین توابع غیریکنوا

قبل از این در یک جدول توابع یکنوا معروف را دیدیم. الان می‌خواهیم معروف‌ترین توابع غیریکنوا را بررسی کنیم. در این توابع، بازه‌های یکنوا بی‌مهم هستند؛ یعنی بدانیم کجا صعودی و کجا نزولی هستند. در جدول زیر این توابع را می‌بینیم:

تابع	ضابطه	نمودار	نقطه مرزی بازه‌های یکنوا
سهمی	$y = ax^2 + bx + c$		رأس
قدرمطلق خطی	$y = \pm ax + b $		ریشه داخل قدرمطلق
گلدانی	$y = x - a + x - b $		ریشه‌های داخل قدرمطلق
هموگرافیک	$y = \frac{ax + b}{cx + d}$		ریشه مخرج



$$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{2} = 3$$

مثلاً در سهمی $y = x^2 - 6x + 1$ که دهانه‌اش رو به بالاست، طول رأس برابر است با:

با توجه به نمودار، در بازه $(-\infty, 3]$ تابع نزولی و در بازه $[3, +\infty)$ صعودی است.

تست: سهمی $y = -x^2 + (m-3)x + 1$ در بازه $[-3, 2]$ ، صعودی است. محدوده m کدام است؟

$$m > 1 \quad (4)$$

$$m < 7 \quad (3)$$

$$m \geq -1 \quad (2)$$

$$m \geq 7 \quad (1)$$

$$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{-m+3}{-2} = \frac{m-3}{2}$$

پاسخ: طول رأس، نقطه مهم داستان است:




$$x_S = \frac{m-3}{2}$$

چون $a < 0$ است، پس سهمی این شکلی می‌شود:


پس بازه $[-3, 2]$ باید در شاخه صعودی باشد، یعنی باید $x = 2$ (انتهای بازه)، قبل یا روی x_S باشد:

$$2 \leq \frac{m-3}{2} \Rightarrow m-3 \geq 4 \Rightarrow m \geq 7$$

نکات: نمودار هر تابع هموگرافیک با ضابطه $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ از دو شاخه تشکیل شده است. در مورد یکنوايي آن بدانید:



1 اگر $ad - bc > 0$ باشد، تابع در هر شاخه‌اش صعودی اکید است و در کل غیریکنواست.



2 اگر $ad - bc < 0$ باشد، تابع در هر شاخه‌اش نزولی اکید است و در کل غیریکنواست.

$$\left(-\frac{d}{c}, +\infty\right), \left(-\infty, -\frac{d}{c}\right)$$

3 تابع در بازه‌هایی که قبل و بعد از ریشه مخرج هستند، یکنواي اکید است:

$$2(3) - (-1)(1) = 7$$

مثلاً در تابع $y = \frac{2x-1}{x+3}$ ، اول $ad - bc$ را تشکیل می‌دهیم:

چون مثبت شد، پس در هر شاخه‌اش صعودی است و در کل غیریکنواست. ریشه مخرج $x = -3$ است، یعنی در بازه‌های $(-\infty, -3)$ و $(-3, +\infty)$ به طور جداگانه، صعودی اکید است.



تست: تابع $f(x) = \frac{-4x+8}{2x-k}$ در بازه $(3, +\infty)$ اکیداً صعودی است. محدوده k کدام است؟

- (۱) $(4, 6]$ (۲) $(5, 7)$ (۳) $(6, 8)$ (۴) $(2, 4)$

پاسخ ۱: ریشهٔ مخرج را حساب می‌کنیم:

قرار است تابع هموگرافیکمان، در هر شاخه اکیداً صعودی باشد، این شکلی:

پس الان دو تا شرط لازم است:

(۱) $ad - bc$ مثبت باشد:

$$(-4)(-k) - 8(2) > 0 \Rightarrow 4k - 16 > 0 \Rightarrow k > 4$$


(۲) بازه $(3, +\infty)$ بعد از $x = \frac{k}{2}$ باشد، یعنی ۳ باید بزرگ‌تر یا مساوی $\frac{k}{2}$ باشد:

$$3 \geq \frac{k}{2} \Rightarrow k \leq 6$$

اشتراک شرط (۱) و (۲) را می‌گیریم:

$$(k > 4) \cap (k \leq 6) = 4 < k \leq 6$$

$$2x - k = 0 \Rightarrow x = \frac{k}{2}$$



کاربرد یکنوایی در حل نامعادلات

یک بار دیگر تعریف ریاضی توابع اکیداً یکنوا را ببینید:

$a > b \Leftrightarrow f(a) > f(b)$	تابع اکیداً صعودی
-------------------------------------	-------------------

$a > b \Leftrightarrow f(a) < f(b)$	تابع اکیداً نزولی
-------------------------------------	-------------------

نکات: دو جملهٔ بالا را به زبان دیگری می‌گوییم. از این دو جمله در حل نامعادلات و برخی سؤال‌های دامنه استفاده می‌کنیم.

۱ اگر f اکیداً صعودی و $f(a) > f(b)$ ، با حذف f ها، جهت عوض نمی‌شود:

۲ ولی اگر f اکیداً نزولی و $f(a) > f(b)$ ، با حذف f ها، جهت عوض می‌شود:

مثلاً اگر f اکیداً صعودی و $f(3x) > f(x+2)$ ، آن‌گاه $3x > x+2$ و در نتیجه $x > 1$ است.

تست: اگر f تابعی اکیداً نزولی با دامنه \mathbb{R} باشد، در چه بازه‌ای نمودار تابع $f(x^2+1)$ بالای نمودار تابع $f(2x+9)$ قرار دارد؟

- (۱) $\mathbb{R} - [-2, 4]$ (۲) $\mathbb{R} - [-4, 2]$ (۳) $(-2, 4)$ (۴) $(-4, 2)$

پاسخ ۳: قرار است تابع $f(x^2+1)$ بالای تابع $f(2x+9)$ باشد:

چون f اکیداً نزولی است، پس با حذف f ها، جهت تغییر می‌کند:

نامعادله را حل می‌کنیم:

$$f(x^2+1) > f(2x+9)$$

$$x^2+1 < 2x+9$$

$$x^2 - 2x - 8 < 0 \Rightarrow (x-4)(x+2) < 0 \xrightarrow{\text{بین ریشه‌ها}} -2 < x < 4$$

ممکن است این موضوع را با دامنهٔ یک تابع رادیکالی ادغام کنند. یک تست ببینید.

تست: توابع $f(x) = -(x-1)^2 + 12$ و $g(x) = \sqrt{f(|x|) - f(|2x-1|)}$ مفروضه‌اند. اگر دامنهٔ تابع g به صورت $\mathbb{R} - (a, b)$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) $\frac{1}{3}$

پاسخ ۳: برای دامنهٔ تابع رادیکالی g ، باید زیرش را بزرگ‌تر یا مساوی صفر قرار دهیم:

حالا باید بگوییم چون f نزولی است (چون ضریب x^2 منفی می‌شود)، پس با حذف f ها، جهت عوض می‌شود:

$$f(|x|) \geq f(|2x-1|) \xrightarrow{f \text{ نزولی}} |x| \leq |2x-1|$$

برای حل نامعادله‌های به فرم $|A| \geq |B|$ ، بهترین راه توان ۲ رساندن است (هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند):

$$|x| \leq |2x-1| \xrightarrow{\text{توان ۲}} x^2 \leq 4x^2 - 4x + 1 \Rightarrow 3x^2 - 4x + 1 \geq 0 \xrightarrow{\text{نابین ریشه‌ها}} x \geq 1 \text{ یا } x \leq \frac{1}{3}$$

$$D_g = \mathbb{R} - \left(\frac{1}{3}, 1\right)$$


پس:

$$a+b = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

در نتیجه:

اگر هم لازم شد یک نمودار فرضی برای تابع اکیداً صعودی f (یا اکیداً نزولی) f بکشید و بعد حل نامعادله یا محاسبهٔ دامنه را انجام دهید.


مثلاً اگر گفته شده بود، f اکیداً نزولی و $f(3) = 0$ ، شکل روبه‌رو را می‌کشیم:



تست: اگر f تابعی اکیداً نزولی با دامنه \mathbb{R} و $f(-2) = 0$ باشد، جواب نامعادله $\frac{x^3 - 9x}{f(x)} \geq 0$ شامل چند عدد صحیح است؟

۳ (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴)

پاسخ ۳: برای f یک شکل فرضی که نزولی باشد و محور x ها را در -2 قطع کند، می‌کشیم و نامعادله را ساده‌تر می‌نویسیم:



$$\frac{x^3 - 9x}{f(x)} \geq 0 \Rightarrow \frac{x(x^2 - 9)}{f(x)} \geq 0 \Rightarrow \frac{x(x-3)(x+2)}{f(x)} \geq 0$$

با توجه به ریشه‌ها و نمودار f ، کل کسر را تعیین علامت می‌کنیم:

	-3	-2	0	3	
$x^3 - 9x$	-	+	+	-	+
$f(x)$	+	+	-	-	-
کل	-	+	-	+	-

جواب جواب

اشاره: برای تعیین علامت $f(x)$ ، قسمت‌هایی که نمودار بالای محور x هاست، مثبت و قسمت‌هایی که زیر محور x هاست، منفی شده است.

قسمت‌های مثبت و صفر جدول، جواب است: $[-3, -2] \cup [0, 3]$
بازه بالا شامل ۵ عدد صحیح است: $\{-3, 0, 1, 2, 3\}$

یکنوایی و اعمال جبری فرض کنید وضعیت یکنوایی توابع f و g را می‌دانیم و دنبال وضعیت یکنوایی توابع $f - f$ یا $f + g$ یا $f - g$ یا $f \times g$ یا ... هستیم.

تعداد حالت‌های بررسی زیاد می‌شود. مهم‌ترین حالت‌ها را در جدول روبه‌رو می‌بینید:

f	g	f+g	f-g	fg
ص	ص	ص		
ص	ن		ص	
ن	ص		ن	
ن	ن	ن		

اشاره: خانه‌های خالی جدول مقابل، یعنی وضعیت تابع نامشخص است (و هم چیزی می‌تونه بشه!

صعودی، نزولی، غیر یکنوا)

حالا نکات زیر را بخوانید:

۱ f و $-f$ در یکنوایی کاملاً برعکس هم هستند. یعنی اگر f اکیداً صعودی باشد، $-f$ اکیداً نزولی است.

۲ f و $\frac{1}{f}$ به شرطی که f تغییر علامت ندهد، در یکنوایی برعکس هم هستند ولی اگر f تغییر علامت بدهد، $\frac{1}{f}$ غیر یکنوا می‌شود.

۳ اگر دو تابع f و g هر دو اکیداً صعودی (یا نزولی) باشند، جمعشان یعنی $f + g$ هم اکیداً صعودی (یا نزولی) می‌ماند ولی تفریقشان نامعلوم است.

۴ برای تفریق دو تابع، می‌توانیم از نکته (۳) استفاده کنیم، مثلاً اگر f صعودی و g نزولی باشد، آن‌گاه چون $-g$ صعودی است، می‌توانیم $f - g$ را به شکل $f + (-g)$ ببینیم که مجموع دو تابع صعودی است و در نتیجه صعودی می‌شود.

۵ یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات در قسمت ضرب دو تابع صعودی رخ می‌دهد که بچه‌ها فکر می‌کنند ضرب دو تابع صعودی، تابعی صعودی است ولی این‌طور نیست! مثلاً x و $2x$ هر دو صعودی‌اند ولی ضربشان $2x^2$ یک سهمی است که غیر یکنواست.

جمله درست این قسمت این است: «ضرب دو تابع صعودی با مقادیر مثبت، تابعی صعودی است.»

مثلاً $y = 2^x$ و $y = \sqrt{x}$ هر دو توابعی صعودی و مقادیرشان مثبت است، پس تابع $y = 2^x \sqrt{x}$ تابعی صعودی است.

تست: تابع $y = x^2 + 2x - 6$ از نظر یکنوایی چگونه است؟

۱) اکیداً صعودی ۲) اکیداً نزولی ۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی ۴) ابتدا نزولی، سپس صعودی

$$y = (x^2) + (2x - 6)$$

پاسخ ۱: تابع داده‌شده را به صورت جمع دو تابع x^2 و $2x - 6$ ببینیم:

x^2 که اکیداً صعودی است. $2x - 6$ هم خطی با شیب مثبت است، پس اکیداً صعودی می‌باشد.

$$y = \underbrace{x^2}_{\text{صعودی اکید}} + \underbrace{2x - 6}_{\text{صعودی اکید}}$$

جمع دو تابع اکیداً صعودی، تابعی اکیداً صعودی است:

صعودی اکید

پس $y = x^2 + 2x - 6$ اکیداً صعودی است.

دامنه توابع $f \pm g$ از اشتراک دامنه f و g به دست می‌آید. ممکن است از توابع f و g ، یکی غیر یکنوا باشد ولی محدود شدن دامنه باعث یکنوا شدنش شود و بعد بتوانیم از نکات گفته‌شده استفاده کنیم. یک تست ببینید:

تست: تابع $y = \log(2-x) + x^2 - 4x$ از نظر یکنوایی چگونه است؟


۱) اکیداً صعودی ۲) اکیداً نزولی ۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی ۴) ابتدا نزولی، سپس صعودی


$$y = \underbrace{\log(2-x)}_{f(x)} + \underbrace{x^2 - 4x}_{g(x)}$$

پاسخ ۲: تابع داده‌شده را به صورت جمع دو تابع می‌نویسیم:

نمودار تابع $f(x) = \log(2-x)$ به صورت زیر است:

پس f نزولی است. از طرفی دامنه f ، به صورت $x < 2$ می‌باشد. این دامنه روی سهمی $g(x) = x^2 - 4x$ هم اثر می‌گذارد.





سهمی $g(x) = x(x-4)$ را با دامنه $x < 2$ رسم می‌کنیم:

$$y = \underbrace{\log(2-x)}_{\text{نزولی اکید}} + \underbrace{x^2 - 4x}_{\text{نزولی اکید}}$$

g هم در این بازه، اکیداً نزولی است. مجموع دو تابع اکیداً نزولی، تابعی اکیداً نزولی است.

نکته: برای تعیین وضعیت ترکیب دو تابع یکنوا، از قانون «علامت ضرب دو عدد» می‌توانیم استفاده کنیم.

f	g	fog
ص	ص	ص
+	+	+
ص	ن	ن
+	-	-
ن	ص	ن
-	+	-
ن	ن	ص
-	-	+

تابع صعودی را با علامت + و تابع نزولی را با علامت - نشان می‌دهیم. مثلاً اگر f صعودی و g نزولی باشد، fog هم نزولی است، چون مثبت ضربدر منفی می‌شود منفی. $fog \Rightarrow (+) \times (-) = (-)$.
کل حالات هم در جدول می‌بینید:

تست: اگر f تابعی اکیداً نزولی و g تابعی اکیداً صعودی باشد، گام می‌تواند باشد؟

$g(x) = \sqrt[3]{x}$ (۴)
 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ (۳)
 $g(x) = x^2 - 1$ (۲)
 $g(x) = 2^x$ (۱)

پاسخ ۳: چون منفی در منفی، می‌شود مثبت، پس g باید نزولی باشد. در بین گزینه‌ها فقط $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ اکیداً نزولی است.

دقت کنید $y = \sqrt{x}$ تابعی اکیداً صعودی است که تغییر علامت نمی‌دهد (چون $\sqrt{x} \geq 0$) پس $\frac{1}{\sqrt{x}}$ اکیداً نزولی می‌شود.

تست: اگر f تابعی اکیداً صعودی و g اکیداً نزولی باشد، کدام تابع زیر قطعاً اکیداً نزولی است؟

$(fog)(x)$ (۱)
 $(gof)(-x)$ (۲)
 $(f of)(-x^2)$ (۳)
 $(gog)(-x^2)$ (۴)

پاسخ ۴: همه گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ $(f o g o g)(x) \Rightarrow (+) \times (-) \times (-) \times (-) \times (+) = (+) \Rightarrow$ اکیداً صعودی
 $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
۲ $(g o f)(-x) \Rightarrow (-) \times (+) \times (-) = (-) \Rightarrow$ اکیداً صعودی
 $\downarrow \downarrow \downarrow$
۳ $(f o f)(-x^2) \Rightarrow (+) \times (+) \times ? = ? \Rightarrow$ نامشخص
 $\downarrow \downarrow \downarrow$
 غیر یکنوا
۴ $(g o g)(-x^2) \Rightarrow (-) \times (-) \times (-) = (-) \Rightarrow$ اکیداً نزولی
 $\downarrow \downarrow \downarrow$

محاسبه برد با استفاده از یکنوایی

اگر f تابعی اکیداً یکنوا و پیوسته با دامنه $[a, b]$ یا (a, b) یا $[a, b]$ یا (a, b) باشد، با جای‌گذاری نقاط اول و آخر دامنه در ضابطه تابع، به نقطه اول و آخر برد می‌رسیم.

۱ $f \xrightarrow{D_f=[a,b]} R_f = [f(a), f(b)]$ اکیداً صعودی و پیوسته

۲ $f \xrightarrow{D_f=[a,b]} R_f = [f(b), f(a)]$ اکیداً نزولی و پیوسته

تست: اگر $f(x) = 2^{\sqrt{x-4} - \sqrt{20-4x}}$ و برد f بازه $[a, b]$ باشد، مقدار $a + b$ کدام است؟

$\frac{5}{2}$ (۴)
 $\frac{9}{4}$ (۳)
 ۲ (۲)
 $\frac{7}{4}$ (۱)

پاسخ ۳: عبارتی که در توان آمده است را بررسی می‌کنیم:

$\sqrt{x-4} - \sqrt{20-4x}$
 اکیداً صعودی اکیداً صعودی
 اکیداً صعودی

اگر A اکیداً صعودی باشد، 2^A هم اکیداً صعودی است. در نتیجه تابع f، اکیداً صعودی است.


$\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{x-4} \xrightarrow{\text{دامنه}} x \geq 4 \\ \sqrt{20-4x} \xrightarrow{\text{دامنه}} x \leq 5 \end{array} \right. \xrightarrow{\text{اشتراک}} D_f = [4, 5]$

تابع f، دو عبارت رادیکالی دارد، دامنه‌اش را حساب می‌کنیم:

چون f اکیداً صعودی (و پیوسته) است، پس برای محاسبه برد باید مقدارش را در $x = 4$ و $x = 5$ حساب کنیم:

$\left. \begin{array}{l} f(4) = 2^{0-2} = 2^{-2} = \frac{1}{4} \\ f(5) = 2^{1-0} = 2^1 = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow R_f = \left[\frac{1}{4}, 2 \right] \Rightarrow a + b = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}$

۱۰۶- کدام تابع صعودی است اما اکیداً صعودی نیست؟



$$f = \{(1,2), (-1,0), (3,3)\} \quad (1)$$

بررسی یکنوایی توابع

اگر با توابعی که همیشه یکنوا هستند آشنا نیستید حتماً درس نامه را نگاه کنید.

۱۰۷- اگر تابع $f(x) = (1-a^2)x + a + 3$ ، تابعی اکیداً صعودی باشد، عرض نقطه برخورد f با محور y ها در چه بازه‌ای است؟

- (۱) (۱, ۳) (۲) (۲, ۴) (۳) (۳, ۵) (۴) (۴, ۶)

۱۰۸- کدام تابع زیر، اکیداً صعودی است؟

(۱) $y = \sqrt{-2x+4}$ (۲) $y = -(2-x)^2 - 1$ (۳) $y = \log_{1/2} x$ (۴) $y = (\cos \frac{\pi}{6})^x$

۱۰۹- به ازای $k \in (a, b)$ ، تابع نمایی $y = (\frac{k+1}{3-k})^x$ تابعی صعودی است. بیشترین مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۱۰- به ازای چند مقدار صحیح m ، تابع $f(x) = (\frac{3m+1}{4})^x$ با دامنه \mathbb{R} ، نزولی است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) هیچ مقدار m

۱۱۱- تابع $f(x) = (-9+k^2)x^3 + 5$ اکیداً نزولی است. مجموع مقادیر صحیح k ، چه قدر است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۶

۱۱۲- اگر تابع $f(x) = |x+2m-1| - |x-m+5|$ تابعی نزولی باشد، محدوده کامل m کدام است؟

- (۱) $m \geq 2$ (۲) $m \leq 2$ (۳) $m > 2$ (۴) $m < 2$

برای تعیین یکنوایی توابعی که چندضابطه‌ای، قدرمطلق یا برابری هستند، همیشه تابع را رسم می‌کنیم.

۱۱۳- تابع $f(x) = \begin{cases} x^3+1 & x \leq 0 \\ -x^2 & x > 0 \end{cases}$ چگونه است؟

- (۱) اکیداً صعودی (۲) اکیداً نزولی (۳) ابتدا صعودی و سپس نزولی (۴) ابتدا نزولی و سپس صعودی

۱۱۴- تابع $f(x) = \log_2 \sqrt[3]{x}$ از نظر یکنوایی چگونه است؟

- (۱) صعودی (۲) نزولی (۳) نه صعودی، نه نزولی (۴) هم صعودی، هم نزولی

۱۱۵- تابع $f(x) = \log_{1/5} x^2$ از نظر یکنوایی چگونه است؟

- (۱) صعودی (۲) نزولی (۳) نه صعودی، نه نزولی (۴) هم صعودی، هم نزولی

۱۱۶- تابع $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x^3}}$ چگونه تابعی است؟

- (۱) ابتدا صعودی، سپس نزولی (۲) ابتدا نزولی، سپس صعودی (۳) همواره صعودی (۴) همواره نزولی

۱۱۷- کدام یک از توابع زیر در دامنه خود اکیداً صعودی نیست؟

(۱) $f(x) = \frac{|x|}{x} + x$ (۲) $f(x) = x - \frac{x}{|x|}$ (۳) $f(x) = 2x - |x-1|$ (۴) $f(x) = \begin{cases} -x^2 & x \leq 0 \\ x^2 - 1 & x > 0 \end{cases}$

۱۱۸- کدام یک از توابع زیر در دامنه خود اکیداً نزولی است؟

(۱) $f(x) = x^2 |x|$ (۲) $f(x) = -x^2 |x|$ (۳) $f(x) = x |x|$ (۴) $f(x) = -x |x|$

۱۱۹- یکنوایی تابع $f: (-1,1) - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ چگونه است؟ $f(x) = x|x| + \frac{x}{|x|}$

- (۱) صعودی (۲) نزولی (۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی (۴) ابتدا نزولی، سپس صعودی

۱۲۰- تابع $f(x) = |x^2 - 2x|$ و $x \geq 0$ در بازه (a, b) نزولی اکید است. حداکثر مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۱ (۴) ۲

(تجربی ۱۴۰۱)

۱۲۱- بازه $[a, b]$ ، بزرگ‌ترین بازه‌ای است که تابع $f(x) = x|x-2|$ در آن اکیداً نزولی است. کدام خط، نمودار f را در ۳ نقطه قطع می‌کند؟

$y = \frac{b}{a}$ (۴) $y = \frac{a}{b}$ (۳) $y = a$ (۲) $y = b$ (۱)

۱۲۲- اگر $f(x) = x^2 + x^2$ و $g(x) = |x|$ باشد، تابع $\frac{f}{g}$ در چه بازه‌ای نزولی است؟

$(\frac{1}{2}, 1)$ (۴) $(0, \frac{1}{2})$ (۳) $(-\frac{1}{2}, 0)$ (۲) $(-1, -\frac{1}{2})$ (۱)

(تجربی خارج ۹۸)

۱۲۳- تابع با ضابطه $f(x) = |x+1| - |x-2|$ ، در کدام بازه، اکیداً صعودی است؟

$(2, +\infty)$ (۴) $(-1, 2)$ (۳) $(-1, +\infty)$ (۲) $(-\infty, 2)$ (۱)

(تجربی ۹۸)

۱۲۴- تابع با ضابطه $f(x) = |x+2| + |x-1|$ در کدام بازه، اکیداً نزولی است؟

$(1, +\infty)$ (۴) $(-2, 1)$ (۳) $(-\infty, 1)$ (۲) $(-\infty, -2)$ (۱)

۱۲۵- تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \geq 0 \\ 3x + a & x < 0 \end{cases}$ بر دامنه‌اش اکیداً صعودی است. حداکثر مقدار a کدام است؟

-2 (۴) -1 (۳) 1 (۲) 2 (۱)

۱۲۶- به ازای چه حدودی از k ، تابع $f(x) = \begin{cases} 4 - |x-1| & x \leq 0 \\ k + x^2 & x > 0 \end{cases}$ تابعی اکیداً یکنواست؟

$k < 3$ (۴) $k \geq 3$ (۳) $k \leq 3$ (۲) $k > 3$ (۱)

۱۲۷- اگر $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq -1 \\ g(x) & x > -1 \end{cases}$ تابعی نزولی باشد، ضابطه g کدام می‌تواند باشد؟

$y = x + |x|$ (۴) $y = -|x| - x$ (۳) $y = -x^2$ (۲) $y = |x|$ (۱)

۱۲۸- کدام تابع اکیداً یکنواست؟

$y = |x-1| + x$ (۴) $y = |x+1| + 2x$ (۳) $y = |2x-4| - x$ (۲) $y = |2x| + x$ (۱)

۱۲۹- اگر تابع $f(x) = ax + 4 - |\frac{x}{2} + 1|$ تابعی غیریکنوا باشد، محدوده a کدام است؟

$\frac{-1}{2} \leq a \leq \frac{1}{2}$ (۴) $\frac{-1}{2} < a < \frac{1}{2}$ (۳) $a < \frac{1}{2}$ (۲) $a > \frac{-1}{2}$ (۱)


۱۳۰- شکل مقابل نمودار تابع $y = f(x)$ است. نمودار تابع $y = f(1-x)$ در کدام فاصله اکیداً نزولی است؟

$(-3, -1)$ (۱)

$[-4, -2]$ (۲)

$(-1, 1)$ (۳)

$[1, 2]$ (۴)




۱۳۱- نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. اگر $g(x) = 2 - |x|$ ، آنگاه تابع $f \circ g$ در کدام یک از بازه‌های زیر صعودی است؟

بازه‌های زیر صعودی است؟

$(-4, 0)$ (۲) $(-2, 2)$ (۱)

$(1, 5)$ (۴) $(-1, 3)$ (۳)



۱۳۲- اگر $f(x) = \frac{|x| + x^2}{1 + |x|}$ ، $g(x) = 2x^2 + x - 1$ و تابع $f \circ g$ در بازه $[-a^2, -b^2]$ صعودی باشد، بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

$1/5$ (۴) $1/25$ (۳) 1 (۲) $0/75$ (۱)

۱۳۳- اگر $f(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ ، $g(x) = x^2 - x$ و تابع $(f \circ g)(x+1)$ در بازه $(a, +\infty)$ صعودی باشد، کم‌ترین مقدار a کدام است؟

2 (۴) 1 (۳) -1 (۲) صفر (۱)

۱۳۴- تابع $f(x) = |a + x^2|$ در بازه $(-\infty, a-2)$ نزولی است. چند عدد طبیعی در مجموعه مقادیر a وجود دارد؟

4 بی‌شمار (۴) 2 (۳) 1 (۲) صفر (۱)

در نمایش زوج مرتبی، ابتدا باید زوج مرتب‌ها را از کوچک به بزرگ بنویسیم.

۱۳۵- اگر تابع $f = \{(1, 1), (3, 6), (\sqrt{2}, m^2 - 2), (10, 20)\}$ اکیداً صعودی باشد، حدود m شامل چند عدد صحیح است؟

6 (۴) 4 (۳) 2 (۲) صفر (۱)

۱۳۶- اگر $f = \{(1, 3a+1), (-1, a+1), (2, 4a+3)\}$ تابعی صعودی باشد، مقادیر a در کدام بازه است؟

$[0, +\infty)$ (۴) $(0, +\infty)$ (۳) $(-\infty, 0)$ (۲) $(-\infty, 0]$ (۱)

۱۳۷- توابع $f = \{(2, 3m), (-3, m), (5, -m), (1, m^2 - 1)\}$ و $g = \{(-3, 12), (1, 1), (4, -m), (5, 2)\}$ مفروض‌اند. اگر $f + g$ تابعی نزولی باشد، چند مقدار صحیح برای m وجود دارد؟

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

۱۳۸- تابع $f(x) = mx^2 - nx - k$ در هر بازه، هم صعودی و هم نزولی است. اگر مجموعه زیر تابع باشد، مقدار $f(\sqrt{5})$ کدام است؟ (تجربی ۱۴۰۲)

$\{(m, n-1), (0, k), (n-1, m^2 + 2m-1), (3k+2, 2k+1)\}$

- (۱) -۱ (۲) $-\sqrt{5}$ (۳) ۱ (۴) $\sqrt{5}$

بازه‌های یکنوایی توابع غیریکنوا

در سهمی‌ها، یک سمت رأس صعودی و سمت دیگر رأس نزولی است.

۱۳۹- تابع $f(x) = 3x^2 - 6x + 2$ روی بازه $[-1, 2]$ چگونه است؟

- (۱) ابتدا صعودی سپس نزولی (۲) ابتدا نزولی سپس صعودی (۳) نزولی (۴) صعودی

۱۴۰- مقادیر تابع با ضابطه $f(x) = x^2 - 2x - 3$ با دامنه $\{x : |x-1| < 2\}$ همواره چگونه است؟ (ریاضی ۹۱)

- (۱) نزولی (۲) مثبت (۳) صعودی (۴) منفی

۱۴۱- تابع $f(x) = x^2 - (2m+1)x + 1$ در بازه $[-1, 2]$ غیریکنوا است. بازه m کدام است؟


- (۱) $-1 \leq m \leq \frac{1}{2}$ (۲) $-1 < m < \frac{1}{2}$ (۳) $\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$ (۴) $-\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$

۱۴۲- اگر تابع $f(x) = (\frac{1}{m})x^2 - x + 3$ در بازه $[1, +\infty)$ اکیداً صعودی باشد، محدوده m کدام است؟

- (۱) $-2 \leq m < 0$ (۲) $0 < m \leq 2$ (۳) $m \leq -2$ (۴) $m \geq 2$

۱۴۳- با توجه به نمودار سهمی $y = f(x)$ ، اگر تابع $g(x) = kx^2 + 4f(x)$ تابعی اکیداً یکنوا باشد، مقدار k کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) ۴



تابع همواره افیک، هیچ‌گاه یکنوا نیست. منگر این‌که دامنه تابع، محدود نشده باشد.

۱۴۴- تابع $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ در بازه $(-\infty, a)$ اکیداً نزولی است. حداکثر a کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{3}$ (۲) صفر (۳) ۲ (۴) ۳

۱۴۵- تابع $f(x) = \frac{-1}{x-2}$ در بازه $(-\infty, a]$ اکیداً صعودی است. حداکثر مقدار صحیح a کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۱۴۶- کدام یک از توابع زیر در بازه $(-2, +\infty)$ اکیداً صعودی است؟

- (۱) $y = \frac{x-1}{x+3}$ (۲) $y = \frac{2x-3}{x+1}$ (۳) $y = \frac{-x+1}{x+3}$ (۴) $y = \frac{2x+1}{x-1}$

۱۴۷- اگر در بازه $(1, +\infty)$ تابع $f(x) = \frac{x+1}{2x-a}$ اکیداً یکنوا باشد، حدود a کدام است؟

- (۱) $(-\infty, 2)$ (۲) $(-\infty, 2]$ (۳) $(-\infty, 2) - \{-2\}$ (۴) $(-\infty, 2] - \{-2\}$

۱۴۸- تابع $f(x) = \frac{2x+b}{3x+d}$ در بازه‌های $(-2, +\infty)$ و $(-\infty, -2)$ یکنوا اکید است و محور x ها را در نقطه‌ای به طول ۱ قطع می‌کند. کدام تابع زیر اکیداً صعودی است؟

- (۱) $y = d^{-x}$ (۲) $y = bx^2$ (۳) $y = dx + b|x|$ (۴) $y = bx + d$

کاربرد یکنوایی در حل نامعادلات

۱۴۹- اگر f تابعی نزولی با دامنه \mathbb{R} و $f(2a-1) > f(5-a)$ باشد، محدوده a کدام است؟

- (۱) $a \geq 2$ (۲) $a \leq 2$ (۳) $a > 2$ (۴) $a < 2$

۱۵۰- اگر $g(x) = \sqrt{f(2x+1)} - f(x-2)$ و f اکیداً نزولی باشد، دامنه تابع $g(x)$ کدام است؟ ($D_f = \mathbb{R}$)

- (۱) $[-3, +\infty)$ (۲) $(-3, +\infty)$ (۳) $(-\infty, -3]$ (۴) $(-\infty, -3)$

۱۵۱- تابع f اکیداً نزولی و دامنه آن مجموعه‌ای از مقادیر منفی است. اگر $f(m^2 - m - 5) < f(-3 + 2m - m^2)$ باشد، m دارای چند مقدار صحیح است؟ (ریاضی ۱۴۰۲)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر



۱۵۲- تابع f اکیداً صعودی و دامنه آن، مجموعه‌ای از مقادیر مثبت است. اگر $f(m^2 - 4m + 4) < f(2m^2 - 9m - 2)$ باشد، m دارای چند مقدار صحیح است؟ (ریاضی خارج ۱۴۰۲)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۵ (۴) ۶

۱۵۳- اگر $f(x) = \frac{1-x}{x}$ ، آن‌گاه در کدام‌یک از بازه‌های زیر، نمودار تابع $y = f(1+x^2)$ بالای نمودار تابع $y = f(3+x^2)$ قرار دارد؟

- (۱) $(-1, 1)$ (۲) $(0, 2)$ (۳) $(1, 3)$ (۴) $(2, 4)$

۱۵۴- اگر $f(x) = -x^2 + 2$ باشد، جواب نامعادله $(f \circ f)(x) > f(x^2)$ کدام است؟ (مثل کتور)

- (۱) $(1, +\infty)$ (۲) $(-\infty, 1)$ (۳) $(-1, 1)$ (۴) $\mathbb{R} - [-1, 1]$

۱۵۵- تابع f روی \mathbb{R} اکیداً نزولی است. اگر $f(3) = 0$ باشد، دامنه $g(x) = \sqrt{x^2 f(x)}$ شامل چند عدد صحیح نامنفی است؟ (تجربی خارج ۱۴۰۱)

- (۱) صفر (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۵۶- اگر f تابعی اکیداً صعودی و $f(2) = 0$ باشد، دامنه تابع $g(x) = \sqrt{(x^2 - x)f(x)}$ شامل چند عدد طبیعی نیست؟ (مثل کتور)

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۱۵۷- اگر $f(x) = 2^x$ باشد، دامنه تابع $y = \sqrt{f(\frac{1}{x}) - f(x)}$ به کدام صورت است؟ (ریاضی خارج ۹۳)

- (۱) $\mathbb{R} - (-1, 1)$ (۲) $[-1, 0) \cup (0, 1]$ (۳) $[-1, 0) \cup [1, +\infty)$ (۴) $(-\infty, -1] \cup (0, 1]$

۱۵۸- اگر $f(x) = 4 - (\frac{1}{x})^x$ باشد، دامنه تابع $g(x) = \sqrt{xf(x)}$ کدام بازه است؟ (ریاضی ۹۳ با تغییر)

- (۱) $[-2, 0]$ (۲) $\mathbb{R} - (-2, 0)$ (۳) $[0, 2]$ (۴) $\mathbb{R} - (0, 2)$

۱۵۹- اگر $f(x) = (\frac{1}{x})^x + \log_{0.5} x$ باشد، مجموعه جواب نامعادله $(f \circ f)(x) < f(2^{-3x})$ کدام است؟ (تجربی خارج ۱۴۰۲)

- (۱) $(0, \frac{1}{8})$ (۲) $(1, +\infty)$ (۳) $(\frac{1}{8}, +\infty)$ (۴) $(0, 1)$

۱۶۰- اگر $f(x) = (x + \log x)^5$ باشد، مجموعه جواب نامعادله $(f \circ f)(x) < f(x^5)$ کدام است؟ (تجربی ۱۴۰۲)

- (۱) $(0, 5)$ (۲) $(0, 1)$ (۳) $(5, +\infty)$ (۴) $(1, +\infty)$

یکنوایی و اعمال جبری

۱۶۱- چندتا از عبارات زیر درست است؟

- (الف) اگر f صعودی و g نزولی باشد، $f + g$ یک تابع ثابت است.
 (ب) اگر f صعودی اکید و g صعودی باشد، $f + g$ صعودی اکید است.
 (پ) اگر f صعودی اکید و g نزولی باشد، $f - g$ صعودی اکید است.
 (ت) اگر f تابعی صعودی اکید و g تابعی ثابت باشد، $f \times g$ اکیداً صعودی است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۶۲- اگر $f(x)$ تابعی اکیداً نزولی باشد، تابع $y = f(-x^2)$ چگونه تابعی است؟

- (۱) اکیداً نزولی (۲) اکیداً صعودی (۳) غیر یکنوا (۴) نامشخص می‌باشد.

۱۶۳- اگر f تابعی اکیداً صعودی و g اکیداً نزولی باشد، کدام‌یک از توابع زیر نزولی است؟

- (۱) $y = f(x) + \sqrt{x}$ (۲) $y = g \circ g(x)$ (۳) $y = g(x^2)$ (۴) $y = (f \circ g \circ f)(x)$

۱۶۴- تابع $y = \frac{1}{\sqrt{2-x} + 1}$ چگونه است؟


- (۱) اکیداً صعودی (۲) اکیداً نزولی (۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی (۴) ابتدا نزولی، سپس صعودی

۱۶۵- اگر f تابعی اکیداً نزولی و زیر محور x ها باشد، توابع $g(x) = -xf(x)$ و $h(x) = \frac{1}{f(-x)}$ به ترتیب چگونه‌اند؟

- (۱) صعودی - صعودی (۲) صعودی - نزولی (۳) نزولی - صعودی (۴) نزولی - نزولی

۱۶۶- در شکل مقابل، نمودار تابع f به طور کامل رسم شده است. برد تابع $y = [\sqrt{x} - f(x)]$ چند عضو دارد؟

- (۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۳



۱۶۷- توابع $f(x) = \frac{-1}{x} + \sqrt{x}$ و $g(x) = |x| + \sqrt{-x}$ به ترتیب چگونه‌اند؟

- (۱) غیر یکنوا - غیر یکنوا (۲) غیر یکنوا - نزولی (۳) صعودی - غیر یکنوا (۴) صعودی - نزولی

۱۶۸- تابع $f(x) = x^2 - 2x + \sqrt{1-x}$ از نظر یکنوایی چگونه است؟

- (۱) اکیداً صعودی (۲) اکیداً نزولی (۳) ابتدا صعودی، سپس نزولی (۴) ابتدا نزولی، سپس صعودی

۱۶۹- کدام عبارت، برای تابع $f(x) = 2\sqrt{x} - \frac{3}{2\sqrt{x^2-1}}$ درست است؟

- (۱) تابع f در بازه $(1, \infty) \cup (0, 1)$ صعودی است.
 (۲) تابع f در بازه‌های $(1, \infty)$ و $(0, 1)$ صعودی است.
 (۳) تابع f در بازه $(1, \infty)$ صعودی و در بازه $(0, 1)$ نزولی است.
 (۴) تابع f در بازه $(1, \infty)$ نزولی و در بازه $(0, 1)$ صعودی است.

محاسبه برد با استفاده از یکنوایی

۱۷۰- برد تابع $f(x) = 2x + 1 + \sqrt{x-1}$ شامل چند عدد طبیعی نمی‌شود؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۱۷۱- اگر برد تابع $f(x) = 2\sqrt{2+x} - \sqrt{7-x}$ بازه $[a, b]$ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

۱۷۲- اگر برد تابع $f(x) = -x^2 + \sqrt{-x} + 1$ با دامنه $[-4, -1]$ به صورت $[a, b]$ باشد، $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۶۲ (۲) ۶۴ (۳) ۶۶ (۴) ۶۸

۱۷۳- فرض کنید برد تابع $f(x) = 2\sqrt{4\cos^2(x)-1} - 2\sqrt{1-9\cos^2(x)}$ به صورت $[a, b]$ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) $\frac{9}{4}$ (۲) $\frac{15}{4}$ (۳) $\frac{9}{2}$ (۴) $\frac{21}{4}$



$$k \in (1, 3)$$

قسمت‌های مثبت را می‌خواهیم:

$$\max(b-a) = 3-1 = 2$$

پس:

۱۱۰. برای آن‌که تابع $y = A^x$ نزولی باشد باید $0 < A \leq 1$ باشد.

اشاره: اگر در صورت سؤال، می‌گفت تابع نمایی فلان، نزولی باشد، شرطمان

$0 < A < 1$ می‌شد. پس در تابع $f(x) = \left(\frac{3m+1}{4}\right)^x$ برای نزولی شدن،

$$0 < \frac{3m+1}{4} \leq 1 \xrightarrow{\times 4} 0 < 3m+1 \leq 4 \quad \text{باید:}$$

$$\xrightarrow{-1} -1 < 3m \leq 3 \xrightarrow{\div 3} -\frac{1}{3} < m \leq 1$$

پس m دو مقدار صحیح دارد: صفر و ۱

۱۱۱. ۱

نکته: در توابع درجه سوم به شکل $y = ax^3 + b$ ، اگر $a > 0$ باشد، تابع

صعودی اکید و اگر $a < 0$ باشد، تابع نزولی اکید می‌شود.

با توجه به نکته قبل، برای این‌که $f(x) = (-9+k^2)x^3 + 5$ اکیداً نزولی

شود، باید ضریب x^3 ، یعنی $-9+k^2$ منفی باشد، پس:

$$-9+k^2 < 0 \Rightarrow k^2 < 9 \xrightarrow{\text{جذر}} |k| < 3 \Rightarrow -3 < k < 3$$

مقادیر صحیح k به صورت $-2, -1, 0, 1, 2$ هستند که مجموع آن‌ها برابر صفر می‌شود.

۱۱۲. تابع آبخاری $y = |x-a| - |x-b|$ ، به شرطی که ریشه

قدرمطلق اولش بزرگ‌تر از ریشه قدرمطلق دوم باشد نزولی است (یعنی $a > b$):



در هر دو شرط بالا، اگر مساوی قرار دهیم، نمودارمان به یک تابع ثابت تبدیل

می‌شود که هم صعودی است و هم نزولی. ریشه قدرمطلقها را حساب می‌کنیم:

$$f(x) = |x+2m-1| - |x-m+5|$$

ریشه: $-2m+1$ ریشه: $m-5$

شرط نزولی بودن را اعمال می‌کنیم:

$$-2m+1 \geq m-5 \Rightarrow -3m \geq -6 \Rightarrow m \leq 2$$

۱۱۳. ۳ اول نمودار تابع را رسم می‌کنیم:

با توجه به نمودار، تابع ابتدا صعودی (در $x \leq 0$)


رو به بالا) و سپس نزولی (در $x > 0$ رو به پایین)

است.

۱۱۴. ۱ ابتدا ضابطه را ساده می‌کنیم:

$$f(x) = \log_4 \sqrt[3]{x} = \log_4 x^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log_4 x$$

نمودار تابع $y = \log_4 x$ به صورت روبه‌رو است:



تابع صعودی اکید است.

اگر عددی مثبت مثل $\frac{1}{3}$ در ضابطه ضرب شود،


تغییری در یکنوایی ایجاد نمی‌کند.

۱۱۵. ۳

$$\begin{cases} \log x^2 = 2 \log |x| & \text{(توان زوج)} \\ \log x^3 = 3 \log x & \text{(توان فرد)} \end{cases}$$

نکته:

۱۰۶. ۴ نمودارها را کنار هم ببینید:



در گزینه‌های ۱ و ۲ وقتی از چپ به راست حرکت می‌کنیم، نمودار فقط رو

به بالا رفته، پس صعودی اکیدند.

در ۳، ابتدا نمودار رو به بالا رفته و سپس در یک نقطه به پایین آمده، پس

غیریکنواست.

در ۴، نمودار یا رو به بالا رفته یا ثابت بوده، پس صعودی است ولی صعودی

اکید نیست.

۱۰۷. ۲ تابع خطی زمانی اکیداً صعودی است که شیبش مثبت باشد، پس:

$$1-a^2 > 0 \Rightarrow a^2 < 1 \Rightarrow |a| < 1 \Rightarrow -1 < a < 1$$

عرض از مبدأ خط $f(x) = (1-a^2)x + (a+3)$ ، می‌شود $a+3$.

به کمک $-1 < a < 1$ ، محدوده عرض از مبدأ درمی‌آید:

$$-1 < a < 1 \xrightarrow{+3} 2 < a+3 < 4 \Rightarrow 2 < \text{عرض از مبدأ} < 4$$

۱۰۸. ۲ گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ $y = \sqrt{ax+b}$ با شرط $a < 0$ ، اکیداً نزولی است، پس $y = \sqrt{-2x+4}$

اکیداً نزولی می‌باشد.

۲ چون توان فرد است، منفی را می‌توانیم به داخل پرانتز ببریم:

$$y = -(2-x)^3 - 1 = (x-2)^3 - 1$$

توابع به فرم $y = a(x+\alpha)^3 + \beta$ با شرط $a > 0$ اکیداً صعودی هستند، پس

این تابع اکیداً صعودی است.

۳ تابع لگاریتمی $y = \log_{0.1} x$ ، چون مبنایش بین صفر و ۱ است، اکیداً

نزولی است.

۴ می‌دانیم $\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$. پس با تابع نمایی $y = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^x$ طرفیم که

چون پایه‌اش بین ۰ و ۱ است، تابعی اکیداً نزولی محسوب می‌شود.

۱۰۹. ۲ تابع نمایی $y = A^x$ با شرط $A > 1$ ، تابعی صعودی (یا اکیداً


صعودی) است. پس در تابع $y = \left(\frac{k+1}{3-k}\right)^x$ ، باید پایه بزرگ‌تر از ۱ باشد:

$$\frac{k+1}{3-k} > 1 \Rightarrow \frac{k+1}{3-k} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{k+1-3+k}{3-k} > 0 \Rightarrow \frac{2k-2}{3-k} > 0$$

ریشه صورت ۱ و ریشه مخرج ۳ است. جدول تعیین علامت می‌کشیم:


	۱	۳	
	-	+	-

۲ شکل بالا را نسبت به محور Xها قرینه می‌کنیم. $y = -x^2 |x| \Rightarrow$



۳ اکیداً صعودی $y = x|x| = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow$


۴ شکل بالا را نسبت به محور Xها قرینه می‌کنیم. $y = -x|x| \Rightarrow$



۱۱۹. ۱ با توجه به ریشه قدرمطلق ($x=0$)، تابع را دوضابطه‌ای می‌نویسیم:



$$f(x) = x|x| + \frac{x}{|x|} = \begin{cases} x(x) + \frac{x}{x} & x > 0 \\ x(-x) + \frac{x}{-x} & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} x^2 + 1 & x > 0 \\ -x^2 - 1 & x < 0 \end{cases}$$

تابع را در دامنه $\{0\} - (-1, 1)$ رسم می‌کنیم:



نمودار f فقط رو به بالا حرکت کرده، پس صعودی اکید (یا صعودی) است.

۱۲۰. ۳ ابتدا سهمی $y = x(x-2)$ را با داشتن ریشه‌هایش ($x=2, x=0$) و دهانه رو به بالا رسم می‌کنیم. بعد که قدرمطلق را اثر می‌دهیم، قسمت‌های زیر محور Xها قرینه می‌شوند:




نمودار آخر در بازه $(1, 2)$ یا $[1, 2]$ نزولی اکید است، پس:

$$\max(b-a) = 2-1 = 1$$

۱۲۱. ۳ اول تابع را دوضابطه‌ای می‌نویسیم:

$$y = x|x-2| = \begin{cases} x(x-2) & x \geq 2 \\ -x(x-2) & x < 2 \end{cases}$$



هر دو ضابطه سهمی با ریشه‌های صفر و ۲ ($x \geq 2$) هستند. نمودار را رسم می‌کنیم:



تابع رسم شده در بازه $[1, 2]$ نزولی اکید است.

ابتدا ضابطه را ساده می‌کنیم: $f(x) = \log_{\Delta} x^2 = 2 \log_{\Delta} |x|$

نمودار f را مرحله به مرحله رسم می‌کنیم:



چون تابع f، در قسمت‌هایی صعودی اکید ($x < 0$) و در قسمت‌هایی نزولی اکید است ($x > 0$)، پس غیریکنواست.


۱۱۶. ۴ دامنه تابع f را حساب می‌کنیم:

$$\left. \begin{aligned} x \geq 0 \\ x^2 > 0 \Rightarrow x > 0 \end{aligned} \right\} \cap \rightarrow x > 0 \Rightarrow D_f = (0, +\infty)$$

ضابطه f را ساده می‌کنیم:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{|x| \sqrt{x}} = \frac{1}{|x|} \xrightarrow{x > 0} f(x) = \frac{1}{x}$$





پس ضابطه f، به صورت $f(x) = \frac{1}{x}$ با دامنه $x > 0$ است.



نمودارش به شکل روبه‌رو است:


پس f، همواره نزولی است.

۱۱۷. ۲ نمودار هر یک از گزینه‌ها را رسم می‌کنیم:




با توجه به نمودارها، $f(x) = x - \frac{x}{|x|}$ غیریکنوا است و بقیه تابع‌ها صعودی اکید هستند.

۱۱۸. ۴ نمودار تمام توابع را رسم می‌کنیم:



خطوط داده شده در گزینه‌ها را رسم می‌کنیم:




۱۲۲. تابع $\frac{f}{g}$ را می‌نویسیم:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2 + x^2}{|x|} = \begin{cases} \frac{x^2 + x^2}{x} & x > 0 \\ \frac{x^2 + x^2}{-x} & x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} x^2 + x & x > 0 \\ -(x^2 + x) & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} x(x+1) & x > 0 \\ -x(x+1) & x < 0 \end{cases}$$

هر دو ضابطه سهمی با ریشه‌های $x = 0$ و $x = -1$ هستند. رأس هر دو سهمی هم



میانگین ریشه‌ها یعنی $x = -\frac{1}{2}$ است.


نمودار $\frac{f}{g}$ را رسم می‌کنیم:

پس تابع $\frac{f}{g}$ در بازه $(-\frac{1}{2}, 0)$ نزولی است.

۱۲۳. نمودار رسم می‌کنیم. اگر یادتان باشد شکل این توابع، آشنایی می‌شود! کافی است چهارتا نقطه بدهیم:


	کوچکتر	ریشه	ریشه	بزرگتر
x	-2	-1	2	3
y	-3	-3	3	3

این تابع در بازه $[-1, 2]$ یا $(-1, 2)$ اکیداً صعودی است.




اشاره: اگر جای «اکیداً صعودی» می‌گفت «صعودی»، جواب \mathbb{R} می‌شد.

۱۲۴. تابع $f(x) = |x+2| + |x-1|$ یک تابع گلدانی است. با نقطه‌یابی آن را رسم می‌کنیم:




پس f در بازه $(-\infty, -2)$ نزولی اکید است.

۱۲۵. ضابطه اول قابل رسم است:



ضابطه دوم، یک خط با شیب مثبت می‌باشد (یعنی صعودی است) که عرض از مبدأش a است. باید $a \leq 1$ انتخاب شود تا تابع صعودی اکید باشد:



پس حداکثر مقدار a برابر با ۱ است.


۱۲۶. ۳. به ازای $x \leq 0$ ، عبارت داخل قدرمطلق منفی می‌شود، پس ضابطه

$$4 - |x-1| = 4 - (-x+1) = x+3$$

بالا این جوری می‌شود:





$$f(x) = \begin{cases} x+3 & x \leq 0 \\ x^2+k & x > 0 \end{cases}$$

ضابطه تا این‌جا به شکل درآمده.



ضابطه اول را می‌توانیم رسم کنیم. ضابطه دوم هم قسمت راست سهمی x^2 است که با توجه به مقدار k ، از مبدأ بالا یا پایین می‌رود. با توجه به نمودار، فقط وقتی $k \geq 3$ انتخاب شود، نمودار رو به بالا می‌رود و صعودی اکید می‌شود.

۱۲۷. ۳. نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq -1 \\ g(x) & x > -1 \end{cases}$ را به ازای هر کدام از گزینه‌ها رسم می‌کنیم:



۱۲۸. ۳. در توابع $|x \pm \text{خط}|$ شرط اکیداً یکنوایی آن است که شیب هر دو ضابطه، هم‌علامت باشد.

۱. $y = |2x| + x = \begin{cases} 2x+x & x \geq 0 \\ -2x+x & x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 3x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$


۲. $y = |2x-4| - x = \begin{cases} (2x-4)-x & x \geq 2 \\ -(2x-4)-x & x < 2 \end{cases} = \begin{cases} x-4 & x \geq 2 \\ -3x+4 & x < 2 \end{cases}$

۳. $y = |x+1| + 2x = \begin{cases} (x+1)+2x & x \geq -1 \\ (-x-1)+2x & x < -1 \end{cases} = \begin{cases} 3x+1 & x \geq -1 \\ x-1 & x < -1 \end{cases}$

۴. $y = |x-1| + x = \begin{cases} (x-1)+x & x \geq 1 \\ (-x+1)+x & x < 1 \end{cases} = \begin{cases} 2x-1 & x \geq 1 \\ 1 & x < 1 \end{cases}$

فقط در ۳، شیب هر دو ضابطه هم‌علامت (هر دو مثبت) شد، پس اکیداً یکنواست.

اشاره: در ۴، شیب یکی از ضابطه‌ها ۲ و شیب دیگری صفر شد، پس صعودی (یکنوا) است ولی اکید نیست.



با توجه به منفی بودن $-a^2$ و $-b^2$ ، باید دنبال یک بازه دو سر منفی باشیم.

تابع نهایی در بازه $[-1, -\frac{1}{4}]$ صعودی است، پس:

$$\begin{cases} -a^2 = -1 \Rightarrow a = \pm 1 \\ -b^2 = -\frac{1}{4} \Rightarrow b = \pm \frac{1}{2} \end{cases}$$

بیشترین مقدار $b - a$ زمانی است که $b = \frac{1}{2}$ و $a = -1$ باشد:

$$\frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2} = 1.5$$

۱۳۳. ۲ ضابطه اول f را ساده تر می نویسیم:

$$\frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

پس کل ضابطه f به این صورت می شود:


$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{ادغام ضابطه اول و سوم}} \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

با داشتن ضابطه $g(x) = x^2 - x$ ، ضابطه $f \circ g$ را تشکیل می دهیم.

جای تمام x های ضابطه f ، $x^2 - x$ قرار می دهیم:


$$f(g(x)) = \begin{cases} 1 & x^2 - x \geq 0 \\ -1 & x^2 - x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 & x \geq 1 \text{ یا } x \leq 0 \\ -1 & 0 < x < 1 \end{cases}$$

نمودار $f \circ g$ را رسم می کنیم:



نمودار بالا را ۱ واحد به چپ می بریم تا به



نمودار $(f \circ g)(x+1)$ برسیم:



تابع نهایی در بازه $(-1, +\infty)$ رو به بالا یا ثابت است، پس صعودی است. در نتیجه کم ترین مقدار a برابر -1 است.

۱۳۴. ۲ نمودار تابع $y = x^3 + a$ ، همان نمودار تابع $y = x^3$ که a واحد

بالا (چون $a \in \mathbb{N}$) رفته است. پس نمودار $f(x) = |x^3 + a|$ این شکلی می شود:





۱۲۹. ۳ برای آن که تابع $|x^2 + 1|$ تابعی غیریکتوا باشد باید

شیب ضابطه هایش هم علامت نباشد.

با توجه به ضابطه $y = ax + 4 - |\frac{x}{4} + 1|$ ، شیب ضابطه ها $a - \frac{1}{4}$ و $a + \frac{1}{4}$ است. برای هم علامت نبودن، باید ضربشان منفی شود:

$$(a - \frac{1}{4})(a + \frac{1}{4}) < 0 \xrightarrow{\text{بین ریشه ها}} -\frac{1}{4} < a < \frac{1}{4}$$

۱۳۰. ۴ مرحله به مرحله از نمودار $f(x)$ به $f(-x+1)$ می رسمیم.





تابع نهایی در بازه های $[-2, -1]$ و $[1, 2]$ اکیداً نزولی است.

۱۳۱. ۴ با توجه به ضابطه $g(x) = -|x| + 2$ ، ضابطه $f \circ g$ به صورت

$$f(g(x)) = f(-|x| + 2)$$

مقابل می شود:

مرحله به مرحله از نمودار $f(x)$ به $f(-|x| + 2)$ می رسمیم.



نمودار نهایی در بین گزینه های داده شده در بازه $(1, 5)$ صعودی است (چون یا ثابت بوده یا رو به بالا حرکت کرده).

۱۳۲. ۴ اگر جای x^2 ، $|x|$ را بنویسیم، ضابطه f ساده می شود:

$$f(x) = \frac{|x| + x^2}{1 + |x|} = \frac{|x| + |x|^2}{1 + |x|} = \frac{|x|(1 + |x|)}{1 + |x|} = |x|$$

با توجه به این که مخرج f ریشه نداشت، پس دامنه هم \mathbb{R} می ماند.

با توجه به $f(x) = |x|$ و $g(x) = 2x^2 + x - 1$ ، ضابطه $f \circ g$ را تشکیل

$$f(g(x)) = |g(x)| = |2x^2 + x - 1|$$

می دهیم:

اول سهمی $y = 2x^2 + x - 1$ را رسم می کنیم و بعد قدرمطلق را اثر می دهیم.


با توجه به رابطه $a + c = b$ ، ریشه های سهمی -1 و $\frac{1}{2}$ هستند.

$$x_S = \frac{-1 + \frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}$$

طول رأس برابر است با:

$$2) m^2 \leq m + 12 \Rightarrow m^2 - m - 12 \leq 0$$

$$\Rightarrow (m-4)(m+3) \leq 0 \xrightarrow{\text{بین}} -3 \leq m \leq 4$$



اشتراک می‌گیریم:

$$① \cap ② = [-3, -2] \cup [1, 4]$$

$$\xrightarrow{\text{اعداد صحیح}} \{-3, -2, 1, 2, 3, 4\} \Rightarrow \text{مقدار } 6$$

۱۳۸. ۳. تابعی که هم صعودی و هم نزولی است، تابع ثابت است.

برای آن که $f(x) = mx^2 - nx - k$ ثابت باشد، باید ضریب X و X^2 صفر باشند: $m = n = 0$

مجموعه زوج مرتبی داده شده را بازنویسی می‌کنیم:

$$\{(m, n-1), (0, k), (n-1, m^2 + 2m-1), (3k+2, 2k+1)\}$$

$$\xrightarrow{m=n=0} \{(0, -1), (0, k), (-1, -1), (3k+2, 2k+1)\}$$

برای آن که دو زوج مرتب $(0, -1)$ و $(0, k)$ تابع بودن رابطه را به هم نزنند باید $k = -1$ باشد.

در نتیجه ضابطه تابع ثابت f به صورت $f(x) = -k = 1$ می‌شود و داریم:


$$f(\sqrt{5}) = 1$$

۱۳۹. ۲. طول رأس سهمی $f(x) = 3x^2 - 6x + 2$ مهم است:

$$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{6}{6} = 1$$



دهانه هم که رو به بالاست. پس شکلش این‌جوری است:



بازه $[-1, 2]$ را روی سهمی مشخص می‌کنیم:

قسمت باقی‌مانده، ابتدا نزولی و سپس صعودی است.

۱۴۰. ۴. دامنه تابع از حل نامعادله $|x-1| < 2$ به دست می‌آید:

$$|x-1| < 2 \Rightarrow -2 < x-1 < 2 \xrightarrow{+1} -1 < x < 3$$


ریشه‌های سهمی $f(x) = x^2 - 2x - 3$ را حساب می‌کنیم:

$$(x-3)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -1 \end{cases}$$

$$x_S = \frac{3+(-1)}{2} = 1$$

طول رأس هم میانگین ریشه‌ها است:

$$y_S = f(1) = -4$$




سهمی را رسم می‌کنیم:

در دامنه داده شده، سهمی غیریکنوا است و چون زیر محور X هاست، پس مقادیرش منفی است.

۱۴۱. ۴. طول رأس سهمی برابر است با:

$$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{2m+1}{2}$$



ضریب X^2 مثبت است، پس دهانه سهمی رو به بالاست:

برای به دست آوردن محل برخورد با محور X ها، Y را صفر می‌دهیم:

$$x^2 + a = 0 \Rightarrow x^2 = -a \Rightarrow x = -\sqrt{-a}$$

تابع نهایی در بازه $(-\infty, \sqrt{a}]$ و هر بازه‌ای که زیرمجموعه‌اش باشد، نزولی اکید است.

پس الان $(-\infty, a-2)$ باید زیرمجموعه $(-\infty, \sqrt{a})$ باشد، یعنی $a-2 < \sqrt{a}$ باید کوچک‌تر یا مساوی از $-\sqrt{a}$ باشد: $a + \sqrt{a} - 2 \leq 0$

برای حل نامعادله، تغییر متغیر $\sqrt{a} = t$ را می‌دهیم:

$$t^3 + t - 2 \leq 0 \xrightarrow{\text{بر } t-1 \text{ بخش‌پذیر}}$$

$$(t-1)(t^2 + t + 2) \leq 0 \xrightarrow{\text{پرانتر دوم همواره مثبت}} t-1 \leq 0$$

$$\Delta < 0, a > 0$$

$$\Rightarrow t \leq 1 \xrightarrow{t=\sqrt{a}} \sqrt{a} \leq 1 \Rightarrow a \leq 1$$

پس a فقط یک مقدار طبیعی $a = 1$ را می‌تواند داشته باشد.

۱۳۵. ۲. زوج مرتب‌ها را از X کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم:

$$(1, 1), (\sqrt{2}, m^2 - 2), (3, 6), (10, 20)$$

در تابع اکیدا صعودی، با افزایش X ها، باید Y ها هم زیاد شوند:

$$1 < m^2 - 2 < 6 < 20$$

فقط باید $1 < m^2 - 2 < 6$ را حل کنیم:

$$1 < m^2 - 2 < 6 \xrightarrow{+2} 3 < m^2 < 8$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} < |m| < 2\sqrt{2} \xrightarrow{\begin{matrix} \sqrt{3} \approx 1.7 \\ 2\sqrt{2} \approx 2.8 \end{matrix}} \begin{cases} 1.7 < m < 2.8 \\ \text{یا} \\ -2.8 < m < -1.7 \end{cases}$$

پس m فقط دو مقدار صحیح ± 2 را می‌گیرد.

۱۳۶. ۴. زوج مرتب‌ها را از X کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم:

$$(-1, a+1), (1, 3a+1), (2, 4a+3)$$

در تابع صعودی، با افزایش X ها، باید Y ها یا زیاد شوند یا ثابت بمانند:

$$a+1 \leq 3a+1 \leq 4a+3$$

نامعادله بالا به دو نامعادله تقسیم می‌شود:

$$1) a+1 \leq 3a+1 \Rightarrow 2a \geq 0 \Rightarrow a \geq 0$$

$$2) 3a+1 \leq 4a+3 \Rightarrow a \geq -2$$

اشتراک می‌گیریم:

$$\xrightarrow{\text{اشتراک}} a \geq 0$$

۱۳۷. ۳. برای تشکیل $f+g$ ، اول دامنه‌اش را حساب می‌کنیم:

$$D_{f+g} = D_f \cap D_g = \{-3, 1, 5\}$$

در X های مشترک، مقدار $f+g$ را پیدا می‌کنیم:

$$x = -3: f(-3) + g(-3) = m + 12$$

$$x = 1: f(1) + g(1) = (m^2 - 1) + 1 = m^2$$

$$x = 5: f(5) + g(5) = -m + 2$$

در تابع نزولی با افزایش X ها، باید مقادیر Y کم شوند یا ثابت بمانند:

$$-m + 2 \leq m^2 \leq m + 12$$

دو نامعادله را حل می‌کنیم:

$$1) m^2 \geq -m + 2 \Rightarrow m^2 + m - 2 \geq 0$$

$$\Rightarrow (m+2)(m-1) \geq 0 \xrightarrow{\text{نابین ریشه‌ها}} m \geq 1 \text{ یا } m \leq -2$$



دقت کنید که $ad - bc = 1 > 0$ ، پس تابع در هر یک از بازه‌های $(\frac{d}{c}, +\infty)$ ، $(-\infty, \frac{d}{c})$ صعودی است.
۱۴۶. $ad - bc$ باید مثبت باشد.

۱ $y = \frac{x-1}{x+3} \Rightarrow ad - bc = 3+1=4 \checkmark$

۲ $y = \frac{2x-3}{x+1} \Rightarrow ad - bc = 2+3=5 \checkmark$

۳ $y = \frac{-x+1}{x+3} \Rightarrow ad - bc = -3-1=-4 \times$

۴ $y = \frac{2x+1}{x-1} \Rightarrow ad - bc = -2-1=-3 \times$

در بین دو گزینه باقی‌مانده باید چک کنیم، ریشهٔ مخرج تابع، داخل بازهٔ $(-\infty, +\infty)$ نباشد.

۱ $y = \frac{x-1}{x+3} \xrightarrow{x=-2} -3 \notin (-2, +\infty) \times$

۲ $y = \frac{2x-3}{x+1} \xrightarrow{x=-1} -1 \in (-2, +\infty) \times$

پس جواب، **۱** است.

۱۴۷. **۴** ریشهٔ مخرج را حساب می‌کنیم: $2x - a = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{2}$

کافی است ریشهٔ مخرج در بازهٔ $(1, +\infty)$ نباشد، پس باید از $\frac{a}{2}$ کوچک‌تر یا مساوی باشد: $\frac{a}{2} \leq 1 \Rightarrow a \leq 2$

چون می‌خواهیم تابع اکیداً یکنوا باشد، پس تابع ما نباید تابع ثابت باشد.

برای آن که تابع $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ثابت نباشد، باید شرط $ad - bc \neq 0$ را داشته

باشد، پس در تابع $f(x) = \frac{x+1}{2x-a}$ باید:

$(1)(-a) - (1)(2) \neq 0 \Rightarrow -a - 2 \neq 0 \Rightarrow a \neq -2$

از دو شرط $a \leq 2$ و $a \neq -2$ به مجموعهٔ $(-\infty, 2] - \{-2\}$ می‌رسیم.

۱۴۸. **۳** از آن جایی که تابع هموگرافیک $f(x) = \frac{2x+b}{3x+d}$ در بازه‌های $(-\infty, -2)$ و $(-2, +\infty)$ یکنوا اکید است، نتیجه می‌گیریم عدد -2 ، ریشهٔ

مخرج است: $3(-2) + d = 0 \Rightarrow d = 6$

تا این جا ضابطهٔ f به شکل $f(x) = \frac{2x+b}{3x+6}$ درآمد. این تابع، محور x ها را در

نقطه‌ای به طول ۱ قطع می‌کند: $b = -2$ $\Rightarrow f(1) = 0$ با جای‌گذاری $d = 6$ و $b = -2$ ، یکنوایی گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ نزولی اکید \rightarrow نمایی با پایهٔ بین صفر و ۱ $y = 6^{-x} = (\frac{1}{6})^x$

۲ نزولی اکید \rightarrow نمودار $y = -2x^3$

۳ $y = 6x - 2|x| = \begin{cases} 4x & x \geq 0 \\ 8x & x < 0 \end{cases}$

چون شیب هر دو ضابطه مثبت شد و تابع ناپوستگی ندارد، پس صعودی اکید است.

۴ نزولی اکید \rightarrow شیب منفی $y = -2x + 6$

پس جواب **۳** است.

۱۴۹. **۴** چون f نزولی است، پس بعد از حذف f ، جهت نامساوی عوض

می‌شود: $2a - 1 < 5 - a \xrightarrow{\text{تغییر جهت}} 3a - 1 < 6 \Rightarrow a < 2$


برای آن که سهمی در بازهٔ $[-1, 2]$ غیریکنوا باشد، باید x_S در این بازه قرار گیرد:
 پس: $-1 < x_S < 2 \Rightarrow -1 < \frac{2m+1}{2} < 2$

$\xrightarrow{\times 2} -2 < 2m+1 < 4 \xrightarrow{-1} -3 < 2m < 3$
 $\xrightarrow{\div 2} -\frac{3}{2} < m < \frac{3}{2}$

۱۴۲. **۲** اول طول رأس سهمی $y = (\frac{1}{m})x^2 - x + 3$ را پیدا می‌کنیم:


$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{1}{2(\frac{1}{m})} = \frac{m}{2}$

چون علامت a را نداریم، باید در دو حالت بررسی کنیم:
 (۱) ضریب x^2 یعنی $\frac{1}{m}$ مثبت باشد ($m > 0$). در این حالت سهمی این شکلی است:



برای آن که در بازهٔ $[1, +\infty)$ صعودی باشد باید ۱ یا روی رأس باشد یا بعد از رأس، پس: $m \leq 2 \Rightarrow m \geq \frac{m}{2}$

از اشتراک دو شرط $m > 0$ و $m \leq 2$ به $0 < m \leq 2$ می‌رسیم.



(۲) ضریب x^2 یعنی $\frac{1}{m}$ منفی باشد ($m < 0$). در این حالت سهمی این شکلی است:

که با کمی دقت متوجه می‌شویم که امکان ندارد تابع در بازهٔ $[1, +\infty)$ صعودی باشد، چون تابع در بازهٔ $[\frac{m}{2}, +\infty)$ نزولی است، هر چه که باشد باز هم امکان ندارد که با $[1, +\infty)$ اشتراکی پیدا نکند! پس این حالت کلاً اتفاق نمی‌افتد.

حالا بین جواب‌های دو حالت، اجتماع می‌گیریم:

$(1) \cup (2) = (0, 2] \cup \emptyset = (0, 2]$

۱۴۳. **۲** ضابطهٔ سهمی را با داشتن ریشه‌هایش می‌نویسیم:

$y = a(x-6)(x+2)$

سهمی رسم‌شده از نقطهٔ $(0, 6)$ می‌گذرد، پس: $6 = a(-6)(2) \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$
 در نتیجه ضابطهٔ سهمی به این شکل می‌شود:

$f(x) = \frac{-1}{2}(x-6)(x+2) = \frac{-1}{2}x^2 + 2x + 6$

حالا ضابطهٔ g را تشکیل می‌دهیم: $g(x) = kx^2 + 4(\frac{-1}{2})x^2 + 2x + 6$
 $= kx^2 - 2x^2 + 2x + 6 = (k-2)x^2 + 2x + 6$

می‌دانیم توابع درجه ۲، یکنوا نیستند، پس برای آن که g یکنوا باشد باید ضریب x^2 صفر باشد: $k - 2 = 0 \Rightarrow k = 2$

۱۴۴. **۴** ریشهٔ مخرج را حساب می‌کنیم: $x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$

پس تابع در بازه‌های $(-\infty, 3)$ و $(3, +\infty)$ یکنواست.

با توجه به بازهٔ یکنوایی $(-\infty, a)$ ، حداکثر a برابر ۳ است. (دقت کنید که چون $ad - bc = -7 < 0$ ، پس تابع روی هر کدام از بازه‌ها نزولی است.)

۱۴۵. **۱** ریشهٔ مخرج تابع $y = \frac{-1}{x-2}$ را پیدا می‌کنیم.

$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

پس تابع در بازه‌های $(-\infty, 2)$ و $(2, +\infty)$ اکیداً یکنواست.

با توجه به بسته‌بودن انتهای بازهٔ $(-\infty, a]$ ، حداکثر مقدار صحیح a ، عدد ۱ است نه ۲.

با توجه به این که $1+x^2$ و $3+x^2$ هر دو بزرگتر از صفر هستند، پس هر دو در شاخه $(0, +\infty)$ قرار دارند. می‌خواهیم نمودار تابع $f(1+x^2)$ بالای نمودار $f(3+x^2)$ باشد:

چون f اکیداً نزولی است (در شاخه $(0, +\infty)$)، پس با حذف f ، جهت عوض می‌شود:

$$1+x^2 < 3+x^2 \Rightarrow x^2 - x^2 - 2 < 0$$

همواره مثبت

$$\Rightarrow x^2 - 2 < 0 \Rightarrow x^2 < 2 \Rightarrow |x| < \sqrt{2} \Rightarrow -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$$

فقط بازه $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ، زیرمجموعه بازه $(-1, 1)$ است.

۱۵۴. ۱ با توجه به ضابطه $f(x) = -x^2 + 2$ ، می‌فهمیم f تابعی اکیداً نزولی است.

نامعادله را به شکل روبه‌رو می‌نویسیم:

با حذف f ، جهت نامساوی عوض می‌شود:

حالا جای $f(x)$ ، ضابطه‌اش را می‌نویسیم:

$$-x^2 + 2 < x^2 \Rightarrow x^2 + x^2 - 2 > 0$$


عبارت $2 - x^2 + x^2$ به ازای $x = 1$ صفر می‌شود، پس بر $x - 1$ بخش پذیر است. اگر $2 - x^2 + x^2$ را بر $x - 1$ تقسیم کنیم، خارج قسمت $2x^2 + 2x + 2$ می‌شود، پس:

چون دلتای $2x^2 + 2x + 2$ منفی و ضریب x^2 مثبت است، پس همواره مثبت است و می‌توانیم حذفش کنیم:

$$(x-1)(x^2 + 2x + 2) > 0 \Rightarrow x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$$

بی‌اثر

۱۵۵. ۴ راه‌اول: برای f یک نمودار اکیداً نزولی که محور x ها را در ۳ قطع کند، رسم می‌کنیم:



برای دامنه تابع رادیکالی g ، باید زیرش را بزرگتر یا مساوی صفر قرار دهیم:

$$x^2 f(x) \geq 0 \xrightarrow{\text{ریشه‌ها}} \begin{cases} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \\ f(x) = 0 \Rightarrow x = 3 \end{cases}$$

جدول تعیین علامت رسم می‌کنیم:

	مرتبه زوج		
	+	+	+
x^2	+	+	+
$f(x)$	+	+	-
$x^2 f(x)$	+	+	-

از جدول بالا، مقادیر بزرگتر یا مساوی صفر را می‌خواهیم: $D_g = (-\infty, 3]$ که در دامنه g ، ۴ عدد صحیح نامنفی (یعنی ۰، ۱، ۲ و ۳) داریم.

راه دوم: می‌توانیم برای f یک تابع مثال بزینم. ساده‌ترین تابع، تابع خطی است، پس $f(x) = -x + 3$ را در نظر می‌گیریم (۳ را برای این نوشتیم که تابع، محور x ها را در نقطه $x = 3$ قطع کند). حالا دامنه تابع $y = \sqrt{x^2 f(x)}$ پیدا می‌کنیم:

$$y = \sqrt{x^2(-x+3)} \xrightarrow{\text{دامنه}} x^2(-x+3) \geq 0$$

$$\xrightarrow{\text{ریشه‌ها}} \begin{cases} x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ریشه زوج} \\ -x+3 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ ریشه فرد} \end{cases}$$

۱۵۰. ۳ برای دامنه تابع رادیکالی g ، باید زیرش را بزرگتر یا مساوی صفر قرار

$$f(2x+1) - f(x-2) \geq 0 \Rightarrow f(2x+1) \geq f(x-2)$$

حالا باید بگوییم چون f نزولی است، پس با حذف f ، جهت عوض می‌شود:

$$f(2x+1) \geq f(x-2) \xrightarrow{f \text{ نزولی}} 2x+1 \leq x-2 \Rightarrow x \leq -3$$

پس، $D_g = (-\infty, -3]$.

۱۵۱. ۱ اگر f اکیداً نزولی باشد، از نامساوی $f(a) > f(b)$ ، به $a < b$ می‌رسیم (بعد از حذف f ، جهت عوض می‌شود)، پس:

$$f(m^2 - m - 5) < f(-3 + 2m - m^2)$$

$$\xrightarrow{f \text{ اکیداً نزولی}} m^2 - m - 5 > -3 + 2m - m^2$$

$$\Rightarrow 2m^2 - 3m - 2 > 0 \xrightarrow{\times 2} 4m^2 - 6m - 4 > 0$$

$$\Rightarrow (2m-4)(2m+1) > 0 \xrightarrow{\text{نابین ریشه‌ها}} m > 2 \text{ یا } m < -\frac{1}{2}$$

چون $D_f = \mathbb{R}^-$ ، پس در هر عبارت به فرم $f(\text{دایره}) < 0$ باید شرط برقرار باشد. با توجه به وجود دو عبارت $f(m^2 - m - 5)$ و $f(-m^2 + 2m - 3)$ داریم:

$$m^2 - m - 5 < 0 \xrightarrow{\Delta=21} \frac{1-\sqrt{21}}{2} < m < \frac{1+\sqrt{21}}{2}$$

بین ریشه‌ها $= -1/8$ $= 2/8$

$$-m^2 + 2m - 3 < 0 \xrightarrow{\Delta < 0} m \in \mathbb{R}$$

بین سه شرط باید اشتراک بگیریم. البته شرط ۳ که $m \in \mathbb{R}$ را بی‌خیال می‌شویم!

محدوده m به صورت روبه‌رو است: $(-\frac{1}{8}, \frac{2}{8}) \cup (2, \frac{2}{8})$ شامل یک عدد صحیح

۱۵۲. ۱ اگر f اکیداً صعودی باشد، از نامساوی $f(a) < f(b)$ ، به $a < b$ می‌رسیم (بعد از حذف f ، جهت عوض نمی‌شود)، پس:

$$f(2m^2 - 9m - 2) < f(m^2 - 4m + 4)$$

$$\xrightarrow{f \text{ اکیداً صعودی}} 2m^2 - 9m - 2 < m^2 - 4m + 4$$

$$\Rightarrow m^2 - 5m - 6 < 0 \Rightarrow (m+1)(m-6) < 0$$

$$\xrightarrow{\text{بین ریشه‌ها}} -1 < m < 6$$

$$\xrightarrow{\text{مقادیر صحیح}} m = \{0, 1, \dots, 5\}$$

چون دامنه f ، \mathbb{R}^+ است، پس باید در دو عبارت $f(2m^2 - 9m - 2)$ و $f(m^2 - 4m + 4)$ ، به ازای m عبارات داخل پرانتز مثبت باشند.

۱ از بین m های به دست آمده، $m = 2$ در $f((m-2)^2)$ قبول نیست، چون $f(0)$ را به ما می‌دهد.

مثبت نشد!

۲ از بین m های باقی‌مانده (۰، ۱، ۳، ۴ و ۵)، باید چک کنیم به ازای کدام مقدار، $2m^2 - 9m - 2$ مثبت می‌شود. فقط $m = 5$ این شرط را دارد، پس به ازای یک مقدار صحیح m این اتفاق می‌افتد.

۱۵۳. ۱ $f(x) = \frac{-x+1}{x}$ یک تابع هموگرافیک است. $ad - bc = (-1)(0) - (1)(1) = -1$ حساب می‌کنیم:

ریشهٔ مخرج هم $x = 0$ است. پس این تابع در بازه‌های قبل و بعد ریشهٔ مخرج، اکیداً نزولی است.




جدول تعیین علامت رسم می کنیم:

	+	+	-
	جواب		

۱۵۶. **۱ راه اول:** برای f یک نمودار اکیداً صعودی

که محور x ها را در 2 قطع کند، رسم می کنیم:



برای دامنه تابع رادیکالی $g(x) = \sqrt{(x^2 - x)f(x)}$ ، باید زیرش را بزرگ تر یا مساوی صفر قرار دهیم:

$$(x^2 - x)f(x) \geq 0 \Rightarrow x(x-1)f(x) \geq 0$$

جدول تعیین علامت می کشیم:

x	0	1	2	
$f(x)$	-	-	-	+
$(x^2 - x)$	+	-	+	+
کل	-	+	-	+

پس: $D_g = [0, 1] \cup [2, +\infty)$ دامنه g و شامل تمام اعداد طبیعی می باشد.

راه دوم: می توانیم برای f یک تابع ساده (مثلاً خطی) مثال بزنیم که اکیداً صعودی باشد و محور طولها را در نقطه $x = 2$ قطع کند یعنی $f(x) = x - 2$

حالا دامنه تابع $y = \sqrt{(x^2 - x)f(x)}$ را پیدا می کنیم:

$$y = \sqrt{(x^2 - x)(x - 2)} = \sqrt{x(x-1)(x-2)}$$

$$x(x-1)(x-2) \geq 0$$

حالا جدول تعیین علامت می کشیم:

x	0	1	2	
	-	+	-	+
	جواب		جواب	

$$D_g = [0, 1] \cup [2, +\infty)$$

۱۵۷. **۴** عبارت زیر رادیکال را بزرگ تر مساوی صفر قرار می دهیم:

$$f\left(\frac{1}{x}\right) - f(x) \geq 0 \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) \geq f(x)$$

$f(x) = 2^x$ تابعی اکیداً صعودی است، پس با حذف آنها، علامت برمی گردد:

$$\frac{1}{x} \geq x$$

نامعادله به دست آمده را حل می کنیم:


$$\frac{1}{x} - x \geq 0 \Rightarrow \frac{1-x^2}{x} \geq 0 \Rightarrow \frac{(1-x)(1+x)}{x} \geq 0$$

جدول تعیین علامت می کشیم:



x	-1	0	1	
کل	+	-	+	-
	جواب		جواب	

$$(-\infty, -1] \cup (0, 1]$$

۱۵۸. **۲** نمودار تابع $f(x) = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + 4$ را می کشیم:



قرینه نسبت به محور x ها



محل برخورد تابع نهایی با محور x ها مهم است:

$$-\left(\frac{1}{2}\right)^x + 4 = 0 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x = 4 \Rightarrow x = -2$$

پس f تابعی اکیداً صعودی با ریشه $x = -2$ است.

برای محاسبه دامنه تابع رادیکالی $g(x) = \sqrt{xf(x)}$ ، زیرش را بزرگ تر یا مساوی صفر قرار می دهیم:

$$xf(x) \geq 0$$

	-2	0	
x	-	-	+
$f(x)$	-	+	+
کل	+	-	+

$$D_g = (-\infty, -2] \cup [0, +\infty) = \mathbb{R} - (-2, 0)$$

۱۵۹. **۴** یکنوایی تابع $f(x) = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^x + \log_{0.5} x\right)^3$ را بررسی می کنیم:

$$\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x + \log_{0.5} x\right)^3$$

ترکیب تابع $y = x^3$ و $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x + \log_{0.5} x$ تابعی نزولی اکید می دهد.

دامنه این تابع با توجه به عبارت $\log_{0.5} x$ ، محدوده $(0, +\infty)$ است.

نامعادله داده شده را ساده می کنیم:

$$f(f(x)) < f(2^{-3x}) \xrightarrow[\text{حذف fها}]{\text{f نزولی اکید}} f(x) > 2^{-3x}$$

جای $f(x)$ ، ضابطه اش را قرار می دهیم:

$$\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x + \log_{0.5} x\right)^3 > 2^{-3x}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x + \log_{0.5} x > \left(\frac{1}{2}\right)^x \Rightarrow \log_{0.5} x > 0$$

$$\xrightarrow{\text{پایه بین صفر و یک}} x < 0.5 \Rightarrow x < 1$$

اشتراک بین $(0, +\infty)$ و $x < 1$ ، محدوده $(0, 1)$ را می دهد.

۱۶۰. **۲** یکنوایی تابع $f(x) = (x + \log x)^5$ را بررسی می کنیم:

پس صعودی می مونه \rightarrow خنثی

$$(x + \log x)^5$$

ترکیب تابع $y = x + \log x$ و $y = x^5$ ، تابعی صعودی اکید می دهد. دامنه این تابع با توجه به عبارت $\log x$ ، محدوده $(0, +\infty)$ است.

نامعادله داده شده را ساده می کنیم:

$$f(f(x)) < f(x^5) \xrightarrow[\text{حذف fها}]{\text{f صعودی اکید}} f(x) < x^5$$

$$\Rightarrow (x + \log x)^5 < x^5 \xrightarrow{\text{فرجه 5}} x + \log x < x$$

$$\Rightarrow \log_{0.5} x < 0 \Rightarrow x < 1 \Rightarrow x < 1$$

اشتراک بین $(0, +\infty)$ و $x < 1$ ، محدوده $(0, 1)$ را می دهد.

۱۶۱. ۲ همه جملات را بررسی می‌کنیم:

(الف) جمع تابع صعودی و نزولی، نامشخص است یعنی می‌تواند صعودی یا نزولی یا ثابت یا غیریکنوا شود. مثلاً اگر $f(x) = 3x + 1$ و $g(x) = -x - 1$ باشد، آن وقت $(f+g)(x) = 2x$ که تابعی صعودی است.

(ب) جمع صعودی اکید و صعودی، تابعی صعودی اکید است.

(پ) اگر g نزولی باشد، آن‌گاه $-g$ صعودی است، پس:

$$\text{صعودی اکید} = (\text{صعودی}) + \text{صعودی اکید} = f - g$$

(ت) اگر f صعودی اکید و g تابعی ثابت باشد، fg ، می‌تواند صعودی اکید یا نزولی اکید یا ثابت باشد:

$$\text{صعودی اکید} \Rightarrow (fg)(x) = 2x \Rightarrow f(x) = x, g(x) = 2$$

$$\text{نزولی اکید} \Rightarrow (fg)(x) = -2x \Rightarrow f(x) = x, g(x) = -2$$

$$\text{ثابت} \Rightarrow (fg)(x) = 0 \Rightarrow f(x) = x, g(x) = 0$$

پس دو جمله (ب) و (پ) درست بودند.

۱۶۲. ۲ با فرض $g(x) = -x^3$ ، جای $f(-x^3)$ می‌توانیم بنویسیم $f \circ g$.

سؤال گفته f اکیداً نزولی است، از طرفی $g(x) = -x^3$ هم اکیداً نزولی است. با توجه به این که ضرب دو عدد منفی، عددی مثبت است: $(-) \times (-) \Rightarrow (+)$

$$f, g \Rightarrow f \circ g$$

پس:

صعودی نزولی نزولی

۱۶۳. ۴ گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱ صعودی = صعودی + صعودی = $f(x) + \sqrt{x}$

۲ صعودی $\Rightarrow (-) \times (-) \times (+) = (+) \Rightarrow g \circ g(x)$

۳ نامشخص $\Rightarrow (-) \times$ نامشخص $\Rightarrow g(x^2)$

۴ نزولی $\Rightarrow (+) \times (-) \times (+) \times (+) = - \Rightarrow (f \circ g \circ f)(x)$

۱۶۴. ۱ تابع $\sqrt{2-x} + 1$ به صورت مقابل است: این تابع، اکیداً نزولی است و مقادیرش تغییر علامت نمی‌دهند (چون بالای محور x هاست)، پس

$$\frac{1}{\sqrt{2-x} + 1}$$

۱۶۵. ۲ برای f یک ضابطه در نظر می‌گیریم؛ مثلاً $y = -(2^x)$.

f نزولی اکید و زیر محور x هاست.

حالا دو ضابطه را تشکیل می‌دهیم و با مقایسه مقادیر در $x = 1$ و $x = 2$ ، وضعیت یکنوایی را مشخص می‌کنیم (چون در گزینه‌ها غیریکنوا نداریم، مشکلی پیش نمی‌آید).

$$g(x) = -x, f(x) = x \cdot 2^x \Rightarrow \begin{cases} g(1) = 2 \\ g(2) = 8 \end{cases} \Rightarrow \text{اکیداً صعودی}$$

$$h(x) = \frac{1}{f(-x)} = \frac{1}{-2^{-x}} = \frac{1}{-(\frac{1}{2})^x} \Rightarrow \text{اکیداً نزولی}$$

۱۶۶. ۱ با توجه به نمودار، $f(x)$ تابعی اکیداً نزولی است، پس $-f(x)$ تابعی اکیداً صعودی است. از طرفی جمع دو تابع اکیداً صعودی، تابعی اکیداً صعودی است:

$$\underbrace{\sqrt{x}}_{\text{اکیدصعودی}} + \underbrace{(-f(x))}_{\text{اکیدصعودی}} = \text{اکیدصعودی}$$

برای به دست آوردن برد تابع اکیداً صعودی که ناپیوستگی ندارد، مقادیر تابع را در نقاط ابتدا و انتهای دامنه حساب می‌کنیم. دامنه \sqrt{x} بازه $[0, +\infty)$ و دامنه f بازه $(2, 5)$ است که اشتراکشان $(2, 5)$ می‌شود، پس:


$$g(x) = \sqrt{x} - f(x) \xrightarrow{\text{برد}} \begin{cases} g(2) = \sqrt{2} - f(2) = \sqrt{2} - 3 \\ g(5) = \sqrt{5} - f(5) = \sqrt{5} + 1 \end{cases}$$

پس بردمان محدوده $[\sqrt{2} - 3, \sqrt{5} + 1]$ است که تقریباً $[-1/6, 3/2]$ می‌شود.

الان اگر براکت بگیریم، بردمان شامل $2, 3, 1, 0, -1, -2$ می‌شود.

۱۶۷. ۴ دقت کنید دامنه‌های هر دو تابع محدود است. هر دو تابع را بررسی می‌کنیم.

$$(1) f(x) = \frac{-1}{x} + \sqrt{x} \quad \text{دامنه } f \text{ بازه } (0, +\infty) \text{ است.}$$



نمودار $y = \frac{-1}{x}$ در این بازه به صورت روبه‌رو است:



$$\text{پس: صعودی} \Rightarrow f(x) = \frac{-1}{x} + \sqrt{x} \quad \begin{matrix} \text{صعودی} \\ \text{صعودی} \end{matrix}$$

$$(2) g(x) = |x| + \sqrt{-x} \quad \text{دامنه } g, \text{ بازه } (-\infty, 0] \text{ است.}$$

$$\text{پس جای } |x| \text{ می‌توانیم } -x \text{ قرار دهیم: نزولی} \Rightarrow g(x) = -x + \sqrt{-x} \quad \begin{matrix} \text{نزولی} \\ \text{نزولی} \end{matrix}$$

۱۶۸. ۲ تابع f را به صورت جمع دو تابع $g(x) = x^2 - 2x$ و

$$f(x) = x^2 - 2x + \sqrt{1-x} \quad \text{می‌بینیم: } h(x) = \sqrt{1-x}$$



دامنه f ، به صورت $(-\infty, 1]$ است.

نمودار g و h را با شرط

$x \leq 1$ رسم می‌کنیم:

هر دو تابع، اکیداً نزولی هستند. چون جمع دو تابع اکیداً نزولی، تابعی اکیداً نزولی است، پس f اکیداً نزولی است.

۱۶۹. ۲ دامنه تابع f را حساب می‌کنیم:

$$\left. \begin{matrix} \sqrt{x} \Rightarrow x \geq 0 \\ 2\sqrt{x^2-1} \xrightarrow{\text{مخرج}} x \neq \pm 1 \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{اشتراک}} D_f = [0, 1) \cup (1, +\infty)$$

در دو بازه $(0, 1)$ و $(1, +\infty)$ ، یکنوایی تابع را بررسی می‌کنیم.

(۱) تابع $y = 2\sqrt{x}$ در هر دو بازه بالا صعودی اکید است.

(۲) تابع $y = \frac{-3}{2\sqrt{x^2-1}}$ را مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم:

$$y = \sqrt{x^2-1} \xrightarrow{\sqrt{\quad}} y = \sqrt{x^2-1} \text{ صعودی اکید} \rightarrow y = x^2 - 1$$

$$\xrightarrow{\text{معکوس}} y = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \xrightarrow{\frac{x-2}{\quad}} y = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \text{ نزولی اکید}$$

$$y = \frac{-3}{2\sqrt{x^2-1}} \text{ صعودی اکید}$$

از طرفی می‌دانیم مجموع دو تابع صعودی اکید، تابعی صعودی اکید است، پس

$$\text{تابع } f(x) \text{ صعودی اکید است. } f(x) = 2\sqrt{x} + \frac{-3}{2\sqrt{x^2-1}} \quad \begin{matrix} \text{صعودی اکید} \\ \text{صعودی اکید} \end{matrix}$$

۱۷۰. ۲ در تابع $f(x) = 2x + 1 + \sqrt{x-1}$ عامل $2x + 1$ صعودی اکید و $\sqrt{x-1}$ هم صعودی اکید است. پس f هم صعودی اکید است؛ بنابراین برای پیدا کردن برد می‌توانیم نقاط ابتدا و انتهای دامنه را در تابع قرار دهیم. دامنه تابع f برابر است با بازه $[1, +\infty)$ ، پس بردش می‌شود:

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 2 + 1 + \sqrt{0} = 3 \Rightarrow f \geq 3$$

$$\Rightarrow R_f = [3, +\infty)$$

پس برد تابع f شامل اعداد طبیعی 1 و 2 یعنی دو عدد طبیعی نیست.



۱۷۱. تابع f از جمع دو عبارت اکیداً صعودی تشکیل شده، پس خودش

هم اکیداً صعودی است:

$$f(x) = \underbrace{2\sqrt{x+2}}_{\text{اکیداً صعودی}} + \underbrace{(-\sqrt{-x+7})}_{\text{اکیداً صعودی}}$$

اکیداً صعودی

تابع f ، دو عبارت رادیکالی دارد، دامنه‌اش را حساب می‌کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{x+2} \xrightarrow{\text{دامنه}} x \geq -2 \\ \sqrt{7-x} \xrightarrow{\text{دامنه}} x \leq 7 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{اشتراک}} D_f = [-2, 7]$$

چون f اکیداً صعودی (و پیوسته) است، پس برای محاسبه برد باید مقادیر را در

$x = -2$ و $x = 7$ حساب کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} f(-2) = 2\sqrt{0} - \sqrt{9} = -3 \\ f(7) = 2\sqrt{9} - \sqrt{0} = 6 \end{array} \right\} \Rightarrow R_f = \left[\underset{a}{-3}, \underset{b}{6} \right]$$

$$b - a = 6 - (-3) = 9$$

پس:

۱۷۲. توابع $x^3 - x$ و $\sqrt{-x+1}$ هر دو اکیداً نزولی هستند، پس

مجموعشان هم اکیداً نزولی است:

$$f(x) = \underbrace{-x^3}_{\text{اکیداً نزولی}} + \underbrace{(\sqrt{-x+1})}_{\text{اکیداً نزولی}}$$

اکیداً نزولی

چون f اکیداً نزولی (و پیوسته) است، پس برای محاسبه برد باید مقادیر را در

نقاط ابتدا و انتهای دامنه یعنی $x = -4$ و $x = -1$ حساب کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} f(-4) = -(-4)^3 + \sqrt{4+1} = 67 \\ f(-1) = -(-1)^3 + \sqrt{1+1} = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow R_f = \left(\underset{a}{3}, \underset{b}{67} \right]$$

$$b - a = 67 - 3 = 64$$

پس:

۱۷۳. ضابطه f را ساده‌تر می‌نویسیم:

$$f(x) = 2\sqrt{9\cos^2 x - 1} - 2\sqrt{9\cos^2 x - 1}$$

$$f(x) = 2\sqrt{9\cos^2 x - 1} - \frac{1}{2\sqrt{9\cos^2 x - 1}}$$

توان منفی را اثر می‌دهیم:

محدوده تغییرات عبارت $\sqrt{9\cos^2 x - 1}$ را پیدا می‌کنیم:

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \xrightarrow{\text{توان } 2} 0 \leq \cos^2 x \leq 1$$

$$\xrightarrow{\times 9} 0 \leq 9\cos^2 x \leq 9 \xrightarrow{-1} -1 \leq 9\cos^2 x - 1 \leq 8$$

$$\xrightarrow{\text{فرجه } 3} -1 \leq \sqrt{9\cos^2 x - 1} \leq 2$$

با فرض $A = \sqrt{9\cos^2 x - 1}$ ، می‌دانیم: $-1 \leq A \leq 2$.

توابع $y = 2A$ و $y = -\frac{1}{2A}$ ، توابعی صعودی و پیوسته هستند، پس

مجموعشان نیز صعودی و پیوسته است:

$$y = 2A + \frac{-1}{2A}$$

برای به دست آوردن برد این تابع، کافی است مقدار تابع را در نقطه ابتدا و انتهای

دامنه به دست آوریم:

$$\left. \begin{array}{l} A = -1 \Rightarrow y = 2^{-1} + \frac{-1}{2^{-1}} = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2} \\ A = 2 \Rightarrow y = 2^2 + \frac{-1}{2^2} = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4} \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \text{برد} = \left[-\frac{3}{2}, \frac{15}{4} \right]$$

$$b - a = \frac{15}{4} - \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{21}{4}$$

پس: