



پایه یازدهم

مادری بیست سپاسبان ۱

مصطفی دیداری

درسنامه سؤال‌های امتحانی با پاسخ تشریحی امتحان نهایی

درسنامه‌های کاربردی، روان و گویا منطبق بر کتاب درسی به همراه بیش از ۲۰۰ مثال آموزشی

پوشش کامل همه مثال‌ها و تمرین‌ها و کار در کلاس‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی

تیپ‌بندی سؤال‌های نهایی در قالب «در امتحان چه خبر؟»

دارای ۱۱۶۰ سوال امتحانی طبقه‌بندی شده از ساده به دشوار شامل سؤالات تألیفی

و برگرفته از امتحان‌های مدارس برتر کشور

حاوی سؤالات امتحانی دشوار جهت شبیه‌سازی و پیش‌بینی سؤال‌های دشوار امتحان نهایی

آزمون‌های جمع‌بندی انتهای هر فصل برای خودسنجشی + نمونه امتحان‌های نوبت اول و دوم

به همراه ضمیمه رایگان مرور و جمع‌بندی مخصوص شب‌های امتحان





مقدمه³ ناشر

... حتماً مقدمه کتاب حسابان جای بی‌ربطی برای نوشتن از او نیست. تا همین چند وقت پیش همه رسانه‌ها - از شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای گرفته تا روزنامه‌های رسمی کشور - در یک فضای عاطفی و حزن‌آلود از زندگی و مرگ دختر نابغه ریاضی گفتند، نوشتند، روایت کردند و گریستند. حتی بی‌ربط‌ترین رسانه‌ها و اشخاص هم او را به نام کوچکش صدا زدند و افسوس خوردند. درک مقام علمی او کار آسونی نیست. ما فقط این قدر می‌دونیم که خیلی حالیش بود! می‌دونید چرا؟ چون جایزه فیلدز (معتبرترین جایزه علمی ریاضی دنیا) رو برای موضوع "Symmetry of curved Surfaces" (که دقیقاً نمی‌دونیم یعنی چی!) گرفت. چون خیلی از جایزه‌ها و افتخارات معتبر دیگه علمی رو هم از آن خودش کرد. چون در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا بر کرسی استادی تکیه داد. چون همه بزرگان ریاضی عالم به زبون آمدند که «او اسطوره‌ای عجیب و شگفت‌انگیز در عالم ریاضیات بود.»^۱ و ... بدون شک این حرفا در این دوره و زمونه که گاهی به ایرانی‌بودنمون افتخار نمی‌کنیم، مثل آمپول تقویتی عمل می‌کنه و کمی حس وطن‌دوستی رو در ما زنده نگه می‌داره، اما موضوع اینه که در زندگی آدمایی مثل او همیشه نکته‌های آموزنده جهان‌شمول هست که می‌تونه الگوی همه آدمای دنیا باشه. (لطفاً بقیه این مقدمه رو با دقت بیشتر بفونید و خوب خوب رابع بهش فکر کنید!)

پدرش در مصاحبه با یک روزنامه گفت: «او ساده مثل همه بود، درس خواند، بالا رفت؛ با کوشش و تلاش» (کوشش و تلاش) «کلیدواژه است، اون رو به خاطر بسپارید.»

وقتی از پدر پرسیدند: حالا چرا ریاضی؟ جواب داد: «ریاضی چون منطق دارد، آدم را جذب می‌کند ... ریاضیات تجربه ذهن دارد و لذت حل یک مسئله آدم را سر ذوق می‌آورد. رسیدن به یک راه‌حل انسان را راضی می‌کند ...» (یه کلیدواژه ریگه: «لذت حل مسئله»!)

خودش هم حرف پدر را می‌زند: «زیبایی ریاضیات، خود را به شاگردان صبور نشان می‌دهد» (صبور) «هم کلیدواژه مهمیه در باره اش خوب فکر کنید» و ادامه می‌دهد: «پارازش‌ترین بخش مطالعه ریاضی لحظه‌ای است که می‌گویی «آها» ذوق کشف و لذت فهمیدن چیزی جدید. احساس ایستادن بالای یک بلندی و رسیدن به دیدی شفاف و واضح» (آها) فقط یه واژه نیست. «آها» یک حس از عمق وجود و بیانگر لفظه زیبای فومیرنه. آله یک بار «آها» رو تجربه کنی، عاشقش می‌شی. حرف دیگه‌ای ندارم، هر چی لازم بود رو این پدر و دختر گفتند.

پیش به سوی «آها»


راستی این رو بگم که کتاب ماجرای بیست حسابان هم برای ۲۰گرفتنه و هم می‌تونه شروعی باشه برای این که شما طعم خوب ریاضی رو بچشید و حالش رو ببرید. از دوست خوبم آقا مصطفی دیداری که ریاضی رو خوشمزه و باحال می‌نویسه و از خانم میرجعفری که پی‌گیری‌هاشون نقش مهمی در به ثمر رسیدن این کتاب داشت و ویراستارای خوب این کتاب خانم نظری، آقای ابراهیم‌نژاد و خانم عباسی و بر و بچه‌های خستگی‌ناپذیر تولید تشکر می‌کنم. دم همتون گرم

به نام او

آقا چه دوره زمنه‌های شده. تا اینستا رو باز می‌کنی، شونصد تا پیج میاد پر از تبلیغات کنکوری! ای داد که چرا فلان تکنیک رو نمی‌دونی و ای بیداد که چرا فلان کلاس رو نمی‌آیی و ای خاک که چرا فلان پکیج رو نمی‌خری! بگذریم. سازمان محترم سنجش در آمار اعلام کرده میانگین درصد ریاضی بچه‌ها زیر ۵ درصد است. فلان نفر هم، منفی زده‌اند و از این‌جور چیزها. آموزش و پرورش هم اعلام کرده میانگین معدل در کل کشور یک‌رقمی است! همیشه سر کلاس با بچه‌ها راجع به موضوعات مختلف صحبت می‌کنم. از فوتبال گرفته تا موضوعات اجتماعی، دینی و خانوادگی. از هیاهو و کلیشه‌ها بیزارم چه توی صحبت کردن، چه توی درس دادن، چه توی کتاب‌نوشتن! ببینید بچه‌ها اول از همه سعی کنید درستی برای کسب اطلاعاتتان به دست آورید. بررسی‌های روان‌شناسی نشان می‌دهد ذهن ما بعد از کسب اطلاعات، منبع آن را فراموش می‌کند. اصلاً علت تأثیر تبلیغات همین است؛ پس ببینید دارید به حرف چه کسی گوش می‌دهید. موضوع دیگر: ببینم از بین این همه فوتبالیست چند درصد به تیم ملی راه پیدا می‌کنند؟ چند نفر از ورزشکاران قهرمان المپیک می‌شوند؟ از بین این همه خواننده کار چند نفر گل می‌کنند؟ بله همیشه موفقیت، بیشتر از شکست مورد توجه قرار می‌گیرد. ما معمولاً علاقه داریم چیزهایی بشنویم که خوشمان می‌آید، هرچند غیرواقعی باشند. این باعث می‌شود که ما همیشه احتمال پیروزی خود را بیش از حد تخمین بزنیم. اشتباه نکنید! هدف من نامید کردن شما نیست حتی هدف من نادیده گرفتن زحمت بسیاری از دبیران محترم و مشاوران و ... نیست. قطعاً دبیر خوب، کتاب خوب، مشاور خوب لازم است اما صادقانه به شما بگویم همه این‌ها بدون تلاش و زحمت خودتان، تقریباً هیچ تأثیری ندارند. افراد موفق در هر عرصه و حوزه‌ای که باشند، اغلب وقتی راجع به راز و رمز موفقیتشان از آن‌ها سؤال می‌کنید آن را مدیون پشتکاری می‌دانند. اگر می‌خواهید در تحصیل موفق بشوید، هیچ راه میانبری وجود ندارد بلکه تعیین‌کننده‌ترین عامل، تلاش خودتان است. خب پرحرفی کردم. چند نکته هم برای استفاده بهتر از این کتاب بگویم و تمام! این کتاب شامل بخش‌های زیر است:

درس‌نامه: سعی کردم خیلی روان و ساده (البته کامل) درس را آموزش دهم. مطالب اضافه که به دردتان نمی‌خورد در این کتاب نمی‌بینید، اما هر چیزی که برای کسب ۲۰ نهایه لازم دارید بیان شده است؛ پس به نظرم یک بار هم شده درس‌نامه را به دقت مطالعه کنید. چپش درس‌ها کاملاً مثل کتاب درسی است. البته در برخی موارد برای این که درس، طولانی نشود و حوصله‌تان سر نرود درس به چند بخش تقسیم شده و سؤال‌های هر قسمت آورده شده است.

تو امتحان چه خبر: بچه‌ها حجم درس‌ها زیاد است؛ پس تا می‌توانید مطالب را تیپ‌بندی شده و منظم به خاطر بسپارید. من سعی کرده‌ام این کار را برای شما انجام بدهم و تیپ‌های مهم امتحانی به همراه نمونه سؤال‌های آن را در هر قسمت بیان کنم. این کار یک فایده دیگر هم دارد. بعد از خواندن قسمتی از درس‌نامه می‌فهمید که کدام سؤال‌ها را می‌توانید حل کنید.

سؤال‌های امتحانی: همه مثال‌ها و تمرین‌های کتاب و کار در کلاس! و سؤال‌های نهایی سال‌های قبل و (حتی سؤال‌های سال‌های بعد!) را در این قسمت به صورت کاملاً دسته‌بندی شده برای شما آورده‌ام. اگر کتاب را از اول سال تهیه کرده‌اید که کم‌کم همه را حل کنید و جلو بیایید اما اگر نزدیک نهایی هستید بیشتر روی سؤال‌های مشابه کتاب درسی، برگرفته از امتحانات مدارس و نهایی‌ها تمرکز کنید. سؤال‌هایی که کنار آن‌ها علامت  است مقداری بالاتر از کتاب درسی بوده و برخی از آن‌ها نیز تست کنکور بوده‌اند. چون ممکن است در آینده، تست هم در سؤال‌های نهایی بیاید یا معلم شما آزمون تستی هم بگیرد، خوب است به این‌ها هم توجه کنید. (به درد کنکورتون هم می‌خوره!)

آزمون‌های انتهایی هر فصل: بعد از تمام شدن هر فصل، خوب است خودتان را با یک آزمون نسبتاً دشوار محک بزنید. اگر در حل سؤال‌ها اشکالات زیادی داشتید، بدانید که باید دوباره به درس‌نامه و سؤال‌های امتحانی فلش‌بک (رجوع با عین غلیظ) بزنید.

پاسخ‌های تشریحی: بعد از حل سؤال‌ها، حتماً پاسخ‌ها را تحلیل کنید، حتی شما دوست عزیز که سؤال را درست حل کرده‌اید! **آزمون‌های پایانی کتاب:** در انتهای کتاب دو آزمون ترم اول داریم و چهارتا هم نهایی. این‌ها دیگر از نون شب واجب‌تر است. به‌خصوص برای شب‌های بارانی (اشک‌آلود) امتحان! دقت کنید که در پاسخ‌نامه آزمون، راه حل چه‌جوری نوشته شده و بارم به چه چیزهایی اختصاص پیدا کرده است.

در پایان تشکر می‌کنم از همه مسئولین و بر و بچه‌های خیلی‌سبزی. از دکتر نصری، آقای هاشمی و خانم جالینوسی که زحمت زیادی برای این کتاب کشیدند.

بخوانید و حالش را ببرید و به من هم انرژی بدهید تا دوباره برای شما بنویسم.

دوستدار شما

دیداری

مقدمه مؤلف

فهرست

درس ۳: توابع مثلثاتی ۱۴۷

درس ۴: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا ۱۵۱

آزمون جمع‌بندی ۱۵۵

پاسخ سؤال‌های امتحانی ۱۵۶

فصل پنجم: حد و پیوستگی

درس ۱: مفهوم حد و فرایندهای حدی ۱۶۶

درس ۲: حدهای یک‌طرفه ۱۷۱

درس ۳: قضیه‌های حد ۱۷۷

درس ۴: محاسبه حد توابع کسری (حالت $\frac{0}{0}$) ۱۸۱

درس ۵: پیوستگی ۱۸۹

آزمون جمع‌بندی ۱۹۵

پاسخ سؤال‌های امتحانی ۱۹۶

نمودارهای مهم ۲۱۱

امتحانات

امتحان شماره (۱): نمونه امتحان نیم‌سال اول ۲۱۴

پاسخ امتحان شماره (۱): نمونه امتحان نیم‌سال اول ۲۱۵

امتحان شماره (۲): نمونه امتحان نیم‌سال اول ۲۱۷

پاسخ امتحان شماره (۲): نمونه امتحان نیم‌سال اول ۲۱۸

امتحان شماره (۳): نمونه امتحان نیم‌سال دوم ۲۲۰

پاسخ امتحان شماره (۳): نمونه امتحان نیم‌سال دوم ۲۲۲

امتحان شماره (۴): نمونه امتحان نیم‌سال دوم ۲۲۴

پاسخ امتحان شماره (۴): نمونه امتحان نیم‌سال دوم ۲۲۶

امتحان شماره (۵): نهایی خرداد ۱۴۰۲ ۲۲۸

پاسخ امتحان شماره (۵): نهایی خرداد ۱۴۰۲ ۲۳۰

امتحان شماره (۶): نهایی خرداد ۱۴۰۳ ۲۳۱

پاسخ امتحان شماره (۶): نهایی خرداد ۱۴۰۳ ۲۳۳

فصل اول: جبر و معادله

درس ۱: دنباله حسابی ۷

درس ۲: دنباله هندسی ۱۲

درس ۳: معادلات درجه دوم ۱۵

درس ۴: نمودار سهمی، صفرهای تابع و حل نموداری معادله‌ها ۲۱

درس ۵: معادلات گویا و گنگ ۲۸

درس ۶: قدرمطلق و ویژگی‌های آن ۳۲

درس ۷: آشنایی با هندسه تحلیلی ۳۷

آزمون جمع‌بندی ۴۴

پاسخ سؤال‌های امتحانی ۴۵

فصل دوم: تابع

درس ۱: آشنایی بیشتر با تابع ۶۶

درس ۲: انواع توابع - بخش اول ۶۹

درس ۳: انواع توابع - بخش دوم ۷۵

درس ۴: وارون تابع ۷۸

درس ۵: اعمال روی توابع ۸۲

درس ۶: ترکیب توابع ۸۵

آزمون جمع‌بندی ۹۱

پاسخ سؤال‌های امتحانی ۹۲

فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی

درس ۱: تابع نمایی ۱۰۵

درس ۲: تابع لگاریتمی و لگاریتم ۱۱۱

درس ۳: ویژگی‌های لگاریتم و حل معادله‌های لگاریتمی ۱۱۷

آزمون جمع‌بندی ۱۲۴

پاسخ سؤال‌های امتحانی ۱۲۵

فصل چهارم: مثلثات

درس ۱: رادیان ۱۳۶

درس ۲: نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا ۱۴۰



فصل ۱: جبر و معادله

درس ۱: دنباله حسابی

یادآوری دنباله حسابی

دنباله: هر تعداد عددی که پشت سر هم بنویسیم یک دنباله ایجاد می‌کنند؛ مثل $1, 4, 9, 16, \dots$.
جمله عمومی دنباله: به قانون یا الگویی که جمله‌های دنباله توسط آن تولید می‌شوند، **جمله عمومی** می‌گوییم. اگر جمله عمومی را داشته باشیم، با جای‌گذاری شماره جمله به جای n ، جمله‌ها (عموم جمله‌ها) به دست می‌آیند، مثلاً جمله عمومی دنباله‌ای که در بالا گفتیم، $a_n = n^2$ است.

دنباله حسابی: دنباله‌هایی که در آن هر جمله با عدد ثابت یا منفی d (قدرنسبت) جمع شده و عدد بعدی به دست می‌آید، دنباله حسابی هستند. به زبان دیگر اختلاف هر دو جمله متوالی، برابر عدد ثابت d است؛ یعنی:

$$a_n - a_{n-1} = d$$

جمله عمومی دنباله حسابی: برای نوشتن جمله عمومی دنباله حسابی، دو چیز می‌خواهیم: یکی جمله اول (a_1) و دیگری قدرنسبت (d). با جای‌گذاری این دو تا در $a_n = a_1 + (n-1)d$ ، جمله عمومی به دست می‌آید. مثلاً دنباله $4, 7, 10, 13, \dots$ یک دنباله حسابی با قدرنسبت $d = 3$ است و جمله عمومی آن برابر است با:

$$a_n = 4 + (n-1)3 \Rightarrow a_n = 3n + 1$$

مثال: دنباله $3, 1, 5, 9, \dots$ را در نظر بگیرید:

الف) جمله عمومی آن را بنویسید.

ب) جمله سی و سوم دنباله، کدام است؟ جمله چندم برابر ۳۳ است؟

پاسخ: الف) جمله اول که تابلو $a_1 = -3$ است. قدرنسبت هم $d = 4$ (پهارتا پهارتا داره اضافه می‌شه) است. با جای‌گذاری در فرمول جمله عمومی داریم:

$$a_n = a_1 + (n-1)d = -3 + (n-1)(4) = 4n - 7$$

$$a_{33} = 4(33) - 7 = 125$$

$$4n - 7 = 33 \Rightarrow n = 10$$

ب) جمله سی و سوم، پس $n = 33$ می‌گذاریم:

گفته جمله چندم، پس n یا همان شماره جمله، مجهول است:

یعنی دهمین عدد در دنباله برابر ۳۳ است.

چند نکته تکمیلی در مورد دنباله‌های حسابی

۱) اگر a, b, c سه جمله متوالی دنباله حسابی باشند، جمله وسط، میانگین دو جمله کناری است و به آن **واسطه حسابی** می‌گوییم؛ یعنی:

$$b = \frac{a+c}{2}$$

تذکر: اگر $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$ تشکیل دنباله حسابی بدهند، نه تنها هر جمله، میانگین دو جمله کناری است، بلکه اگر به تعداد مساوی از هر جمله، عقب و جلو نیز برویم، میانگین آن دو جمله نیز خواهد بود، مثلاً نه تنها $a_2 = \frac{a_1+a_3}{2}$ بلکه $a_3 = \frac{a_2+a_4}{2}$.

۲) جمله عمومی دنباله حسابی نسبت به n خطی (درجه حداکثر یک) است؛ مثلاً به صورت $a_n = 2n + 3$ یا $a_n = \frac{n}{2} - 1$. پس اگر دنباله‌ای مثل $a_n = (k-2)n^2 + kn + 1$ حسابی باشد باید کاری کنید که n^2 از بین برود؛ پس $k - 2 = 0$ را برابر صفر قرار می‌دهیم تا $k = 2$ شده و در نتیجه $a_n = 2n + 1$ به دست آید.

۳) می‌خواهیم بین دو عدد a و b ، تعداد n عدد (واسطه) طوری قرار دهیم که همه اعداد، تشکیل یک دنباله حسابی بدهند. مثلاً می‌خواهیم بین دو عدد ۴ و ۸۱، تعداد شش واسطه حسابی قرار دهیم. به دو روش می‌توانیم این کار را انجام دهیم:

روش اول: با استفاده از فرمول: $d = \frac{b-a}{n+1} = \frac{81-4}{7} = 11$ (تعداد واسطه‌ها) + ۱ = ۱۲. اولی - آخری = $\frac{b-a}{n+1}$ قدرنسبت به دست می‌آید. حالا داریم:

$$4, \overset{+11}{\boxed{15}}, \overset{+11}{\boxed{26}}, \boxed{37}, \boxed{48}, \boxed{59}, \boxed{70}, 81$$

روش دوم: جمله اول که ۴ است. ۶ تا واسطه هم داریم؛ پس عدد ۸۱، جمله هشتم است. با فرمول جمله عمومی داریم:

$$a_8 = 81 \Rightarrow a_1 + 7d = 81 \Rightarrow 4 + 7d = 81 \Rightarrow d = 11$$

مثال: بین دو عدد $2a - 5$ و $7a + 15$ چهار واسطه حسابی درج کرده‌ایم. اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین واسطه برابر ۶۰ است. کل جمله‌ها را به دست آورید. ($2a - 5$ جمله اول دنباله است).

$$2a - 5, \circ, \circ, \circ, \circ, 7a + 15$$

پاسخ: داریم:

$$d = \frac{b-a}{n+1} \Rightarrow d = \frac{7a+15 - (2a-5)}{4+1} = \frac{5a+20}{5} = a+4$$

از فرمول درج n واسطه داریم:

$$7a + 15 - (a + 4) = 6a + 11$$

اگر $7a + 15$ را منهای قدرنسبت کنیم، بزرگ‌ترین واسطه به دست می‌آید؛ یعنی:

$$2a - 5 + (a + 4) = 3a - 1$$

اگر $2a - 5$ را با قدرنسبت جمع کنیم، کوچک‌ترین واسطه به دست می‌آید؛ یعنی:

$$6a + 11 - (3a - 1) = 60 \Rightarrow 3a + 12 = 60 \Rightarrow 3a = 48 \Rightarrow a = 16$$

حالا:

$$\overset{+20}{27}, 47, 67, 87, 107, 127$$

با جای‌گذاری $a = 16$ جمله‌ها عبارت‌اند از:

خب درس اول از این جا شروع می‌شود. (قبلی‌ها یادآوری از سال دهم بود!) می‌خواهیم مجموع جمله‌های اول تا nام دنباله حسابی را به دست آوریم. قبل از این که به فرمول اصلی برسیم، می‌خواهیم فرمولی برای جمع اعداد متوالی از 1 تا n یعنی $1 + 2 + 3 + \dots + n$ به دست آوریم. (پهن قراره ازش استفاده کنیم) با من همراه بشوید:

جمع اعداد را S می‌نامیم: **مرحله اول** $\Rightarrow S = 1 + 2 + \dots + n$

مرحله دوم: $\Rightarrow S = n + (n-1) + \dots + 1$

مرحله سوم: $\Rightarrow 2S = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \dots + (n+1)}_{n \text{ تا}}$

$\Rightarrow S = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{\text{یکی بیشتر از آخری}}{2} (\text{آخری})$

مثلاً: $1 + 2 + \dots + 50 = \frac{50 \times 51}{2} = 1275$ یا $1 + 2 + \dots + 10 = \frac{10 \times 11}{2} = 55$

مجموع n جمله اول دنباله حسابی a_n را با S_n نمایش می‌دهیم. داریم:

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = a_1 + (a_1 + d) + (a_1 + 2d) + \dots + (a_1 + (n-1)d)$

$= na_1 + (1 + 2 + 3 + \dots + (n-1))d = na_1 + \frac{\text{یکی بیشتر از آخری}}{\text{آخری}} \frac{(n-1)(n)}{2} d = \frac{2na_1 + (n-1)(n)d}{2} = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$

فرمول جمع اعداد متوالی

بنابراین به خاطر بسپارید که: $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$ = مجموع n جمله اول دنباله حسابی

فرمول دوم S_n حسابی: میانگین اولی و آخری \times تعداد = $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(a_1 + a_1 + (n-1)d)$

نتیجه: میانگین جمله‌های دنباله‌های حسابی برابر با میانگین جمله اول و آخر است.

تذکر: رابطه دوم بیشتر وقتی به درد می‌خورد که جمله‌های اول و آخر را داشته باشیم.

(نهایی شهریور ۱۳۰۲)

مثال: مجموع جملات دنباله حسابی ۱، ۳، ۵، ۷، ...، ۱۹۹ را به دست آورید.

پاسخ: اول باید تعداد جملات را به دست آوریم؛ یعنی ببینیم ۱۹۹، چندمین جمله دنباله است:

$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow 199 = 1 + (n-1)(2) \Rightarrow 198 = 2n - 2 \Rightarrow 200 = 2n \Rightarrow n = 100$

حالا کافی است مجموع ۱۰۰ جمله اول دنباله حسابی با قدرنسبت ۲ را پیدا کنیم: $S_{100} = \frac{n}{2}(a_1 + a_{100}) = \frac{100}{2}(1 + 199) = 10000$

مثال: دنباله حسابی ... -۳، ۲، ۷، ... را در نظر بگیرید:

الف) مجموع ۲۰ جمله اول دنباله را به دست آورید. (ب) مجموع $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{20}$ را به دست آورید.

پ) مجموع n جمله اول (S_n) را بیابید. (ت) مجموع $a_2 + a_4 + \dots + a_{20}$ را بیابید.

پاسخ:

الف) $S_{20} = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_{20} = \frac{20}{2}(2(-3) + 19(5)) = 890$ $a_1 = -3$ و $d = 5$ است، پس:

ب) جمع جمله‌های اول تا بیستم، برابر ۸۹۰ شد اما برای محاسبه $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{20}$ باید جمع جمله‌های اول تا دهم (یعنی S_{10}) را از جمع جمله‌های اول تا بیستم کم کنیم:

$a_{11} + a_{12} + \dots + a_{20} = S_{20} - S_{10} = 890 - \frac{10}{2}(2(-3) + 9(5)) = 695$

توجه: به جمع $a_{11} + a_{12} + \dots + a_{20}$ مجموع ده جمله دوم هم می‌گوییم (آگه با پای دیرید و پشت نکنید!). جمع بندی بخش (الف) و (ب) این شد که برای جمع جملات از یک تا n فرمول داریم. اگر آن وسطها، جمعی را خواستید باید S_n را از قبلی‌ها کم کنید.

پ) $S_n = \frac{n}{2}(2(-3) + (n-1)(5)) = \frac{n}{2}(5n - 11) = \frac{5n^2}{2} - \frac{11}{2}n$

بد نیست بدانید دنباله مجموع (S_n) همواره از درجه حداکثر ۲ (نه بیشتر!) درمی‌آید.

ت) جمع تعدادی جمله شماره زوج را می‌خواهیم. به a_2, a_4, \dots و ... دقت کنید:

خودشان یک دنباله حسابی با قدرنسبت $2 \times 5 = 10$ هستند. مجموع ده‌تا از این جمله‌ها را می‌خواهیم.

$a_2 + a_4 + \dots + a_{20} = \frac{10}{2}(2(2) + 9(10)) = 470$

مثال: مجموع دوازده جمله اول دنباله حسابی برابر ۱۳۸ و جمله ششم آن برابر ۱۰ است. مجموع صد جمله اول دنباله را بیابید.

پاسخ: گفتم تا a_1 و d را نداشته باشیم کاری نمی‌توانیم بکنیم. پس اول آن‌ها را به دست می‌آوریم:

$$S_{12} = 138 \Rightarrow \frac{12}{2}(2a_1 + 11d) = 138 \quad \begin{cases} 12a_1 + 66d = 138 \\ -12a_1 - 60d = -120 \end{cases}$$


$$a_6 = 10 \Rightarrow a_1 + 5d = 10 \xrightarrow{\times(-12)}$$

$$6d = 18 \Rightarrow d = 3 \Rightarrow a_1 = -5$$

$$S_{100} = 50(-10 + 99(3)) = 14350$$

حالا S_{100} :

(برگرفته از کتاب درسی)



مثال: ۵ چوب به فاصله ۳ متری در یک خط مستقیم قرار دارد.

هر فرد باید از نقطه شروع حرکت کرده، چوب اول را برداشته و دوباره برگشته و در مکان شروع قرار گیرد. برای چوب‌های بعدی هم همین‌طور. محاسبه کنید برای برداشتن همه چوب‌ها چه مسافتی طی می‌شود؟

پاسخ: برای برداشتن چوب اول ۳ متر جلو و ۳ متر هم برمی‌گردیم؛ پس در کل ۶ متر را طی می‌کنیم. برای برداشتن چوب دوم ۶ متر می‌رویم و ۶ متر برمی‌گردیم؛ پس ۱۲ متر. به همین ترتیب برای چوب بعدی ۱۸ متر. کافی است مجموع اول دنباله حسابی با $a_1 = 6$ و $d = 6$ را به دست آوریم:

$$S_5 = \frac{5}{2}(12 + 4(6)) = 90 \text{ m}$$

مثال: مجموع اعداد سه‌رقمی را به دست آورید که در تقسیم بر ۶، باقی‌مانده‌ای برابر یک دارند.

پاسخ: عدد ۱۰۲ هم بر ۲ و هم بر ۳ بخش‌پذیر است، پس بر ۶ بخش‌پذیر است؛ بنابراین ۱۰۳ اولین عدد سه‌رقمی است که در تقسیم بر ۶ باقی‌مانده‌ای برابر ۱ دارد. در انتها نیز عدد ۹۹۶ بر ۶ بخش‌پذیر است، پس آخرین عدد مطلوب ۹۹۷ است؛ بنابراین کافی است مجموع اعداد مقابل را پیدا می‌کنیم:

$$103, 109, 115, \dots, 997$$

اول باید تعداد اعداد را پیدا کنیم؛ یعنی باید ببینیم ۹۹۷ چندمین جمله است:

$$a_n = a_1 + (n-1)d \Rightarrow a_n = 103 + (n-1)(6) \Rightarrow 997 = 103 + (n-1)(6) \Rightarrow \frac{997-103}{6} = n-1 \Rightarrow n-1 = 149 \Rightarrow n = 150$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{150} = \frac{150}{2}(103 + 997) = 82500$$

به دست آوردن دنباله از روی S_n

روش اول: فرض کنید مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی از رابطه $S_n = 3n^2 - 4n$ به دست آید. می‌خواهیم از روی این دنباله، جمله عمومی دنباله را

بنویسیم. برای این کار، نیاز داریم به a_1 و d . اگر $n = 1$ قرار دهیم مجموع یک جمله اول (S_1) یا همان a_1 به دست می‌آید:

$$S_1 = a_1 + a_1 = 2(1)^2 - 4(1) = -2$$

اگر $n = 2$ قرار دهیم مجموع دو جمله اول به دست می‌آید، یعنی:

$$S_2 = a_1 + a_2 = 2(2)^2 - 4(2) = 0 \quad \text{اگر } a_1 = -1 \text{ قرار دهیم } a_2 = 5 \text{ به دست می‌آید، حالا } d = a_2 - a_1 = 6 \text{ با داشتن قدرنسبت و جمله اول، جمله عمومی نوشته می‌شود:}$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d = -1 + (n-1)(6) = 6n - 7$$

نکته: d همواره دو برابر ضریب n^2 است. در مثال بالا، ضریب n^2 برابر ۳ بود، پس $d = 6$ می‌شود.

روش دوم: اگر جمع اعداد از شماره ۱ تا n را از جمع اعداد از شماره ۱ تا $n-1$ کم کنیم، جمله n ام یا a_n به دست می‌آید؛ یعنی:

$$S_n - S_{n-1} = 3n^2 - 4n - (3(n-1)^2 - 4(n-1)) = 3n^2 - 4n - (3n^2 - 10n + 7) = 6n - 7$$

(به جای n باید $n-1$ بنویسیم)

مثال: مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی از رابطه $S_n = kn^2 + n^3 + 2n^2 + n$ به دست می‌آید. جمله دهم دنباله را به دست آورید.

پاسخ: با توجه به فرمول S_n ، حداکثر درجه n در فرمول S_n برابر ۲ است. پس باید کاری کنیم تا جمله درجه سوم از بین برود، بنابراین $k = -1$.

$$S_{10} = 2(10)^2 + 10 = 210 \quad S_9 = 2(9)^2 + 9 = 171 \Rightarrow a_{10} = (a_1 + \dots + a_{10}) - (a_1 + \dots + a_9) = 210 - 171 = 39$$

نکات	رابطه ریاضی	جمله عمومی
جمله عمومی دنباله حسابی نسبت به n درجه اول است.	$a_n = a_1 + (n-1)d$	جمله عمومی
اختلاف هر دو جمله متوالی دنباله حسابی برابر d است.	$a_n - a_{n-1} = d$	ارتباط دو جمله متوالی
از t_m تا t_n به تعداد $(n-m)$ تا قدرنسبت فاصله است.	$a_n - a_m = (n-m)d$	ارتباط هر دو جمله
وسطی میانگین حسابی دو تا کناری‌ها می‌شود.	$b = \frac{a+c}{2}$	سه جمله متوالی a, b, c
قدرنسبت برابر با $\frac{\text{اولی} - \text{آخری}}{1 + \text{تعداد واسطه‌ها}}$ می‌شود.	$d = \frac{b-a}{n+1}$	درج n واسطه $a \square \square \dots \square b$
سه جمله مجهول دنباله حسابی را بهتر است این‌جوری بگیریم.	$x-d, x, x+d$	شکل سه جمله متوالی
فرمول S_n نسبت به n درجه دوم درمی‌آید.	$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$	مجموع n جمله اول

در امتحان نهایی چه خبر؟

تیپ ۱ مجموع n جمله یک دنباله حسابی از شما خواسته می‌شود یا بالعکس آن، مجموع داده شده و تعداد جمله‌ها خواسته می‌شود. فرقی نمی‌کند، در هر دو حالت از فرمول $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$ یا $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ استفاده کرده و خواسته مسئله را به دست آورید.

حالاتو حل کن: سؤال‌های ۱ تا ۱۵ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴

تیپ ۲ دو رابطه در مورد جمله عمومی دنباله یا مجموع جمله‌های دنباله حسابی داده شده است. از روی فرمول a_n و S_n ، دو رابطه را تشکیل داده و با حل دستگاه، a_1 و d را به دست آورید و بعد هم خواسته مسئله.

حالاتو حل کن: سؤال‌های ۱۶ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۲۸

تیپ ۳ جمله‌های یک دنباله حسابی را دسته‌بندی کرده و مجموع جملات فلان دسته را می‌خواهد. کافی است پیدا کنید که آن دسته با چه عددی شروع شده و چند جمله دارد تا از فرمول S_n ، مجموع جمله‌های آن دسته را پیدا کنید.

حالاتو حل کن: سؤال‌های ۲۹ و ۳۰

سؤال‌های امتحانی ؟

سؤال‌اتی که علامت دارند سخت‌ترین سؤال‌های هر درس هستند. اگر به کم‌تر از ۲۰ رأی نمی‌شود، بعد از تسلط روی سؤال‌های دیگه برو سراغ اون‌ها.

■ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱- قدرنسبت جمله‌های ردیف زوج دنباله $1, 3, 7, \dots$ برابر است با:


- ۴ (۱) ۸ (۲)

۲- اگر $S_n = n^2 + n$ مجموع n جمله اول یک دنباله حسابی باشد، جمله دوم دنباله برابر است با:

- ۴ (۱) ۶ (۲)

۳- ۱۹ ردیف دکمه به صورت مقابل چیده شده‌اند. تعداد دکمه‌ها برابر است با:

- ۱۹۰ (۱) ۱۷۱ (۲)



(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)

■ درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

۴- مجموع n جمله اول دنباله حسابی از رابطه $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + (n-1)d)$ به دست می‌آید.

۵- حاصل عبارت $100 + 99 + 98 + \dots + 2 + 1$ برابر ۲۵۰۰ است.

۶- مجموع ۵ جمله اول از دنباله حسابی $3, 7, 11, \dots$ برابر ۶۰ است.

(نهایی شهریور ۱۴۰۲)

(نهایی خرداد ۱۴۰۲)



■ جاهای خالی را با عبارت‌ها یا کلمه‌های مناسب پر کنید.

- ۷- جمله عمومی یک دنباله به صورت $a_n = 3n - 1$ است. با جمع جمله از ابتدای دنباله، حاصل برابر 610 می‌شود.
 ۸- 10 نقطه متمایز روی محیط دایره‌ای قرار دارد. از هر نقطه به نقطه دیگر وصل می‌کنیم. تعداد وتر به دست می‌آید.
 ۹- مجموع همه عددهای طبیعی دورقمی مضرب 4 برابر است.
 ■ مجموع 20 جمله اول هر یک از دنباله‌های حسابی زیر را بیابید.

(نهایی فرداد ۹۷)


۱۰- $1, -1, 3, -5, \dots$

۱۱- $a_n = 3n - 1$

(مشابه کتاب درسی - برگرفته از امتحانات مدارس کشور)

۱۲- چند جمله از دنباله $1, 4, 7, 10, \dots$ را جمع کنیم تا حاصل برابر 176 شود؟

۱۳- اندازه پله‌های یک نردبان به طور یکنواخت از 45 سانتی‌متر به 30 سانتی‌متر می‌رسد. اگر مجموع طول پله‌ها $4/5$ متر باشد، تعداد پله‌های نردبان را به دست آورید.



(نهایی فرداد ۹۵ - مشابه کتاب درسی)

۱۴- در دنباله حسابی $1, 2, 5, \dots$ حداقل چند جمله آن را باید جمع کنیم تا حاصل از 125 بیشتر شود؟

(نهایی فرداد ۱۴)

۱۵- در دنباله حسابی با جمله اول 4 و قدرنسبت 8 ، حداقل چند جمله را با هم جمع کنیم تا حاصل از 400 بیشتر شود؟

۱۶- در یک دنباله حسابی، مجموع 20 جمله اول، سه برابر مجموع 12 جمله اول است. اگر جمله سوم برابر 6 باشد، جمله اول دنباله را به دست آورید.

۱۷- در یک دنباله حسابی، مجموع پنج جمله اول برابر 10 و مجموع پنج جمله بعدی برابر 35 است. مجموع پنجاه جمله اول دنباله را به دست آورید.

۱۸- در یک دنباله حسابی $S_n = n(4n - 1)$ است.

الف) مجموع ده جمله اول را بیابید.

ب) مجموع $a_6 + a_7 + \dots + a_{15}$ را بیابید.

پ) جمله عمومی دنباله را به دست آورید.

۱۹- از بین 20 جمله اول دنباله حسابی $1, -1, -4, -7, \dots$ مجموع جمله‌های ردیف زوج و مجموع جمله‌های ردیف فرد را به دست آورید.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)

۲۰- در 20 جمله اول یک دنباله حسابی، مجموع جمله‌های ردیف فرد برابر 530 و مجموع جمله‌های ردیف زوج برابر 590 است. جمله اول و قدرنسبت دنباله را بیابید.

■ حاصل جمع‌های زیر را به دست آورید.

۲۱- مجموع اعداد سه‌رقمی بخش‌پذیر بر 6 .

(مشابه کتاب درسی)

۲۲- مجموع اعداد دورقمی که در تقسیم بر 5 باقی‌مانده‌ای برابر 2 دارند.

۲۳- تعدادی توپ و یک سبد مطابق شکل روی یک خط مستقیم قرار دارند. فاصله توپ اول تا سبد $2m$ و فاصله بقیه توپ‌ها از یکدیگر $3m$ است.



دونده‌ای از کنار سبد شروع کرده، هر توپ را برداشته و تا سبد برگشته و توپ را درون سبد

می‌اندازد. او این عمل را برای بقیه توپ‌ها هم انجام می‌دهد. اگر این دونده در مجموع 374

متر دویده باشد، چند توپ را درون سبد انداخته است؟

(مشابه کتاب درسی)

$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$

۲۴- با استفاده از فرمول S_n و بار دیگر با استفاده از یک مربع $n \times n$ نشان دهید:

۲۵- جمله ششم یک دنباله حسابی برابر 10 است. مجموع یازده جمله اول دنباله را به دست آورید.

۲۶- بین دو عدد 3 و 47 ، تعداد 10 واسطه حسابی قرار می‌دهیم. مجموع واسطه‌ها را به دست آورید.

۲۷- زوایای داخلی یک 5 ضلعی محذب بر حسب درجه، تشکیل دنباله حسابی می‌دهند. اگر قدرنسبت 6° باشد، کوچک‌ترین زاویه 5 ضلعی را به دست آورید.

۲۸- یک دنباله حسابی 100 جمله دارد. اگر جمع سه جمله اول با سه جمله آخر برابر 150 باشد، مجموع همه جمله‌ها چقدر است؟

۲۹- اعداد طبیعی را طوری دسته‌بندی می‌کنیم که دسته اول یک عضو، دسته دوم دو عضو و ... یعنی $\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \dots$ مجموع اعداد دسته بیستم را به دست آورید.

۳۰- اعداد طبیعی مضرب 3 را طوری دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد جملات هر دسته برابر شماره آن دسته باشد: یعنی $\{3\}, \{6, 9\}, \{12, 15, 18\}, \dots$ مجموع اعداد واقع در دسته پانزدهم کدام است؟

یادآوری دنباله هندسی

دنباله‌هایی را که در آن‌ها، هر جمله در عدد ثابت q ضرب شده و جمله بعدی به دست می‌آید، دنباله‌های هندسی می‌نامیم.

نکته: در هر دنباله هندسی، تقسیم هر جمله بر جمله قبلی همان قدرنسبت است؛ یعنی $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$ (مثلاً $\frac{a_{10}}{a_9} = q$) و تقسیم دو جمله غیرمتوالی برابر است با: $\frac{a_n}{a_m} = q^{n-m}$ (مثلاً $\frac{a_7}{a_3} = q^4$)

جمله عمومی دنباله هندسی برای نوشتن جمله عمومی دنباله هندسی هم، نیاز به دو چیز داریم: یکی جمله اول (a_1) و دیگری قدرنسبت (q). در این صورت جمله عمومی دنباله هندسی می‌شود:

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad (q, a_1 \neq 0)$$

مثلاً دنباله $2, 4, 8, \dots$ یک دنباله هندسی با قدرنسبت $q = 2$ است که جمله عمومی آن برابر است با:

$$a_n = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$$

مثال: در یک دنباله هندسی با قدرنسبت مثبت، جمله هشتم و جمله چهارم به ترتیب برابر ۸۱ و ۹ هستند. جمله عمومی دنباله را به دست آورید.

پاسخ: برای نوشتن جمله عمومی دنباله، باید a_1 و q را به دست آوریم. برای این کار دو معادله را نوشته و با حل دستگاه، a_1 و q را به دست می‌آوریم. یادتان باشد دستگاه‌هایی که در این‌جا به وجود می‌آیند، معمولاً با تقسیم دو طرف بر هم حل می‌شوند.

$$\begin{aligned} a_8 = 81 &\Rightarrow a_1 q^7 = 81 \\ a_4 = 9 &\Rightarrow a_1 q^3 = 9 \end{aligned} \xrightarrow{\text{تقسیم}} \frac{a_1 q^7}{a_1 q^3} = \frac{81}{9} \Rightarrow q^4 = 9 \xrightarrow{q>0} q = \sqrt[4]{9} = 3^{\frac{2}{4}} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$a_1 (\sqrt{3})^3 = 9 \Rightarrow a_1 = \frac{9}{3\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

با جای‌گذاری در معادله دوم داریم:

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \sqrt{3} \times (\sqrt{3})^{n-1} = \sqrt{3}^n$$

پس جمله عمومی می‌شود:

یادآوری چند نکته از دنباله هندسی

۱) اگر a, b, c سه جمله متوالی دنباله هندسی باشند، آن‌گاه b واسطه هندسی بین a و c است و داریم:

$$b^2 = ac$$

۲) می‌خواهیم بین دو عدد a و b ، تعداد n عدد (واسطه) طوری قرار دهیم که همه اعداد، تشکیل یک دنباله هندسی بدهند. مثلاً می‌خواهیم بین دو

عدد ۲ و ۱۲۸، تعداد ۵ واسطه هندسی قرار دهیم. به دو روش می‌توانیم این کار را انجام دهیم:

روش اول: استفاده از فرمول $q^{n+1} = \frac{c}{a}$ که n تعداد واسطه‌ها و c عدد آخر و a عدد اول است:

$$q^{5+1} = \frac{128}{2} = 64 \Rightarrow q^6 = 64 \Rightarrow q = \pm \sqrt[6]{64} = \pm 2$$

روش دوم: با استفاده از جمله عمومی:

$$a_7 = 128 \Rightarrow a_1 q^6 = 128 \Rightarrow q^6 = \frac{128}{2} = 64$$

داریم: $2, 4, 8, 16, 32, 64, 128$ ؛ پس جمله هفتم است، یعنی:

۳) اگر سه جمله متوالی دنباله هندسی مجهول باشد، بهتر است آن‌ها را به صورت a, aq, aq^2 در نظر بگیریم.

مجموع n جمله اول دنباله هندسی

می‌خواهیم جمع n جمله اول دنباله هندسی با جمله اول a_1 و قدرنسبت q را به دست آوریم. فرض کنید $q \neq 1$ باشد:

$$\text{مرحله اول: } S = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^{n-1}$$

$$\text{مرحله دوم: } qS = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots + a_1 q^n$$

$$\text{مرحله سوم: } S - qS = a_1 - a_1 q^n \quad (\text{از بالایی فقط اولی و از پایینی آخری می‌مونه})$$

$$\Rightarrow (1-q)S = a_1(1-q^n) \Rightarrow S = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$$

به خاطر بسپارید:

تذکره ۱: یک‌وقت به سرتان نزنند بنویسید $\frac{a_1(1-q)^n}{1-q}$ (دری‌م که می‌گم!)؛ توان n فقط برای q است.

تذکره ۲: اگر $q = 1$ باشد، همه جمله‌ها برابر هستند. مثلاً دنباله به صورت a, a, a, \dots بوده است. خب! جمع n جمله می‌شود na

مثال: مجموع ده جمله اول دنباله هندسی مقابل را بیابید.

$$1, -2, 4, -8, \dots$$

پاسخ: $a_1 = 1$ و $q = -2$ ، پس:

$$S_{10} = \frac{a_1(1-q^{10})}{1-q} = \frac{1-(-2)^{10}}{1-(-2)} = \frac{1-1024}{3} = -341$$

یک وقت به سرتان نزنند بنویسید $1 - (-2)^{10}$ (دیدم که می‌گم!) در ترتیب عملیات، توان جلوتر از جمع و تفریق است.

مثال: در یک دنباله هندسی، مجموع سه جمله اول برابر ۱۳۶ و مجموع شش جمله اول آن ۱۵۳ است. قدرنسبت دنباله را به دست آورید.

پاسخ: دو معادله را نوشته و با استفاده از فرمول S_n آن‌ها را باز می‌کنیم:

$$S_3 = 136 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 136$$

$$S_6 = 153 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^6)}{1-q} = 153$$

(کفتم با تقسیم حل می‌شه!)

$$\frac{a_1(1-q^6)}{a_1(1-q^3)} = \frac{153}{136} \Rightarrow \frac{1-q^6}{1-q^3} = \frac{153}{136} \Rightarrow \frac{1-q^6}{1-q^3} = \frac{153}{136}$$

(صورت آشنا می‌زنه با مزدوج)

$$\frac{(1-q^3)(1+q^3)}{1-q^3} = \frac{153}{136} \Rightarrow q^3 = \frac{153}{136} - 1 = \frac{17}{136} = \frac{1}{8} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

مثال: برای محافظت از تابش مواد زیان‌آور رادیواکتیویته، لایه‌های محافظتی ساخته شده است که شدت تابش پس از عبور از آن‌ها نصف می‌شود. چند لایه استفاده کنیم تا شدت تابش مواد زیان‌آور حداقل ۹۹٪ کاهش یابد؟

(برگرفته از کتاب درسی)

پاسخ: بگذارید سؤال را این‌جوری بگویم. چه قدر از مواد زیان‌آور را دور بریزیم تا بیشتر از ۹۹٪ آن دور ریخته شود؟

اول $\frac{1}{2}$ را دور می‌ریزیم. بعد از $\frac{1}{2}$ باقی‌مانده، $\frac{1}{4}$ آن را دور می‌ریزیم، پس $\frac{1}{4}$ از کل حذف می‌شود. به همین ترتیب در مرحله n م $(\frac{1}{2})^n$ حذف می‌گردد. مجموع مواد زیان‌آوری که دور ریختیم باید از ۹۹٪ بیشتر شود، پس:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + (\frac{1}{2})^n > \frac{99}{100} \Rightarrow \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} > \frac{99}{100} \Rightarrow 1 - \frac{99}{100} > (\frac{1}{2})^{n+1} \Rightarrow \frac{1}{100} > (\frac{1}{2})^{n+1}$$

مجموع n جمله اول
دنباله هندسی با $q = \frac{1}{2}$

(با جستجو) $100 < 2^n \rightarrow 7 \leq n$ دو طرف را
معکوس می‌کنیم. عبور بدهیم.

تعمیم (گسترش) اتحاد مزدوج و چاق و لاغر در اتحاد مزدوج و چاق و لاغر داشتیم $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$ و $a^3 - 1 = (a-1)(a^2 + a + 1)$

می‌خواهیم ببینیم اگر سمت چپ $a^n - 1$ باشد، طرف راست به چه شکلی درمی‌آید. ببینید:

$$1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{1-a^n}{1-a} = \frac{a^n-1}{a-1} \Rightarrow a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + 1)$$

مجموع n جمله اول
دنباله هندسی با $q=a$

(صورت و مخرج
منفی فاکتور)

$$a^5 - 1 = (a-1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) \quad \text{یا} \quad a^7 - 1 = (a-1)(a^6 + a^5 + a^4 + \dots + 1)$$

مثلاً:

مثال: کسر $\frac{x^{20}-1}{x^4-1}$ را طوری ساده کنید که برابر با یک چندجمله‌ای شود.

پاسخ: طبق اتحاد $x^{20}-1 = (x-1)(x^{19} + x^{18} + \dots + 1)$ و $x^4-1 = (x-1)(x^3 + x^2 + x + 1)$ ، اما برای این که مخرج به طور کامل ساده

$$x^{20}-1 = (x^4)^5 - 1 = (a^5 - 1) = (a-1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) = (x^4-1)(x^{16} + x^{12} + x^8 + x^4 + 1)$$

شود به صورت زیر عمل می‌کنیم:

پس با ساده شدن x^4-1 از صورت و مخرج، حاصل کسر برابر $1 + x^4 + x^8 + x^{12} + x^{16}$ می‌شود.

مثال: اگر n فرد باشد، ثابت کنید $a^n + 1 = (a+1)(a^{n-1} - a^{n-2} + \dots + 1)$.

پاسخ: فرض کنیم n فرد باشد.

دنباله $1, -a, a^2, -a^3, \dots, a^{n-1}$ یک دنباله هندسی با $a_1 = 1$ و $q = -a$ است؛ پس داریم:

$$1 - a + a^2 + \dots + a^{n-1} = \frac{(a_1)(1-q^n)}{1-q} = \frac{1-(-a)^n}{1-(-a)} = \frac{1+a^n}{1+a}$$

دقت دارید که چون n فرد است، $(-a)^n = -a^n$ می‌شود.

$$\text{فرد } n: a^n + 1 = (a+1)(a^{n-1} - a^{n-2} + \dots + 1)$$

به خاطر بسپارید که:

رابطه ریاضی	توضیح فارسی
$a_n = aq^{n-1}$	جمله n ام دنباله هندسی با قدرنسبت q
$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$	تقسیم هر جمله دنباله هندسی بر جمله قبلی برابر قدرنسبت می‌شود.
$\frac{a_n}{a_m} = q^{n-m}$	تقسیم جمله n ام بر m ام دنباله هندسی
$b^y = ac$	اگر a, b, c تشکیل دنباله هندسی بدهند، مربع وسطی برابر با حاصل ضرب کناری‌ها می‌شود.
$q^{n+1} = \frac{b}{a}$	برای درج n واسطه هندسی بین a و b ، قدرنسبت از این رابطه به دست می‌آید.
$\frac{a}{q}, a, aq$	سه جمله متوالی و مجهول دنباله هندسی را بهتر است این‌جوری بگیریم.
$S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$	مجموع n جمله اول دنباله هندسی با جمله اول a و قدرنسبت q
$a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + 1)$	برای ساده‌سازی کسرها از آن استفاده کنید.

در امتحان نهایی چه خبر؟

- تیپ ۱** مجموع جمله‌های یک دنباله هندسی از شما خواسته می‌شود. a_1 و q را به دست آورید و از $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ یا $S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$ استفاده کنید. این دو فرمول کاملاً یکسان هستند، اما اگر $1 < q < -1$ باشد بهتر است از اولی و اگر $q > 1$ بهتر است دومی را بنویسید.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۳۱ تا ۴۲ و ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹ و ۵۲
- تیپ ۲** مجموع n جمله و $2n$ جمله دنباله هندسی داده شده است. از فرمول S_n هر دو رابطه بنویسید و بعد بر هم تقسیم کنید. برای پیدا کردن q ، حواستان به اتحاد مزدوج باشد.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۴۳، ۴۴، ۴۵
- تیپ ۳** ترکیب دنباله حسابی و هندسی است. مثلاً برخی از جمله‌های دنباله حسابی تشکیل دنباله هندسی بدهند (یا برعکس) شکل جمله‌ها در دنباله اولیه را در نظر می‌گیریم. رابطه بین آن‌ها وقتی تشکیل دنباله دوم را می‌دهند را می‌نویسیم تا مجهولات به دست آید.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۵۰، ۵۱ و ۵۳

سؤال‌های امتحانی

- گزینه مناسب را انتخاب کنید.
- ۳۱- در خانه اول شطرنج، یک گندم و در خانه بعدی دو برابر تعداد قبلی گندم گذاشته‌ایم. تعداد کل گندم‌ها برابر است با:

$$\frac{2^{64}-1}{2} \quad \frac{2^{63}-1}{2}$$
- ۳۲- حاصل $\sqrt{2} + \sqrt{2^2} + \sqrt{2^3} + \dots + \sqrt{2^{11}}$ برابر با کدام است؟

$$64\sqrt{2} \quad 63\sqrt{2}$$
- ۳۳- حاصل $1 - 2 + 4 - 8 + \dots - 128$ برابر با کدام است؟

$$-255 \quad -85$$
- درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.
- ۳۴- حاصل مجموع $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{64}$ برابر $\frac{127}{64}$ است.
- ۳۵- مجموع n جمله اول دنباله هندسی با قدرنسبت q از رابطه $S_n = a \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$ به دست می‌آید.
- ۳۶- اگر مجموع n جمله یک دنباله هندسی از رابطه $S_n = \frac{1}{6}(3^n - 1)$ به دست آید، جمله دوم دنباله برابر $\frac{4}{3}$ است.

■ جای خالی را به درستی تکمیل کنید.

۳۷- مجموع ده جمله اول دنباله $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$ برابر _____ است.

۳۸- مجموع ده جمله اول دنباله $1 + \frac{1}{2}, 3 + \frac{1}{4}, 5 + \frac{1}{8}, 7 + \frac{1}{16}, \dots$ برابر _____ است.

۳۹- ساده شده کسر $\frac{a^5 - 1}{a - 1}$ برابر _____ است.

۴۰- مجموع ده جمله اول دنباله $a_n = \frac{2^{n-1}}{3}$ را به دست آورید.

(نویسندگان فردا ۹۰)

۴۱- مجموع چند جمله از دنباله هندسی $6, -12, 24, \dots$ برابر -126 است؟

(مشابه تمرین کتاب درسی)

۴۲- حداقل چند جمله از دنباله $1, 3, 9, \dots$ را جمع کنیم تا حاصل از 500 بیشتر شود؟

۴۳- مجموع جمله‌های اول و سوم در یک دنباله هندسی برابر 1 و مجموع چهار جمله اول آن برابر 3 است. مجموع شش جمله اول را بیابید.

۴۴- در یک دنباله هندسی مجموع سه جمله اول برابر 136 و مجموع سه جمله بعدی 17 است. قدرنسبت دنباله را بیابید.

۴۵- در یک دنباله هندسی، مجموع شش جمله اول دنباله 9 برابر مجموع سه جمله اول آن است. مجموع ده جمله اول این دنباله چند برابر مجموع پنج جمله اول آن است؟

(نویسندگان شهریور ۱۳۰۲)

۴۶- طول ضلع مربعی یک متر است. ابتدا نیمی از مساحت آن را رنگ می‌کنیم. سپس نیمی از قسمت باقی‌مانده را رنگ می‌کنیم. به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقی‌مانده را رنگ می‌کنیم. پس از چند مرحله حداقل 99% سطح مربع رنگ می‌شود؟

(نویسندگان شهریور ۱۳۰۲)

۴۷- حاصل ضرب بیست جمله اول دنباله $2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ را به دست آورید.

۴۸- توپی را از ارتفاع 50 متری رها می‌کنیم تا در یک مسیر مستقیم با زمین برخورد کند. بعد از هر بار برخورد توپ با زمین، $\frac{1}{3}$ ارتفاع قبلی بالا می‌آید. وقتی توپ برای بار هفتم با زمین برخورد می‌کند، چه مسافتی را پیموده است؟

(مشابه کتاب درسی)

۴۹- حاصل $(1 - x + x^2 - \dots + x^8)(1 + x + x^2 + \dots + x^8)$ را به ازای $x = \sqrt{2}$ به دست آورید.

(برگرفته از کنکور سراسری)

۵۰- جمله‌های سوم، هفتم و نهم از یک دنباله حسابی غیر ثابت، سه جمله متوالی از یک دنباله هندسی هستند. مجموع چند جمله اول دنباله حسابی برابر صفر است؟

۵۱- جمله اول یک دنباله هندسی با جمله‌های مثبت برابر با جمله اول یک دنباله حسابی است. اگر جمله دوم دنباله هندسی برابر با جمله چهارم دنباله حسابی و جمله سوم دنباله هندسی برابر با جمله شانزدهم دنباله حسابی باشد، مجموع شش جمله ابتدایی دنباله هندسی چند برابر جمله اول آن است؟ (دنباله‌های هندسی و حسابی غیر ثابت اند.)

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)

۵۲- اگر مجموع n جمله اول دنباله هندسی a_n برابر با $S_n = 4 - \frac{(-1)^n}{2^{n-2}}$ باشد، حاصل $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_6$ را به دست آورید.

۵۳- جمله‌های دوم و چهارم و دوازدهم از یک دنباله حسابی با قدرنسبت ناصفر و جمله اول 1 به ترتیب جمله‌های سوم، پنجم و هفتم یک دنباله هندسی با قدرنسبت مثبت هستند. مجموع 10 جمله اول دنباله هندسی کدام است؟

درس ۳: معادلات درجه دوم

یادآوری روش‌های حل معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$

در صورت برخورد با معادله درجه دوم به ترتیب (گفتم به ترتیب نه این‌که سریع بری Δ) روش‌های زیر را امتحان کنید.

۱) اگر جمع ضرایب برابر صفر باشد؛ یعنی $a + b + c = 0$ ، یکی از ریشه‌ها $x_1 = 1$ و دیگری $x_2 = \frac{c}{a}$ است.

مثلاً جمع ضرایب معادله $2x^2 - 5x + 3 = 0$ برابر صفر است ($2 - 5 + 3 = 0$)؛ پس $x_1 = 1$ و $x_2 = \frac{3}{2}$.

۲) اگر $a + c = b$ باشد، یکی از ریشه‌ها $x_1 = -1$ و دیگری $x_2 = \frac{c}{a}$ است.

مثلاً جواب‌های معادله $2x^2 + 3x + 1 = 0$ به صورت $x_1 = -1$ و $x_2 = -\frac{1}{2}$ است.

۳) روش تجزیه: الف) اگر $a = 1$ (ضریب x^2) باشد، با اتحاد یک جمله مشترک به راحتی تجزیه می‌کنید.

مثلاً: $x^2 - 5x + 6 = 0 \rightarrow (x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2, x = 3$
 دو عدد پیدا کنید که $-5 =$ جمع و $6 =$ ضرب

ب) روش ac : اما اگر $a \neq 1$ باشد، یک روش خوب و سریع به اسم ac در این‌جا وجود دارد. (البته می‌توانی با Δ هم بری.) روی دو مثال ببینید:

مثلاً $2x^2 + 5x - 6 = 0 \rightarrow (x+6)(x-1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x+6=0 \Rightarrow x=-6 \\ x-1=0 \Rightarrow x=1 \end{cases}$
 را در a ضرب کرده و a را حذف کنید.
 $x = \frac{1}{2}, x = -\frac{6}{2} = -3$

حالا دو جواب به دست آمده را بر a (یعنی 2) تقسیم می‌کنیم:

مثلاً $6x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ x = \frac{2}{2} = 1 \end{cases}$

۴ روش Δ (کلی): اول $\Delta = b^2 - 4ac$ را به دست می‌آوریم:

الف) اگر $\Delta > 0$ باشد، دو ریشه از رابطه $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ به دست می‌آید.

ب) اگر $\Delta = 0$ باشد، دو ریشهٔ بالا تبدیل به یک ریشهٔ مضاعف $-\frac{b}{2a}$ می‌شود.

پ) اگر $\Delta < 0$ باشد، معادله جواب حقیقی ندارد.

۵ روش مربع کامل: دو طرف را بر a تقسیم می‌کنیم. $(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0)$ را به طرف دیگر می‌بریم $(x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a})$ به دو طرف عدد $(\frac{b}{2a})^2$

را اضافه می‌کنیم تا سمت چپ مربع کامل شود.

$$2x^2 + 8x - 1 = 0 \xrightarrow{\div 2} x^2 + 4x - \frac{1}{2} = 0$$

مثلاً:

$$x^2 + 4x = \frac{1}{2} \xrightarrow{+16} x^2 + 4x + 16 = \frac{33}{2}$$

$$(x+4)^2 = \frac{33}{2} \Rightarrow x+4 = \pm \sqrt{\frac{33}{2}} \Rightarrow x = -4 \pm \sqrt{\frac{33}{2}}$$

روش تجزیه) $x^2 - 3x - 4 = 0$ (الف)

روش مربع کامل) $x^2 - 4x + 1 = 0$ (ب)

روش کلی یا Δ) $2x^2 - 6x - 1 = 0$ (پ)

مثال: معادله‌های درجه دوم زیر را با روش خواسته شده حل کنید.

پاسخ:

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-4=0 \Rightarrow x=4 \\ x+1=0 \Rightarrow x=-1 \end{cases}$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x = -1 \xrightarrow{+4} x^2 - 4x + 4 = -1 + 4 \Rightarrow (x-2)^2 = 3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x-2 = \sqrt{3} \Rightarrow x = 2 + \sqrt{3} \\ x-2 = -\sqrt{3} \Rightarrow x = 2 - \sqrt{3} \end{cases}$$

$$2x^2 - 6x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-6 \\ c=-1 \end{cases} \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 36 - 4(2)(-1) = 44 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{6 \pm \sqrt{44}}{4}$$

مثال: یکی از جواب‌های معادله $ax^2 + 15x + 28 = 0$ برابر -4 است. جواب دیگر معادله را به دست آورید.

پاسخ: ریشهٔ معادله در معادله صدق می‌کند ($x = -4$ رو می‌تونیم به جای x بگذاریم).


$$x = -4 \Rightarrow a(-4)^2 + 15(-4) + 28 = 0 \Rightarrow 16a - 32 = 0 \Rightarrow a = 2$$

$$2x^2 + 15x + 28 = 0 \Rightarrow (x+4)(2x+7) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x+4=0 \Rightarrow x=-4 \\ 2x+7=0 \Rightarrow x=-\frac{7}{2} \end{cases}$$

معادلهٔ آخر را می‌توانستیم با روش Δ هم حل کنیم (طولانی می‌شه)، ولی با روش تجزیه راحت‌تر است. چون $x = -4$ یکی از ریشه‌ها است، پس در تجزیهٔ $2x^2 + 15x + 28$ عامل $x + 4$ داریم هم‌چنین در پرانتز دیگر باید جملهٔ $2x$ داشته باشیم تا با ضرب در x حاصل $2x^2$ شود. ضرب دو عدد در پرانتز نیز باید $+28$ باشد؛ پس عدد پرانتز دیگر $+7$ است.

مثال: فرشی با ابعاد ۳ در ۴ درون اتاقی مستطیل‌شکل پهن شده است. اگر فاصلهٔ لبهٔ فرش تا هر دیوار یکسان

و مساحت اتاق برابر ۴۲ متر مربع باشد، فاصلهٔ لبهٔ فرش تا دیوار را به دست آورید. (مشابه تمرین کتاب درسی)



پاسخ: فاصلهٔ لبهٔ فرش تا دیوار را x در نظر می‌گیریم؛ پس:

$$\text{مساحت اتاق} = (3 + 2x)(4 + 2x) = 42 \Rightarrow 12 + 14x + 4x^2 = 42$$

$$\Rightarrow 4x^2 + 14x - 30 = 0 \xrightarrow{\div 2} 2x^2 + 7x - 15 = 0$$

می‌توانیم با روش Δ معادله را حل کنیم، اما با توضیحات ابتدای درس از روش ac داریم:

$$2x^2 + 7x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 7x - 30 = 0 \Rightarrow (x+10)(x-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -10 \\ x = 3 \end{cases} \xrightarrow{\div 2} \begin{cases} x = -5 \\ x = \frac{3}{2} \end{cases}$$



جمع و ضرب ریشه‌های معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$

فرض کنید معادله درجه دوم، دارای دو ریشه α و β باشد (یعنی $\Delta > 0$ باشد). می‌خواهیم بدون محاسبه ریشه‌ها (یووی!) جمع و ضرب ریشه‌ها یعنی

$$\alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

(هالا فور ریشه‌ها چی هستن به ما ربطی نداره!)

$$\alpha\beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - \sqrt{\Delta}^2}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

جمع ریشه‌ها را S (از Sum به معنی جمع) و ضرب آن‌ها را P (از Product به معنی ضرب) می‌نامیم. پس:

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$P = \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

$$S = -\frac{b}{a} = -\frac{-7}{2} = \frac{7}{2}, P = \frac{c}{a} = -\frac{1}{2}$$

مثلاً در معادله $2x^2 - 7x - 1 = 0$ جمع و ضرب ریشه‌ها می‌شوند:

$$|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

قدرمطلق تفاضل ریشه‌ها

نکته: شبیه بالا می‌توانیم نشان دهیم:

مثال: اگر α و β ریشه‌های معادله $2x^2 - 5x + 1 = 0$ باشند، بدون محاسبه ریشه‌ها، حاصل $\alpha^2 + \beta^2$ (الف)، $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ (ب)، $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (پ)، $\alpha^2 + \beta^2$ (ت)، $\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ (ث)، $\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}$ (ج) و $\alpha^2 - \beta^2$ (چ) که $\alpha > \beta$ را به دست آورید.

پاسخ: قبل از همه S و P را به دست می‌آوریم:

حالا هر عبارت را به S و P ربط می‌دهیم: $(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta \Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = S^2 - 2P = (\frac{5}{2})^2 - 2(\frac{1}{2}) = \frac{21}{4}$ (الف)

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = \frac{S}{P} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{1}{2}} = 5$$

(فقط باشین فوره!)

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{S^2 - 2P}{P} = \frac{\frac{21}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{21}{2}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)(\alpha^2 + \beta^2 - \alpha\beta) = (S)(S^2 - 2P - P) = S^3 - 3SP = (\frac{5}{2})^3 - 3(\frac{5}{2})(\frac{1}{2}) = \frac{95}{8}$$

$$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = PS = \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{4}$$

$$(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2 = \alpha + \beta + 2\sqrt{\alpha\beta} = S + 2\sqrt{P} = \frac{5}{2} + 2\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{5}{2} + \sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} = \sqrt{\frac{5}{2} + \sqrt{2}}$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha - \beta)(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} \times S = \frac{\sqrt{17}}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5\sqrt{17}}{4} \quad (\text{چون } \alpha > \beta \text{ پس } |\alpha - \beta| = \alpha - \beta)$$

مثال: در معادله $4x^2 - 16x + m = 0$ یکی از ریشه‌ها دو واحد بیشتر از ریشه دیگر است. مقدار m و هر دو ریشه را بیابید.

پاسخ: در این مسئله‌ها S و P و رابطه مسئله را بنویسید. مجهول‌ها خودشان به دست می‌آیند!

$$S = \alpha + \beta = -\frac{-16}{4} = 4$$

$$P = \alpha\beta = \frac{m}{4}$$

$$\alpha = \beta + 2 \xrightarrow{\text{جای‌گذاری در معادله}} \beta + 2 + \beta = 4 \Rightarrow \beta = 1 \Rightarrow \alpha = 3 \xrightarrow{\text{یو وی}} 3 = \frac{m}{4} \Rightarrow m = 12$$

مثال: α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 5 = 0$ هستند. حاصل عبارت‌های $\alpha^2 + 2\beta + 5$ (الف) و $\alpha^2 + 2\beta^2 + 5\beta$ (ب) را بیابید.

پاسخ: عبارت‌هایی که در مثال‌های قبلی دیدید، همگی نسبت به α و β متقارن هستند. اما در این مثال این گونه نیست. α و β ریشه‌های معادله هستند؛ پس در معادله صق می‌کنند. با قراردادن α و β در معادله، رابطه‌هایی که برای معادله هر عبارت، مفید باشند را می‌سازیم.

$$\alpha^2 - 2\alpha - 5 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = 2\alpha + 5$$

جای‌گذاری در معادله

$$2\alpha + 5 + 2\beta + 5 = 2(\alpha + \beta) + 10 = 2(-\frac{b}{a}) + 10 = 14$$

پس: $2\alpha + 5$ قرار می‌دهیم

$$\alpha^2 + 2\beta^2 + 5\beta = 2\alpha + 5 + 2\beta^2 + 5\beta = 2\alpha^2 + 5\alpha + 2\beta^2 + 5\beta$$

$$= 2(\alpha^2 + \beta^2) + 5(\alpha + \beta) = 2(S^2 - 2P) + 5(S) = 2(4 + 10) + 5(2) = 28$$

مثال: به ازای کدام مقدار m ، دو ریشه معادله $(m+1)x^2 + m(m^2-9)x - 2 = 0$ قرینه یکدیگرند؟ معکوس یکدیگر چه طور؟

پاسخ: اولاً باید $\Delta > 0$ باشد تا معادله، دو ریشه داشته باشد. اگر ریشه‌ها قرینه باشند، $S = 0$ می‌شود.

$$S = 0 \Rightarrow -\frac{b}{a} = 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow m(m^2 - 9) = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 0 \Rightarrow x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \quad \checkmark \\ m = 3 \Rightarrow 4x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \checkmark \\ m = -3 \Rightarrow -2x^2 - 2 = 0 \Rightarrow \text{جواب ندارد.} \end{cases}$$

پس به ازای $m = 0, 3$ ، معادله دو ریشه قرینه دارد. اگر دو ریشه، معکوس هم باشند، ضرب آن‌ها برابر یک است؛ یعنی $P = 1$:

$$P = 1 \Rightarrow \frac{c}{a} = 1 \Rightarrow c = a \Rightarrow m + 1 = -2 \Rightarrow m = -3 \xrightarrow{\text{بررسی این‌که معادله حتماً ریشه داشته باشد.}} -2x^2 - 2 = 0$$

پس به ازای این m ، معادله اصلاً جواب ندارد. یعنی m وجود ندارد که به ازای آن، دو ریشه معکوس یکدیگر باشند.

مثال: اگر α و β ریشه‌های معادله $3x^2 - 12x - a = 0$ و $2\alpha^2 + \beta^2 - 4\alpha = 7$ باشند، مقدار a را به دست آورید. (برگرفته از کنکور سراسری)

پاسخ: دقت کنید که ریشه معادله در معادله صدق می‌کند. اگر به جای x عدد α را قرار دهیم، داریم:

$$3\alpha^2 - 12\alpha - a = 0 \Rightarrow 3(\alpha^2 - 4\alpha) = a \Rightarrow \alpha^2 - 4\alpha = \frac{a}{3}$$

در عبارت داده شده داریم:

$$2\alpha^2 + \beta^2 - 4\alpha = 7 \Rightarrow \underbrace{\alpha^2 + \beta^2}_{S^2 - 2P} + \underbrace{\alpha^2 - 4\alpha}_{\frac{a}{3}} = 7 \xrightarrow[\substack{S = -\frac{-12}{3} = 4 \\ P = -\frac{a}{3}}]{\substack{S^2 - 2P = 16 - \frac{2a}{3}}} 4^2 - 2\left(-\frac{a}{3}\right) + \frac{a}{3} = 7 \Rightarrow 16 + a = 7 \Rightarrow a = -9$$

تشکیل معادله درجه دوم

این‌جا قضیه برعکس است. ریشه‌ها را داریم و می‌خواهیم معادله درجه دومی بنویسیم که ریشه‌هایش α و β باشند؛ قُب! خیلی ساده، معادله $(x - \alpha)(x - \beta) = 0$ را می‌نویسیم. اگر این رابطه را ساده کنیم، داریم:

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0 \Rightarrow x^2 - Sx + P = 0$$

یعنی کافی است اول جمع و ضرب دو ریشه را به دست بیاوریم و بعد در فرمول بالا به جای S و P جای‌گذاری کنیم.

مثلاً می‌خواهیم معادله‌ای بنویسیم که ریشه‌هایش $1 + \sqrt{2}$ و $1 - \sqrt{2}$ باشد. اول S و P را به دست می‌آوریم:

$$S = 1 + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 2, \quad P = (1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2}) = -1 \Rightarrow x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + (-1) = 0 \quad (\text{معادله‌ای که ریشه‌هایش } 1 \pm \sqrt{2} \text{ هستش})$$

مثال: α و β ریشه‌های معادله $x^2 - x - 1 = 0$ هستند. معادله‌ای بنویسید که ریشه‌هایش $\frac{\alpha}{\beta}$ و $\frac{\beta}{\alpha}$ باشد.

پاسخ: برای نوشتن معادله‌ای که ریشه‌هایش $x_1 = \frac{\alpha}{\beta}$ و $x_2 = \frac{\beta}{\alpha}$ باشد، باید $x_1 + x_2$ و $x_1 x_2$ را به دست آوریم. در محاسبه این‌ها به S و P معادله داده شده برمی‌خوریم. چون که α و β ریشه‌های معادله داده شده هستند؛ پس $S = \alpha + \beta = -\frac{-1}{1} = 1$ و $P = \alpha\beta = -1$. حالا:

$$S' = x_1 + x_2 = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{S^2 - 2P}{P} = \frac{1 - 2(-1)}{-1} = -3$$

$$P' = x_1 x_2 = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = 1 \Rightarrow x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 + 3x + 1 = 0$$

به دست آوردن علامت ریشه‌ها با استفاده از S و P

فرض کنید معادله درجه دوم دارای دو ریشه ($\Delta > 0$) باشد. اگر جمع و ضرب این دو ریشه مثبت باشد، ($S > 0$ و $P > 0$) می‌فهمیم هر دو ریشه مثبت بوده‌اند. مثلاً در معادله درجه دوم $x^2 - 7x + 1 = 0$ ، هر سه شرط $\Delta > 0$ و $S > 0$ و $P > 0$ برقرار است؛ پس هر دو ریشه مثبت هستند. شبیه همین داریم:

شرایط هر دو ریشه مثبت	شرایط هر دو ریشه منفی	شرایط یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی
$\Delta > 0$	$\Delta > 0$	$\Delta > 0$
$S > 0$	$S < 0$	$P < 0$
$P > 0$	$P > 0$	(یا ساده‌تر فقط $P < 0$)

نکته: ۱) اگر $P < 0$ ، یعنی $\frac{c}{a} < 0$ ؛ پس a و c مختلف‌العلامت بوده و خودبه‌خود $\Delta > 0$ می‌شود. پس برای این‌که معادله دو ریشه

مختلف‌العلامت داشته باشد، شرط $P < 0$ کافی است.

۲) اگر $P < 0$ و $S > 0$ ، ریشه مثبت از نظر قدرمطلق بزرگ‌تر بوده است (مثلاً دو ریشه $+4$ و -1 بوده‌اند).

۳) اگر $P < 0$ و $S < 0$ ، ریشه منفی از نظر قدرمطلق بزرگ‌تر بوده است (مثلاً دو ریشه -4 و $+1$ بوده‌اند).

مثال: حدود m را طوری تعیین کنید تا معادله $x^2 - (m+1)x + m = 0$ دو ریشه متمایز مثبت داشته باشد.

پاسخ: (۱) به ازای $m \neq 1$ همواره برقرار است. $\Delta > 0 \Rightarrow (m+1)^2 - 4m > 0 \Rightarrow \frac{m^2 - 2m + 1}{(m-1)^2} > 0$

شرط مثبت بودن هر دو ریشه را نوشته و اشتراک می‌گیریم.

(۲) $P > 0 \Rightarrow m > 0$

(۳) $S > 0 \Rightarrow -\frac{-(m+1)}{1} > 0 \Rightarrow m+1 > 0 \Rightarrow m > -1$

اشتراک (۱)، (۲) و (۳) می‌شود $m > 0$ و $m \neq 1$.

تغییر متغیر برای حل معادله‌ها

معادله $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$ را در نظر بگیرید. این معادله از درجه چهار است. سعی می‌کنیم کاری کنیم تا این معادله تبدیل به درجه دو شود تا بتوانیم آن را حل کنیم. یک روش خوب در برخی از مواقع، تغییر متغیر است. مثلاً اگر $x^2 = t$ بگیریم $x^4 = t^2$ می‌شود و معادله داده شده به صورت $t^2 - 3t + 2 = 0$ در می‌آید. جواب‌های این معادله $t = 1$ و $t = 2$ است. صبر کنید کار تمام نشده است چون باید x را به دست آوریم. خوب t چه بود؟ بله دوباره به جای t همان x^2 را گذاشته و x را به دست می‌آوریم:

$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$ $x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$

پس معادله اولیه دارای چهار جواب ± 1 و $\pm\sqrt{2}$ است.

(نهایی فررار ۹۵)

مثال: معادله $0 = 2 - (\frac{x^2}{y} - 1) + (\frac{x^2}{y} - 1)^2$ را حل کنید.

پاسخ: $\frac{x^2}{y} - 1 = t$ می‌گیریم، پس:

$$t^2 + t - 2 = 0 \Rightarrow (t-1)(t+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t-1=0 \Rightarrow t=1 \Rightarrow \frac{x^2}{y} - 1 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{y} = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2y} \\ t+2=0 \Rightarrow t=-2 \Rightarrow \frac{x^2}{y} - 1 = -2 \Rightarrow \frac{x^2}{y} = -1 \Rightarrow \text{جواب ندارد.} \end{cases}$$

در امتحان نهایی چه خبر؟

- تیپ ۱** از روی یک معادله درجه دوم باید عبارتی برحسب ریشه‌ها را به دست آورید. برای این کار، اول S و P را به دست می‌آورید و بعد با استفاده از اتحادها و تجزیه و مخرج مشترک و یا احیاناً خاصیت ریشه بودن α و β ، عبارت خواسته شده را به S و P ربط می‌دهید.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۵۴ تا ۷۰
- تیپ ۲** یک معادله درجه دوم که مجهولی مثل m در آن وجود دارد، می‌دهند و m را می‌خواهند. S و P را بنویسید و از معادله‌های به دست آمده، m را پیدا کنید.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۷۱ تا ۷۴
- تیپ ۳** از روی ریشه‌ها باید معادله درجه دوم بنویسید. باید S و P ریشه‌ها را به دست آورده و در معادله $x^2 - Sx + P = 0$ قرار دهید. در مسیر پیدا کردن S و P معادله جدید ممکن است به S و P یک معادله دیگر برخورد کنید.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۷۵ تا ۸۰
- تیپ ۴** علامت ریشه‌ها داده شده و شما باید شرایطی را اعمال کنید که علامت ریشه‌ها به آن صورت باشد.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۸۱ تا ۸۴
- تیپ ۵** معادله شلوغ و عجیب و غریب معمولاً با تغییر متغیر حل می‌شود. عبارت مناسبی را t بگیرید تا معادله تبدیل به معادله آشنا مثل درجه دوم بشود. t را به دست آورده و عبارت برحسب x را مساوی جواب‌های به دست آمده برای t قرار دهید و در پایان جواب‌ها (x) را محاسبه کنید.
- حالاتو حل کن:** سؤال‌های ۸۵ تا ۹۰

؟ سؤال‌های امتحانی

گزینه درست را انتخاب کنید.

۵۴- جمع و ضرب ریشه‌های معادله $x^2 + \frac{x}{y} - 3 = 0$ به ترتیب برابر است با:

(۱) $-\frac{1}{y}$ و -3 (۲) $\frac{1}{y}$ و -3

۵۵- جمع و ضرب ریشه‌های معادله $0 = 2 - 3x - x^2$ به ترتیب برابر است با:

(۱) $\frac{3}{y}$ و $\frac{1}{y}$ (۲) -3 و -2

۵۶- اگر α و β ریشه‌های معادله $0 = x^2 - x - 3$ باشند، تفاضل ریشه‌ها برابر است با:

(۱) $\frac{\sqrt{13}}{2}$ (۲) $\sqrt{13}$

■ درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

۵۷- معادله $x^2 - 4x + 1 = 0$ دو ریشه مثبت دارد.

۵۸- α و β ریشه‌های معادله $x^2 + x - 1 = 0$ هستند. حاصل $\alpha^2 + \beta^2$ برابر ۲ است.

۵۹- در معادله درجه دوم $ax^2 + bx + c = 0$ ، اگر $\frac{c}{a} < 0$ ، معادله حتماً دو ریشه دارد.

■ جاهای خالی را با عبارت‌ها یا کلمه‌های مناسب پر کنید.

۶۰- $x = -1$ ریشه معادله $4x^2 + ax - 7 = 0$ است. ریشه دیگر است.

۶۱- حاصل ضرب ریشه‌های معادله $4x^2 + 3x - 8 = 0$ مساوی است.

۶۲- معادله درجه دوم دارای ریشه‌های $3 \pm 2\sqrt{5}$ است.

■ α و β ریشه‌های هر معادله هستند. حاصل عبارت خواسته شده در هر قسمت را به دست آورید.

۶۳- $x^2 - 4x + 1 = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \frac{1}{\alpha} + \beta^2 + \frac{1}{\beta} = ?$

۶۴- $x^2 - 4x - 2 = 0 \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta+1} + \frac{\beta}{\alpha+1} = ?$

۶۵- $x^2 + 2x - 5 = 0 \Rightarrow \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = ?$

۶۶- $x^2 - 7x + 4 = 0 \Rightarrow \alpha\sqrt{\beta} + \beta\sqrt{\alpha} = ?$

(نوبت شهریور ۱۳۰۲)

(نوبت فرورد ۱۳۰۲)

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)

۶۷- اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 5 = 0$ باشد، حاصل $\alpha^2 - \alpha + \beta + \alpha^2 + \beta^2$ را بیابید.

۶۸- α و β ریشه‌های معادله $x^2 + 3x - 1 = 0$ است. حاصل $\frac{\alpha - \frac{1}{\alpha}}{\beta^2 + \alpha + 3\beta^2}$ را به دست آورید.

۶۹- α و β ریشه‌های معادله $x^2 + 6x + a = 0$ هستند. اگر $\alpha < \beta < 0$ و $3\alpha^2 + 2\beta^2 = 12\sqrt{2} + 85$ باشد، مقدار a چه قدر است؟ (برگرفته از کنکور سراسری)

۷۰- اگر α و β ریشه‌های متمایز معادله $ax^2 - ax - b = 0$ و $4\alpha\beta^2 + 2\alpha^2 - 2\alpha\beta = 17$ باشد، اختلاف ریشه‌های این معادله را به دست آورید.

(برگرفته از کنکور سراسری)

(نوبت فرورد ۹۲)

۷۱- در معادله $2x^2 - 8x + m = 0$ اگر یکی از جواب‌ها دو واحد از جواب دیگر بزرگ‌تر باشد، m و هر دو جواب را بیابید.

(نوبت فرورد ۸۳)

۷۲- m را طوری بیابید که یکی از ریشه‌های معادله $mx^2 - 4x + 1 = 0$ سه برابر ریشه دیگر باشد. ($m \neq 0$)

۷۳- یکی از ریشه‌های معادله $x^2 - kx + 8 = 0$ مربع ریشه دیگر است. k و هر دو ریشه را بیابید.

۷۴- a را چنان بیابید که رابطه $\frac{1}{\alpha+1} + \frac{1}{\beta+1} = \frac{5}{6}$ بین ریشه‌های معادله $x^2 - (a+2)x + (a+1) = 0$ برقرار باشد.

۷۵- اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $4x^2 - 5x - 5 = 0$ باشد، معادله‌ای بنویسید که ریشه‌های آن 2α و 2β باشد.

۷۶- اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - 2x - 1 = 0$ باشد، معادله‌ای بنویسید که ریشه‌های آن $\frac{1}{\alpha+1}$ و $\frac{1}{\beta+1}$ باشد. (نوبت فرورد ۹۵)

۷۷- معادله‌ای بنویسید که ریشه‌هایش از معکوس ریشه‌های معادله $3x^2 - x - 1 = 0$ یک واحد کم‌تر باشند.

۷۸- محیط یک زمین مستطیلی شکل ۱۸ متر و مساحت آن ۱۴ مترمربع است. اندازه طول و عرض این زمین را با استفاده از معادله درجه دوم به دست آورید.

۷۹- طول سرامیکی از ۳ برابر عرض آن، یک سانتی‌متر کوتاه‌تر است. برای سرامیک‌کردن خانه‌ای به مساحت ۶۳ مترمربع تعداد ۱۵۰۰ سرامیک مصرف شده است. طول هر سرامیک چه قدر است؟ (مشابه تمرین کتاب درسی)

۸۰- هر یک از ریشه‌های معادله $3x^2 + ax + b = 0$ دو برابر معکوس هر ریشه معادله $4x^2 - 7x + 3 = 0$ است. مقدار a و b را بیابید.

(برگرفته از امتحانات مدارس کشور)

۸۱- حدود m را چنان بیابید که معادله $(m-6)x^2 - 2mx - 3 = 0$ دارای دو ریشه منفی باشد.

۸۲- اگر منحنی به معادله $y = 2x^2 - 4x + m - 3$ محور x ها را در دو نقطه به طول‌های مثبت قطع کند، آن‌گاه مجموعه مقادیر m را به دست آورید.

(برگرفته از کنکور سراسری)

۸۳- معادله $(a^2 - 3a + 2)x^2 - (a^2 - 5a + 4)x + a - a^2 = 0$ دو ریشه دارد. حدود a را به دست آورید.

۸۴- معادله درجه دوم $ax^2 - (a+1)x - b = 0$ به ازای همه مقادیر $a \neq 0$ دو جواب دارد. محدوده b را به دست آورید.

■ معادله‌های زیر را حل کنید.

۸۵- $(x^2 - 1)^4 + (x^2 - 1)^2 - 2 = 0$

۸۶- $(\frac{x^2}{3} - 2)^2 - 11(\frac{x^2}{3} - 2) + 10 = 0$

۸۷- $(4 - x^2)^2 - 2(4 - x^2) - 15 = 0$

(نوبت فرورد ۹۵)

ردیف	آزمون جمع‌بندی فصل اول	رشته ریاضی و فیزیک	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	Kheilisabz.com	نمره
۱	جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب کامل کنید. الف) معادله درجه‌دومی که ریشه‌های آن $2 + \sqrt{3}$ و $2 - \sqrt{3}$ باشد، به صورت _____ است. ب) اگر $0 < x < 1$ باشد، حاصل $A = x + \sqrt{x^2 - 2x + 1}$ برابر _____ است. پ) قرینه نقطه $A(1, 2)$ نسبت به نقطه $M(-1, 4)$ برابر است با (____ و ____). A' . ت) تعداد ریشه‌های معادله $3\sqrt{x-1} - \sqrt{3-2x} + \sqrt{1-x} - 3\sqrt{4-2x} = 0$ برابر _____ است.	۱			
۲	در یک دنباله حسابی، مجموع جمله‌های اول و پنجم ۱۶ و مجموع جمله‌های سوم و هفتم ۳۶ می‌باشد. مجموع صد جمله ابتدایی این دنباله را بیابید.	۲			
۳	اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 7x + 1 = 0$ باشند، بدون حل معادله، حاصل $\frac{3\alpha^2 - 21\alpha}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}}$ را بیابید.	۱/۵			
۴	اگر α و β جواب‌های معادله $3x^2 - 5x - 3 = 0$ باشند، معادله درجه‌دومی بیابید که جواب‌های آن $\frac{1}{\alpha-1}$ و $\frac{1}{\beta-1}$ باشد.	۲			
۵	شکل مقابل، نمودار تابع درجه‌دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ می‌باشد. مقدار ضرایب a ، b و c را تعیین کنید.	۱/۵			
۶	معادله مقابل را حل کنید.	۱/۵		$\frac{1}{x^2 - 2x + 1} + \frac{2}{x-1} = 3$	
۷	ماشین A کاری را به تنهایی ۱۵ ساعت زودتر از ماشین B انجام می‌دهد که هر دو ماشین این کار را در ۱۸ ساعت انجام می‌دهند. ماشین A به تنهایی کار را در چند ساعت انجام می‌دهند؟	۱/۵			
۸	معادلات زیر را حل کنید.	۲		الف) $(x + \frac{1}{x})^2 + 2(x + \frac{1}{x}) = 8$ ب) $2 + \sqrt{2x^2 - 5x + 2} = x$	
۹	به روش هندسی تعداد جواب‌های معادله $ x^2 - 4 = x + 1 $ را به دست آورید.	۱			
۱۰	تابع $f(x) = x - 2 + x + 1 $ را به شکل تابع چندضابطه‌ای بدون نماد قدرمطلق نوشته و آن را رسم کنید. به کمک آن معادله $ x - 2 + x + 1 = 5$ را به روش جبری و هندسی حل کنید.	۲/۵			
۱۱	نقاط $A(0, 3)$ ، $B(3, -1)$ و $C(5, 1)$ سه رأس مثلثی هستند. فاصله رأس B تا میانه وارد بر ضلع BC چه قدر است؟	۲			
۱۲	مساحت مربعی که دو ضلع آن روی خط‌های $2x + y = 2$ و $4x + 2y = -6$ قرار دارد را بیابید.	۱/۵			
۲۰	مجموع نمرات				

۱۵. شبیه مسئله قبلی باید $S_n > 400$ باشد:

$$\frac{n}{2}(\lambda + (n-1)\lambda) > 400 \Rightarrow fn^2 > 400$$

$$\Rightarrow n^2 > 100 \Rightarrow n > 10 \Rightarrow n \geq 11$$

توجه دارید چون n عددی طبیعی است؛ پس $n < -10$ دیگر قابل قبول نیست (و الا تو حالت کلی از $x^2 > 100$ با رادیکال گیری نتیجه می گیریم $|x| > 10$. از این هم می شه $x > 10$ یا $x < -10$).

۱۶. اول جمله های فارسی را به زبان ریاضی بنویسیم. بعد هم با فرمول S_n و a_n باز می کنیم:

$$\begin{cases} S_7 = 2S_{17} \Rightarrow \frac{7}{2}(2a_1 + 17d) = 2 \times \frac{17}{2}(2a_1 + 17d) \\ \xrightarrow{\text{وساده سازی} +4} \begin{cases} 7a_1 + 7d = 0 \\ a_1 + 7d = 6 \end{cases} \\ \times (-8) \\ \hline d = 4 \Rightarrow a_1 = -2 \\ a_7 = 6 \Rightarrow a_1 + 7d = 6 \end{cases}$$

۱۷. مجموع ۵ جمله اول همان S_5 است، پس $S_5 = 10$. مجموع ۵ جمله بعدی یعنی $a_6 + a_7 + \dots + a_{10}$. برای این جمع کافی است جمع جمله های اول تا دهم را از جمع جمله های اول تا پنجم کم کنیم. پس $S_{10} - S_5 = 35$.

$$\begin{cases} S_5 = 10 \Rightarrow \frac{5}{2}(2a_1 + 4d) = 10 \\ S_{10} - 10 = 35 \Rightarrow S_{10} = 45 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5a_1 + 10d = 10 & \xrightarrow{+5} \begin{cases} a_1 + 2d = 2 \\ 5(2a_1 + 9d) = 45 \end{cases} \\ 5(2a_1 + 9d) = 45 & \Rightarrow \begin{cases} a_1 + 2d = 2 \\ 2a_1 + 9d = 9 \end{cases} \\ \hline d = 1 \Rightarrow a_1 = 0 \end{cases}$$

پس: $S_{10} = 25(0 + 4 \times 1) = 100$

۱۸. S_n همان جمع جمله های اول تا n را به ما می دهد. پس:

الف $n = 10 \Rightarrow S_{10} = 10 \times 39 = 390$

ب $a_6 + a_7 + \dots + a_{10} = S_{10} - S_5 = 15(59) - 5(19) = 790$

پ طبق توضیحات درس نامه داریم:

$$S_1 = 3 \Rightarrow a_1 = 3, S_7 = 14 \Rightarrow a_1 + a_7 = 14$$

$$\Rightarrow a_7 = 11 \Rightarrow d = a_7 - a_1 = 8$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + (n-1)(8) = 8n - 5$$

۱۹. جمله های ردیف زوج همان a_2, a_4, \dots, a_{10} هستند (تعدادشون ۵ تا). این ها خود یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۶ هستند، پس مجموع آنها می شود: $\frac{1}{2}(-8 + 9(6)) = 230$

جمله های ردیف فرد هم همان a_1, a_3, \dots, a_{11} هستند (تعدادشون باز ۶ تا). این ها هم دنباله حسابی با قدرنسبت ۶ هستند پس جمع آنها می شود: $\frac{1}{2}(-14 + 9(6)) = 200$

۲۰. دو معادله را به صورت ریاضی می نویسیم. می توانیم آنها را باز و از حل دستگاه دو معادله دو مجهول a_1 و d را بیابیم. اما صبر کنید اگر این دو معادله را از هم کم کنیم به نتیجه خوبی می رسیم:

$$\begin{cases} a_2 + a_4 + \dots + a_{10} = 230 \\ - \{ a_1 + a_3 + \dots + a_{11} = 200 \} \\ \hline (a_2 - a_1) + (a_4 - a_3) + \dots + (a_{10} - a_9) = 30 \\ \xrightarrow{\text{اختلاف هر دو جمله متوالی قدرنسبت می شه}} \underbrace{d + d + \dots + d}_{10d} = 30 \Rightarrow d = 3 \end{cases}$$

پاسخ سؤال های امتحانی

۱. جمله های ردیف زوج به صورت $1, 3, 5, 7, 9, \dots$ هستند؛ پس خودشان یک دنباله حسابی با قدرنسبت ۲ خواهند بود.

۲. $S_1 = 2 = a_1$ و $S_2 = 6 = a_1 + a_2$ است، پس $a_2 = 4$ خواهد بود.

۳. $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ است پس داریم:

$$1 + 2 + 3 + \dots + 19 = \frac{19 \times 20}{2} = 190$$

۴. نادرست است، چون: $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$

۵. نادرست است. تعداد جملات برابر ۵۰ و قدرنسبت برابر ۲ است؛ پس داریم:

$$S_{50} = \frac{50}{2}(2 + 100) = 2550$$

۶. درست است. قدرنسبت برابر ۵ است؛ پس $x = 2$ است. داریم:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow S_5 = \frac{5}{2}(4 + 4(5)) = 60$$

$$a_n = 3n - 1 \Rightarrow 2, 5, 8, \dots$$

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2(2) + (n-1)(3))$$

$$= \frac{n}{2}(3n + 1) \Rightarrow \frac{n}{2}(3n + 1) = 610 \Rightarrow n = 20$$

۸. از نقطه اول به هر کدام از ۹ نقطه دیگر، از نقطه دوم به ۸ نقطه باقی مانده و ...

پس در کل داریم: (در مجموع ۴۵ وتر) $9 + 8 + 7 + \dots + 1 = \frac{9 \times 10}{2} = 45$

۹. کافی است مجموع جمله های $4 \times 24, 4 \times 23, 4 \times 22, \dots, 4 \times 3, 4 \times 2$ (که تعداد آنها $22 - 2 = 20$ تا است) را به دست آوریم:

$$S_{22} = \frac{22}{2}(12 + 96) = 1188$$

در هر قسمت a_1 و d را به دست آورده و در رابطه $S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$ جای گذاری می کنیم:

۱۰. $a_1 = -5, -3, -1, \dots \xrightarrow{\frac{a_1 = -5}{d = 2}} S_7 = \frac{7}{2}(2(-5) + 19(2)) = 280$

۱۱. $a_n = 3n - 1 \Rightarrow 2, 5, 8, \dots$

$$\xrightarrow{\frac{a_1 = 2}{d = 3}} S_7 = 10(4 + 19(3)) = 610$$

۱۲. باید ببینیم با جمع کردن چند جمله (یعنی n مجهول) $S_n = 176$ می شود.

$$\frac{n}{2}(2 + (n-1)(3)) = 176$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2}(3n - 1) = 176 \xrightarrow{\times 2} n(3n - 1) = 352$$

(طرف اومده معادله بالا رو فل کنه وقت نوبتی تموم شده! ریدم که می گم.)

می توانیم با روش Δ معادله درجه دوم را حل کنیم اما طولانی خواهد بود. چون n عددی طبیعی است بهتر است با جستجو آن را به دست آوریم:

$$n = 10 \Rightarrow 10 \times (29) = 290 \xrightarrow{\text{کم}} n = 11$$

$$\Rightarrow 11(32) = 352 \checkmark \Rightarrow$$

۱۳. خب جمله اول و آخر دنباله حسابی (گفته یکنواخت!) را داریم پس بهتر

است از فرمول $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ استفاده کنیم:

$$S_n = 450 \text{ cm} \Rightarrow \frac{n}{2}(45 + 20) = 450 \Rightarrow n = 12$$

۱۴. باید ببینیم به ازای کدام n ، $S_n > 125$ می شود. با استفاده از فرمول داریم:

$$\frac{n}{2}(-2 + 3(n-1)) > 125 \Rightarrow \frac{n}{2}(3n - 5) > 125$$

$$\xrightarrow{\times 2} n(3n - 5) > 250 \xrightarrow{\text{(با جست و جوی برای } n)} n = 10$$

$$\Rightarrow 10(25) > 250 \Rightarrow n \geq 11$$

با جمع حداقل یازده جمله، از ۱۲۵ بیشتر می شود.

جمع ۲۰ جمله اول برابر $530 + 590 = 1120$ است. با فرمول S_n داریم:

$$S_{20} = 10(2a_1 + 19(6)) = 1120 \Rightarrow a_1 = -1$$

۲۱. اولین عدد سه رقمی بخش پذیر بر ۶، عدد ۱۰۲ (به ۲ و ۳ می‌شوره) است.

مجموع اعداد $114, \dots, 102, 108$ را می‌خواهیم. آخرین عدد سه رقمی بخش پذیر بر ۶ نیز عدد ۹۹۶ (باز ۳ به ۲ و ۳ می‌شوره بالا می‌امتان کن!) است. حالا ببینیم چندتا عدد داریم:

جمله عمومی با $a_1 = 102$ و $d = 6$ را نوشته و جمله n ام را برابر ۹۹۶ قرار می‌دهیم:

$$996 = 102 + (n-1)(6) \Rightarrow n = 150$$

$$S_{150} = \frac{150}{2}(2(102) + 149(6)) = 82350$$

۲۲. این اعداد $12, 17, 22, \dots$ (دوررقمی‌های به شکل $5k + 2$) هستند. آخرین عدد ۹۷ است. شبیه قبلی اول تعداد این اعداد را به دست می‌آوریم:

$$97 = 12 + (n-1)(5) \Rightarrow n = 18 \Rightarrow S_{18} = 9(2(12) + 17(5)) = 981$$

۲۳. دونه برای انداختن توپ اول $4 \times 2 = 2$ متر، برای توپ دوم $10 = 2(2+3)$ متر، برای توپ سوم $16 = 2(2+3+2)$ و ... می‌دود. مقدار طی شده برای انداختن توپ n ام، یک دنباله حسابی با $a_1 = 4$ و $d = 6$ می‌شود حالا:

$$S_n = 274 \Rightarrow \frac{n}{2}(4 + (n-1)(6)) = \frac{n}{2}(6n + 2)$$

$$= 3n^2 + n = 274$$


$$\rightarrow n = 11 \Rightarrow 3(121) + 11 = 374 \checkmark$$

پس ۱۱ توپ را درون سبد انداخته است.

۲۴. روش اول:

$$S_n = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = \frac{n}{2}(2 + 2(n-1)) = n^2$$

مجموع n جمله اول دنباله حسابی
با $a_1 = 1$ و $d = 2$



روش دوم: به شکل روبه‌رو توجه

کنید. $n^2 = n \times n$ دایره در شکل وجود دارد. حالا دایره‌ها را طوری دیگری شمارش می‌کنیم. دایره‌ها را با الگوی مقابل آبی و سیاه می‌کنیم. تعداد آن‌ها می‌شود $(2n-1) + 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1)$. چون یک تعداد دایره را شمارش کرده‌ایم دو عبارت به دست آمده، برابرند. پس:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

رابطه می‌گوید مجموع n عدد فرد متوالی که از یک شروع می‌شود برابر تعداد آن‌ها به توان ۲ است.

۲۵. رابطه اندیسی در دنباله حسابی

رابطه جالبی بین جمله‌های دنباله حسابی به نام رابطه اندیسی وجود دارد. ببینید:

$$(m, n, p, k), m+n=p+k \Rightarrow a_m + a_n = a_p + a_k$$

مثلاً $a_7 + a_8 = a_1 + a_{15}$ (چون جمع اندیسی‌های دو طرف برابر ۸ است)


$$a_1 + a_9 = a_2 + a_8 = a_3 + a_7 = a_4 + a_6 = a_5 + a_5$$

البته توجه کنید رابطه‌ای به صورت $a_7 + a_8 = a_1$ درست نیست (دوتا این‌ور و دوتا اون‌ور و اندیسی‌ها رو نمی‌شه جمع کرد).


طبق رابطه اندیسی داریم:

$$a_6 + a_6 = a_1 + a_{11} = a_2 + a_{10} = \dots = a_7 + a_6$$

$$\Rightarrow a_1 + a_7 + a_7 + a_7 + a_6 + a_6 + a_6 + a_6 + a_6 + a_6 + a_6 = 110$$



۲۶. طبق نکته درج واسطه حسابی $d = \frac{47-3}{10+1} = 4$ خواهد بود.



پس واسطه‌ها $7, 11, \dots$ می‌شود. جمع ۱۰ جمله این دنباله برابر است با: $S_{10} = 5(14 + 9(4)) = 250$. توجه دارید که جمع واسطه‌ها را می‌خواهیم پس جمله اول ۷ است نه ۳.

۲۷. مجموع زوایای داخلی n ضلعی محراب: مجموع زوایای داخلی هر

n ضلعی محراب از رابطه $180(n-2)$ به دست می‌آید.

مجموع زوایای داخلی ۵ ضلعی می‌شود $540 = 180 \times 3$. حالا $S_5 = 540$

$$\frac{5}{2}(2a_1 + 4(6)) = 540 \Rightarrow a_1 = 96^\circ$$

است. پس:

۲۸. در درس‌نامه گفتیم مجموع n جمله اول از $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ هم به دست می‌آید، پس $S_{100} = 50(a_1 + a_{100})$. از طرفی:

$$(a_1 + a_{100}) + (a_2 + a_{99}) + (a_3 + a_{98}) = 150$$

اما طبق رابطه اندیسی (پاسخ سؤال ۲۵) $a_2 + a_{99} = a_3 + a_{98} = \dots = a_7 + a_{94} = a_8 + a_{93} = \dots = a_{49} + a_{52} = 50$ و $a_1 + a_{100} = 50$ است.

۲۹. به دسته‌بندی زیر دقت کنید:

$$\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \dots, \{دسته نوزدهم\}$$

$$1 + 2 + 3 + \dots + 19$$

تا انتهای دسته نوزدهم به تعداد $1+2+3+\dots+19$ یعنی $\frac{19 \times 20}{2} = 190$ جمله جلو آمده‌ایم. پس دسته بیستم با عدد ۱۹۱ شروع شده و ۲۰ جمله دارد. پس داریم:

$$S_{20} = \frac{20}{2}(2(191) + (20-1)(1)) = 4010$$

۳۰. جملات دنباله به صورت $3n$ هستند. شبیه مسئله قبل تا انتهای دسته چهاردهم به تعداد $1+2+3+\dots+14 = \frac{14 \times 15}{2} = 105$ یعنی آخرین

جمله دسته چهاردهم $3 \times 105 = 315$ است. اولین عدد دسته پانزدهم برابر ۳۱۸ بوده و این دسته ۱۵ جمله (با قدرنسبت ۳) دارد. پس مجموع جمله‌های دسته پانزدهم برابر است با:

$$S_{15} = \frac{15}{2}(2(318) + (15-1)(3)) = 5085$$

۳۱. شطرنج ۶۴ خانه دارد. پس کافی است مجموع $1+2+2^2+\dots+2^{63}$ را به دست آوریم:

$$S_{64} = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1} = \frac{1(2^{64} - 1)}{2 - 1} = 2^{64} - 1$$

۳۲. مجموع ۶ جمله دنباله هندسی با قدرنسبت $2 = \sqrt{2}^2$ را می‌خواهیم:

$$S_6 = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}^6 - 1)}{\sqrt{2} - 1} = \frac{(\sqrt{2})(2^3 - 1)}{\sqrt{2} - 1} = 63\sqrt{2}$$

۳۳. مجموع ۸ جمله دنباله هندسی با قدرنسبت 2 را می‌خواهیم:

$$S_8 = \frac{a_1(q^8 - 1)}{q - 1} = \frac{1((-2)^8 - 1)}{-2 - 1} = -\frac{255}{3} = -85$$

۳۴. درست است.

$$S_7 = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^6} = \frac{1(1 - (\frac{1}{2})^7)}{1 - \frac{1}{2}} = 2(1 - \frac{1}{128})$$

۳۵. درست است.

$$S_n = \frac{1}{6}(3^n - 1)$$

۳۶. نادرست است، چون:

$$\begin{cases} n=1 \Rightarrow S_1 = \frac{1}{6}(2) = \frac{1}{3} \Rightarrow a_1 = \frac{1}{3} \\ n=2 \Rightarrow S_2 = \frac{1}{6}(3^2 - 1) = \frac{4}{3} \Rightarrow a_1 + a_2 = \frac{4}{3} \\ \Rightarrow a_2 = 1 \end{cases}$$

$$\frac{S_p}{S_r} = 9 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^p)}{1-q} = 9 \Rightarrow \frac{1-q^p}{1-q} = 9 \quad .45$$

$$\Rightarrow \frac{(1-q^p)(1+q^r)}{1-q^r} = 9 \Rightarrow 1+q^r = 9 \Rightarrow q = 2$$

حالا داریم:

$$\frac{S_1}{S_5} = \frac{a_1(1-q^1)}{1-q} = \frac{1-q^1}{1-q} = \frac{(1-q^1)(1+q^5)}{1-q^5}$$

$$= 1+q^5 = 1+2^5 = 33$$

.46 مساحت مربع برابر 1 است. در مرحله اول $\frac{1}{4}$ ، در مرحله دوم $\frac{1}{4}$ و ... در مرحله nام $(\frac{1}{4})^n$ از مساحت مربع رنگ می‌شود:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \dots + (\frac{1}{4})^n \geq \frac{99}{100} \Rightarrow \frac{1 - (\frac{1}{4})^n}{1 - \frac{1}{4}} \geq \frac{99}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{100} \geq (\frac{1}{4})^n \xrightarrow{\text{هر دو طرف مثبتین با معکوس کردن جهت نامساوی عوض می‌شود}} 100 \leq 2^{2n}$$

جستجو $\rightarrow 7 \leq n$

پس از 7 مرحله، حداقل 99٪ سطح مربع رنگ می‌شود.

.47 توجه کنید که سؤال S_p را نمی‌خواهد. گفته حاصل ضرب جمله‌ها.

48 حاصل ضرب n جمله اول دنباله هندسی


$$(a_1 a_2 \dots a_n) = (a_1)(a_1 q)(a_1 q^2) \dots (a_1 q^{n-1})$$

$$= (a_1)^n q^{1+2+\dots+n-1} = (a_1)^n q^{\frac{(n-1)n}{2}}$$

در دنباله هندسی داده شده $a_1 = 2$ و $q = \sqrt{2}$ است. پس:

$$10^{15} = 2^{15} \times (\sqrt{2})^{19 \times 20} = 2^{15} \times (\sqrt{2})^{380} = 2^{15} \times 2^{190} = 2^{205}$$

.48



$$\text{مجموع} = 50 + 2(\frac{50}{3}) + 2(\frac{50}{9}) + \dots + 2(\frac{50}{3^6})$$

(دقت کردید!)

بار اول فقط از بالا به پایین آمده است (50 m). اگر این جمله را جدا کنیم، جمله

بعدی تشکیل دنباله هندسی با $a_1 = \frac{100}{3}$ و $q = \frac{1}{3}$ می‌دهند. پس:

$$\text{مجموع} = 50 + \frac{100(1 - (\frac{1}{3})^6)}{1 - \frac{1}{3}} = 50 + 50(1 - \frac{1}{729})$$

$$= 50(2 - \frac{1}{729}) = 50 \times \frac{1457}{729} = 100 \text{ m}$$

.49 پراتر اول جمع 9 جمله دنباله هندسی با قدرنسبت x است. دومی هم همین‌طور با قدرنسبت -x؛ پس:

$$A = \frac{1-x^9}{1-x} \times \frac{1-(-x)^9}{1+x} = \frac{(1-x^9)(1+x^9)}{1-x^2} = \frac{1-x^{18}}{1-x^2}$$

$$\xrightarrow{x=\sqrt{2}} A = \frac{1-2^9}{1-2} = 511$$

.37 مجموع 10 جمله اول دنباله هندسی با $q = -\frac{1}{3}$ و $a_1 = 1$ را می‌خواهیم:

$$S_{10} = \frac{a_1(1-q^{10})}{1-q} = \frac{1(1 - (-\frac{1}{3})^{10})}{1 - (-\frac{1}{3})} = \frac{2}{3}(1 - \frac{1}{1024})$$

$$= \frac{2}{3} \times \frac{1023}{1024} = \frac{241}{512}$$

$$(1 + \frac{1}{3}) + (3 + \frac{1}{3}) + \dots = \underbrace{(1+3+5+\dots)}_{\text{دنباله حسابی با قدرنسبت 2}} + \underbrace{(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \dots)}_{\text{دنباله هندسی با قدرنسبت 1/3}}$$

$$= \frac{1}{3}(2(1) + (10-1)(2)) + \frac{(\frac{1}{3})(1 - (\frac{1}{3})^{10})}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$= 100 + 1 - \frac{1}{1024} = 100 + \frac{1023}{1024}$$

$$\frac{a^5 - 1}{a - 1} = \frac{(a-1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1)}{a - 1} = a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 \quad .39$$

$$a_n = \frac{2^{n-1}}{3} \Rightarrow \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \dots \quad .40$$

$$\xrightarrow{a_1 = \frac{1}{3}} S_{10} = \frac{\frac{1}{3}(1 - 2^{10})}{1 - 2} = \frac{1023}{3} = 341$$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = -126 \Rightarrow \frac{6(1 - (-2)^n)}{3} = -126 \quad .41$$

$$\Rightarrow 1 - (-2)^n = -63 \Rightarrow 64 = (-2)^n \Rightarrow n = 6$$

$$S_n > 500 \Rightarrow \frac{1-2^n}{-2} > 500 \Rightarrow \frac{2^n - 1}{2} > 500 \quad .42$$

$$\Rightarrow 2^n - 1 > 1000 \Rightarrow 2^n > 1001$$

حداقل 7 جمله $n \geq 7$ با جستجو

.43

$$\begin{cases} a_1 + a_r = 1 \xrightarrow{a_n = a_1 q^{n-1}} a_1 + a_1 q^r = 1 \\ \Rightarrow a_1(1 + q^r) = 1 \\ S_r = 3 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^r)}{1-q} = 3 \\ \xrightarrow{\text{تجزیه با مزدوج}} \frac{a_1(1-q)(1+q)(1+q^r)}{1-q} = 3 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{دو رابطه را تقسیم می‌کنیم}} \frac{a_1(1+q)(1+q^r)}{a_1(1+q^r)} = 3$$

$$\Rightarrow q = 2 \Rightarrow a_1 = \frac{1}{5} \Rightarrow S_p = \frac{63}{5}$$

.44 مجموع 3 جمله اول که همان S_p است. سه جمله دوم a_p, a_{2p}, a_{3p} است که جمع آن‌ها برابر $S_p - S_p$ است.

$$S_p = 136 \Rightarrow \frac{(a_1)(1-q^r)}{1-q} = 136$$

$$S_p - S_p = 17 \Rightarrow S_p = 136 + 17 = 153 \Rightarrow \frac{a_1(1-q^p)}{1-q} = 153$$

$$\xrightarrow{\text{با تقسیم دو طرف و ساده کردن}} \frac{1-q^p}{1-q^r} = \frac{153}{136} = \frac{9}{8}$$

$$\xrightarrow{\text{مزدوج}} \frac{(1-q^r)(1+q^r)}{1-q^r} = \frac{9}{8} \Rightarrow q^r = \frac{1}{8} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

۵۰. جمله سوم، هفتم و نهم یک دنباله حسابی به ترتیب به صورت $a_1 + 11d, a_1 + 6d, a_1 + 2d$ است. این سه عدد، تشکیل دنباله هندسی می‌دهند. پس مربع جمله وسط برابر با ضرب دو جمله کناری است.

$$(a_1 + 2d)(a_1 + 11d) = (a_1 + 6d)^2 \Rightarrow a_1^2 + 11a_1d + 22d^2 = a_1^2 + 12a_1d + 36d^2 \Rightarrow 2a_1d + 20d^2 = 0$$

$$\Rightarrow d(2a_1 + 20d) = 0$$

غیر قابل قبول \Rightarrow همه جمله‌ها برابر می‌شوند $\Rightarrow d = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} d = 0 \\ 2a_1 + 20d = 0 \end{cases} \text{ دقت کنید.}$$

$$\Rightarrow S_{21} = \frac{21}{2}(2a_1 + 20d) = 0$$

پس مجموع ۲۱ جمله اول برابر صفر است.

۵۱. اگر دنباله هندسی را t_n و دنباله حسابی را a_n در نظر بگیریم، داریم:

$$\begin{cases} a_1 = t_1 \\ a_4 = t_4 \\ a_{16} = t_{16} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 + 3d = a_1q \\ a_1 + 15d = a_1q^3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1(q-1) = 3d \quad (1) \\ a_1(q^3-1) = 15d \quad (2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{تقسیم}} \frac{a_1(q-1)(q+1)}{a_1(q-1)} = \frac{15d}{3d}$$

$$\Rightarrow q+1=5 \Rightarrow q=4$$

$$S_6 = \frac{a_1(1-q^6)}{1-q} \Rightarrow \frac{S_6}{a_1} = \frac{1-4^6}{1-4} = \frac{4095}{3} = 1365$$

۵۲. S_1 همان a_1 است؛ پس داریم:

$$n=1 \Rightarrow S_1 = 4 - \frac{(-1)}{r-1} = 6 \Rightarrow a_1 = 6$$

$$n=2 \Rightarrow S_2 = 4 - \frac{(-1)^2}{r} = 3 \Rightarrow \frac{6}{a_1} + a_2 = 3 \Rightarrow a_2 = -3$$

پس دنباله هندسی به صورت $6, -3, \frac{3}{4}, -\frac{3}{16}, \dots$ است.

جملات ردیف زوج دنباله به صورت $3, -\frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \dots$ هستند، یعنی دنباله‌ای هندسی با قدرنسبت $\frac{1}{4}$ ؛ پس مجموع جملات a_2, a_4, \dots, a_{2n} (یعنی ۱۰ جمله) برابر است با:

$$\frac{(-3)(1-(\frac{1}{4})^{10})}{1-\frac{1}{4}} = -4(1-(\frac{1}{4})^{10})$$

۵۳. جمله‌های دوم، چهارم و دوازدهم یک دنباله حسابی به ترتیب به صورت $1+d, 1+3d, 1+11d$ هستند. این ۳ جمله تشکیل دنباله هندسی نیز می‌دهند؛ پس داریم:

$$(1+d)(1+11d) = (1+3d)^2$$

$$\Rightarrow 1+11d+d+11d^2 = 1+6d+9d^2$$

$$\Rightarrow 6d = -2d^2 \xrightarrow{+2d} 3 = -d \Rightarrow d = -3$$

$$1+d, 1+3d, 1+11d \xrightarrow{d=-3} -2, -8, -32$$

پس جمله سوم دنباله هندسی برابر -2 و جمله پنجم آن برابر -8 است؛ بنابراین قدرنسبت دنباله هندسی برابر 2 است. حالا $a_2 = -\frac{2}{2} = -1$ و

پس داریم: $a_1 = -\frac{1}{2}$

$$S_{10} = \frac{a_1(1-q^{10})}{1-q} = \frac{-\frac{1}{2}(1-(2)^{10})}{1-2}$$

$$= \frac{1}{2}(1-1024) = -\frac{1023}{2}$$

۵۴.

$$x^2 + \frac{x}{r} - 3 = 0 \Rightarrow S = -\frac{b}{a} = -\frac{\frac{1}{r}}{1} = -\frac{1}{r}, P = \frac{c}{a} = -3$$

۵۵. اول معادله را مرتب می‌کنیم تا به صورت $-x^2 - 3x + 2 = 0$ دربیاید.

حالا $S = -\frac{-3}{-1} = -3$ و $P = \frac{2}{-1} = -2$ است.

۵۶. فرض کنیم β ریشه بزرگ‌تر باشد. داریم:

$$\beta - \alpha = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{\sqrt{1+12}}{|1|} = \sqrt{13}$$

۵۷. درست است. $x^2 - 4x + 1 = 0$

$$\begin{cases} \Delta = 16 - 4 = 12 > 0 \\ S = -\frac{-4}{1} = 4 > 0 \\ P = 1 > 0 \end{cases} \Rightarrow \text{هر دو ریشه مثبت است.}$$

۵۸. نادرست است.

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = S^2 - 2P = (-1)^2 - 2(-1) = 3$$

۵۹. درست است. چون علامت a و c متفاوت است حتماً $ac < 0$ و $\Delta = b^2 - 4ac$ مثبت می‌شود.

۶۰. ریشه یا جواب معادله عددی است که در معادله صدق می‌کند، یعنی می‌توانیم آن را به جای x قرار دهیم.

$$x = -1 \Rightarrow 4 - a - 7 = 0 \Rightarrow a = -3$$

حالا کافی است معادله $4x^2 - 3x - 7 = 0$ را حل کنیم. $a + c = b$ است؛ پس یکی از ریشه‌ها -1 و دیگری $x = -\frac{c}{a} = \frac{7}{4}$ می‌باشد.

$$P = \frac{c}{a} = -\frac{7}{4} = -1.75 \quad ۶۱.$$

$$\left. \begin{aligned} S &= 2 + 2\sqrt{5} + 3 - 2\sqrt{5} = 6 \\ P &= (2 - 2\sqrt{5})(2 + 2\sqrt{5}) = 4 - 20 = -16 \end{aligned} \right\} \quad ۶۲.$$

$$\Rightarrow x^2 - Sx + P = 0 \Rightarrow x^2 - 6x - 11 = 0$$

در هر قسمت، اول S و P را به دست می‌آوریم بعد با استفاده از اتحاد، تجزیه، مخرج مشترک و ... عبارتها را به S و P ارتباط می‌دهیم.

$$x^2 - 4x + 1 = 0 \xrightarrow[\frac{P=c}{a=1}]{\frac{S=-b}{a=4}} \alpha^2 + \frac{1}{\alpha} + \beta^2 + \frac{1}{\beta} \quad ۶۳.$$

$$= \alpha^2 + \beta^2 + \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = S^2 - 2P + \frac{S}{P} = 14 + 4 = 18$$

(گفتیم که $\alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 2P$ ، رو فقط باشین.)

$$x^2 - 4x - 2 = 0 \xrightarrow[\frac{P=c}{a=-2}]{\frac{S=-b}{a=4}} \frac{\alpha}{\beta+1} + \frac{\beta}{\alpha+1} \quad ۶۴.$$

$$= \frac{\alpha^2 + \alpha + \beta^2 + \beta}{(\alpha+1)(\beta+1)} = \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \alpha + \beta}{\alpha\beta + \alpha + \beta + 1} = \frac{S^2 - 2P + S}{P + S + 1} = \frac{24}{3} = 8$$

$$x^2 + 2x - 5 = 0 \xrightarrow[\frac{P=c}{a=-5}]{\frac{S=-b}{a=2}} \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha^2 + \beta^2) \quad ۶۵.$$

$$= P(S^2 - 2P) = (-5)(14) = -70$$

$$x^2 - 7x + 4 = 0 \xrightarrow[\frac{P=c}{a=4}]{\frac{S=-b}{a=7}} \quad ۶۶.$$


به طور مستقیم $\alpha\sqrt{\beta} + \beta\sqrt{\alpha}$ را نمی‌توانیم حساب کنیم

\Leftarrow مربع آن را حساب می‌کنیم و بعد رادیکال می‌گیریم

$$(\alpha\sqrt{\beta} + \beta\sqrt{\alpha})^2 = \alpha^2\beta + \beta^2\alpha + 2\alpha\beta\sqrt{\alpha\beta}$$




نمودارهای مهم




$(\alpha, k > 0)$

$$f(x) = x^r, -x^r, (x \pm \alpha)^r, x^r \pm k$$




$(\alpha, k > 0)$

$$f(x) = |x|, -|x|, |x \pm \alpha|, |x| \pm k$$




$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$D_f = R_f = \mathbb{R} - \{0\}$$




$$f(x) = [x] \begin{cases} D_f = \mathbb{R} \\ R_f = \mathbb{Z} \end{cases}$$




$$y = |f(x)|$$

$$y = -f(x)$$




$(\alpha, k > 0)$


$$f(x) = \sqrt{x}, \sqrt{x \pm \alpha}, -\sqrt{x}, \sqrt{x} \pm k$$




$$f(x) = \sqrt{ax+b+k} \quad (a > 0)$$



$$f(x) = \sqrt{ax+b+k} \quad (a < 0)$$














$$f(x) = [x] + [-x] = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Z} \\ -1 & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$



$(\alpha < \beta)$


$$f(x) = |x - \alpha| + |x - \beta|$$



آزمون‌های نیم‌سال اول دوم 9



ردیف	امتحان شماره ۱	رشته ریاضی - فیزیک	حسابان ۱
نمره	Kheilisabz.com	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	نمره
۱	جای خالی را با عبارتهای مناسب تکمیل کنید. الف) $x=1$ صفر تابع $f(x) = x^2 + x^2 + x - 3$ است، در این صورت $f(x)$ بر بخش پذیر است. ب) بیشترین مقدار تابع $f(x) = -x^2 + 2x - 5$ برابر است. پ) مجموعه جواب نامعادله $ x+1 < 2$ به صورت بازه است. ت) اگر $f(x) = [x-1]$ باشد، آن گاه $f(2 - \sqrt{2}) = \dots$		۱
۲	مجموع چند جمله اول دنباله مقابل برابر ۸۷ می شود؟ ۲, ۷, ۱۲, ...		۱
۳	برای محافظت از تابش خطرناک مواد رادیواکتیویته، لایه های محافظتی وجود دارد که شدت تابش پس از عبور از هر یک از آنها نصف می شود. حداقل چند لایه باید استفاده کنیم تا شدت تابش مواد خطرناک حداقل تا ۹۹٪ کاهش یابد؟		۱
۴	در معادله درجه دوم $2x^2 - 8x + m = 0$ یکی از جوابها دو واحد از دیگری کم تر است. m و هر دو ریشه را بیابید.		۱
۵	شکل مقابل، نمودار سهمی به معادله $y = ax^2 + bx + c$ است. علامت ضرایب a, b, c و تعداد صفرهای تابع را مشخص کنید. 		۱
۶	معادله های زیر را حل کنید. الف) $\frac{x}{x-1} + \frac{3}{x^2-1} = \frac{x-2}{x+1}$ ب) $2 + \sqrt{1+x} = x-3$ پ) صفرهای تابع $f(x) = x^4 + 6x^2 - 7$ را بیابید.		۲
۷	تابع مقابل را بدون قدرمطلق نوشته و آن را رسم کنید. $f(x) = x + x-1 $		۱/۵
۸	معادله روبهرو را حل کنید. $\frac{x-2}{ 3-x } = 4$		۱
۹	نقاط $A(-3, -4)$ و $B(1, 2)$ دو سر قطرهای دایره ای هستند. مختصات مرکز و طول شعاع دایره را پیدا کنید.		۱
۱۰	معادله دوزلع مستطیلی به صورت $x+y=3$ و $x-y=1$ و نقطه $A(-1, -1)$ یک رأس مستطیل است. مساحت مستطیل چه قدر است؟		۱
۱۱	دو تابع $f(x) = x+3$ و $g(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & x \neq 3 \\ k & x = 3 \end{cases}$ مساوی اند. k را به دست آورید.		۱
۱۲	دامنه توابع زیر را به دست آورید. الف) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2+x-6}$ ب) $g(x) = \frac{3x+5}{\sqrt{2 x -1}}$		۱
۱۳	نمودار تابع های زیر را رسم کنید. الف) $\begin{cases} f: D_f \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = \sqrt{2x+6} - 1 \end{cases}$ (در دامنه تعریف) ب) $\begin{cases} f: [-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = [2x] \end{cases}$		۲
۱۴	دامنه تابع $f(x) = - x+1 - 2$ را به گونه ای محدود کنید تا یک به یک گردد.		۰/۵
۱۵	ضابطه تابع وارون $f(x) = \frac{x+1}{2x-1}$ را به دست آورید.		۱
۱۶	الف) دامنه تابع $\frac{f}{g}$ را بیابید. ب) حاصل $(2f - 3g)(2)$ را بیابید. اگر $f(x) = \sqrt{4x-x^2}$ و $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$ باشد:		۱
۱۷	اگر $(f \circ g)(x) = 3x - 1$ و $f(x) = \frac{x}{x+1}$ باشد، ضابطه ای برای تابع $g(x)$ را به دست آورید.		۱
۱۸	اگر $f = \{(1, 2), (2, 5), (3, -1), (-1, 4)\}$ و $g = \{(1, 4), (2, 3), (5, -1)\}$ ، تابع $f^{-1} \circ g^{-1}$ را به دست آورید.		۱
۲۰	جمع نمرات		



۸. $\frac{x-2}{|3-x|} = 4 \Rightarrow 4|3-x| = x-2$

$$\Rightarrow \begin{cases} x < 3 \Rightarrow 4(3-x) = x-2 \\ \Rightarrow 12-4x = x-2 \Rightarrow x = \frac{14}{5} \text{ قابل قبول} \\ x > 3 \Rightarrow 4(x-3) = x-2 \\ \Rightarrow 3x = 10 \Rightarrow x = \frac{10}{3} \text{ قابل قبول} \end{cases}$$

۹. مرکز دایره، وسط دو سر قطر دایره است؛ پس:

$$M\left(\frac{1+(-2)}{2}, \frac{2+(-4)}{2}\right) = M(-1, -1)$$


طول پاره خط AB (قطر) دو برابر شعاع دایره است؛ پس:

$$2R = \sqrt{(1+2)^2 + (2+4)^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

پس $R = \sqrt{13}$

۱۰. دو ضلع داده شده عمود بر هم هستند (شیب آن‌ها قرینه و معکوس یکدیگر است) و نقطه داده شده روی هیچ کدام از دو خط نیست، پس فاصله نقطه A از دو خط، همان طول و عرض مستطیل است.

$$x+y-3=0 \Rightarrow d = \frac{|-1-1-3|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$



$$\text{مساحت مستطیل} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5}{2}$$

$$x-y-1=0 \Rightarrow d' = \frac{|-1+1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

۱۱. دامنه هر دو تابع برابر \mathbb{R} است.

اگر $x \neq 3$ باشد $f(x) = \frac{x^2-9}{x-3} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)} = x+3$

ازای $x \neq 3$ مساوی‌اند، پس کافی است به ازای $x=3$ هم مساوی باشند:

$$f(3) = g(3) \Rightarrow 6 = k$$


۱۲.

الف $\begin{cases} x \geq 0 \\ x^2+x-6=0 \Rightarrow x=2, -3 \text{ باید حذف شود} \\ \Rightarrow D = [0, +\infty) - \{2, -3\} = [0, 2) \cup (2, +\infty) \end{cases}$

ب $2|x|-1 > 0 \Rightarrow |x| > \frac{1}{2} \Rightarrow x > \frac{1}{2} \text{ یا } x < -\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow D = (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$$

x	-3	-\frac{5}{2}	-1
y	-1	0	1



$$D_f: 2x+6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3$$

۱۳. الف

پاسخ‌نامه تشریحی

۱. الف $x-1$

ب طول رأس سهمی $x = -\frac{b}{2a} = 1$ است، پس عرض رأس سهمی یا بیشترین مقدار می‌شود: $f(1) = -4$

پ $|x+1| < 2 \Rightarrow -2 < x+1 < 2$

$$\xrightarrow{-1} -3 < x < 1 \Rightarrow \text{جواب} = (-3, 1)$$

ت $f(2-\sqrt{2}) = [2-\sqrt{2}-1] = [1-\sqrt{2}] = -1$
بین -1 و 0

۲. دنباله داده شده حسابی با جمله اول ۲ و قدرنسبت $d = 5$ است، پس:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow 17 = \frac{n}{2}(2 + (n-1)5)$$

$$\Rightarrow 174 = n(5n-1) \Rightarrow n = 6$$

پس مجموع شش جمله اول دنباله برابر ۸۷ می‌شود.

۳. حداقل ۷ لایه

$$\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n \geq \frac{99}{100} \Rightarrow \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(1-\left(\frac{1}{2}\right)^n)}{1-\frac{1}{2}} \geq \frac{99}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{100} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow 100 \leq 2^n \Rightarrow 7 \leq n$$

۴.

$$\begin{cases} \alpha = \beta - 2 \\ \alpha + \beta = -\frac{7}{2} = -4 \Rightarrow \beta - 2 + \beta = -4 \Rightarrow \beta = -1 \Rightarrow \alpha = -3 \\ \alpha\beta = \frac{m}{2} \Rightarrow -3 = \frac{m}{2} \Rightarrow m = -6 \end{cases}$$

۵. عرض از مبدأ (محل برخورد تابع با محور y) منفی است، پس $c < 0$.

سهمی Max دارد پس $a < 0$ است. معادله دو ریشه منفی دارد پس

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} < 0 \text{ چون } \alpha < 0 \text{ پس } b < 0 \text{ است. تابع در دو نقطه محور } x \text{ها}$$

را قطع کرده پس دو تا صفر دارد.

۶.

الف $\frac{x}{x-1} + \frac{3}{x^2-1} = \frac{x-2}{x+1}$

$$\xrightarrow{\times(x^2-1)} x(x+1) + 3 = (x-2)(x-1)$$

$$\Rightarrow x^2 + x + 3 = x^2 - 3x + 2 \Rightarrow 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$$

ریشه هیچ کدام از مخرج‌ها نیست پس قابل قبول است.

ب $2 + \sqrt{1+x} = x-3 \Rightarrow \sqrt{1+x} = x-5$

$$\xrightarrow{\text{به توان دو}} 1+x = x^2 - 10x + 25$$

$$\Rightarrow x^2 - 11x + 24 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-8) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=3 \xrightarrow{\text{صنق نمی‌کند}} \text{غیر قابل قبول} \\ x=8 \xrightarrow{\text{صنق می‌کند}} \text{قابل قبول} \end{cases}$$

پ $x^2 = t \Rightarrow t^2 + 6t - 7 = 0 \Rightarrow (t-1)(t+7) = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} t=1 \Rightarrow x^2=1 \Rightarrow x=\pm 1 \\ t=-7 \Rightarrow x^2=-7 \Rightarrow \text{جواب ندارد} \end{cases}$$

۷.

$$f(x) = |x| + |x-1| = \begin{cases} -2x+1 & x \leq 0 \\ 1 & 0 < x \leq 1 \\ 2x-1 & 1 < x \end{cases}$$

الف $D_f: 4x - x^2 \geq 0 \Rightarrow x(4-x) \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 4$.۱۶

$D_g = \mathbb{R} - \{1\}, g(x) = 0 \Rightarrow x = -1$

$D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g - \{x \mid g(x) = 0\}$

$= [0, 4] - \{1, -1\} = [0, 1) \cup (1, 4]$

ب $(2f - 3g)(2) = 2f(2) - 3g(2) = 2 \times 2 - 3 \times 2 = -2$

$f(g(x)) = 3x - 1 \Rightarrow \frac{g(x)}{g(x)+1} = 3x - 1$

$\Rightarrow g(x) = 3xg(x) - g(x) + 3x - 1$

$\Rightarrow 2g(x) - 3xg(x) = 3x - 1$

$\Rightarrow g(x)(2 - 3x) = 3x - 1 \Rightarrow g(x) = \frac{3x-1}{2-3x}$


$f^{-1} = \{(2, 1), (5, 2), (-1, 3), (4, -1)\}$

$g^{-1} = \{(4, 1), (3, 2), (-1, 5)\}$

$\Rightarrow f^{-1} \circ g^{-1} = \{(3, 1), (-1, 2)\}$

.۱۷

.۱۸



ب $-1 \leq x < 1 \Rightarrow -2 \leq 2x < 2$

$x - 2 \leq 2x < -1 \Rightarrow y = -2 \quad -1 \leq x < -\frac{1}{4}$

$-1 \leq 2x < 0 \Rightarrow y = -1 \quad -\frac{1}{4} \leq x < 0$

$0 \leq 2x < 1 \Rightarrow y = 0 \quad 0 \leq x < \frac{1}{4}$

$1 \leq 2x < 2 \Rightarrow y = 1 \quad \frac{1}{4} \leq x < 1$

۱۴. می‌توانیم دامنه تابع را به صورت $[-1, +\infty)$ یا $(-\infty, -1]$ محدود کنیم تا تابع یک‌به‌یک گردد.

.۱۵

$y = \frac{x+1}{2x-1} \Rightarrow 2xy - y = x+1$

$\Rightarrow 2xy - x = y+1 \Rightarrow x(2y-1) = y+1$

$\Rightarrow x = \frac{y+1}{2y-1} \Rightarrow f^{-1}(y) = \frac{y+1}{2y-1} \quad \text{یا} \quad f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2x-1}$

