



مجموعه کتاب‌های آی‌کیو قرن جدید
• ویژه کنکور ۱۴۰۴ •



حسابات جامع کنکور

دهم | یازدهم | دوازدهم

مطابق با سبک جدید سؤالات کنکور
مؤلفان: مهندس سجاد عظمی - مهندس مجید رفعتی
علی احمدی قزل دشت

تألیف
جدید

مجموعه کتاب‌های فرمول بیست و پنجم ارتقا و ترمیم معدل نهایی



دکتر آی کیو
DRIQ.com
کلاس آنلاین



گاج مارکت
gajmarket.com
فروشگاه آنلاین



گاجینو
gajino.com
آموزش آنلاین



مقدمه

تقدیم به پدر و مادر عزیزم

به جای آنکه چندین کتاب بخوانید، کتاب‌های گاج را چندین بار بخوانید

● برای تألیف این کتاب یک تیم کاربیلد و کارکشته در زمینه طرح تست، گرد هم آمدیم و طی دو سال سعی کردیم کتاب کامل و بی نقصی را تولید کنیم که جوابگوی همه تست‌های کنکور بهویژه تست‌های سطح بالا باشد.

● وقتی اسم برنده آیکیو به گوش می‌رسد، اغلب فکر می‌کنند با کتاب المپیادی مواجه هستند و این دسته از کتاب‌ها مخصوص دانش‌آموزان خاص است! در حالی که اینگونه نیست؛ این کتاب برای هر کسی که کتاب درسی را خوب خوانده است و یا سر کلاس دبیر فعال بوده است، قطعاً مفید خواهد بود. تست‌های این کتاب طوری تالیف شده است که در هر سطحی که باشید، شما را چند پله بالاتر ببرد. پس لزوماً این کتاب دارای تست‌های خیلی سختی نیست. می‌شود گفت غلظت تست‌های سخت و دارای ایده نوکمی بیشتر از سایر کتاب‌های است. این هم به علت رویکرد کنکورهای جدید است که هر سال رو به دشواری می‌رود. به‌حال هدف این کتاب آمادگی ۱۰۰ درصدی شما برای کنکور است، پس طبیعی است که شما را برای سخت‌ترین شرایط آماده کند. در چینش سؤالات و مبحث‌بندی مباحث فصل‌ها خیلی حساسیت به خرج دادیم، سعی کردیم سؤالات را هم براساس درجه سختی و هم براساس روند آموزشی بچینیم و این کار بسیار حساس و طاقت‌فرسا بود! به طور کلی رویکرد ما تالیف کتاب کاملی بوده به‌طوری که شما را از هر کتاب دیگری بی‌نیاز کند. همه سعی‌مان این بوده تا به این شعار گاج «به جای آنکه چندین کتاب بخوانید، کتاب‌های گاج را چندین بار بخوانید» جامه عمل بپوشانیم. به شما اطمینان کامل می‌دهیم که کنکور ۱۴۰۴ و حتی بعد از آن، سوال خارج از این کتاب و یا سخت‌تر از این سوالات نخواهد داشت.

برای اینکه بتونی به بهترین شکل ممکن از این کتاب استفاده کنی، اول باید بدounی که تست‌های این کتاب رو به ترتیب سطح‌بندی اون‌ها پاسخ بدی. پس اول توضیحات کاملی راجع به سطح‌بندی تست‌ها برآتون انجام میدیم:

سطح‌بندی تست‌ها

تست‌های جنجالی	تست‌های چالشی	تست‌های قرمز	تست‌های آبی
<p>TNT</p> <p>این تست‌ها برای دانش‌آموزانی هست که به فکر درصد بالای ۸۰ بوده و بسیار سخت‌کوش و علاقه‌مند به تست‌های بسیار چالشی هستن. پس این تست‌ها به هیچ عنوان برای همه دانش‌آموزان مناسب نیست. تست‌های TNT بسیار سخت، بسیار چالشی و بسیار پر محاسبه و خلاقانه بوده و در سال‌های اخیر یک یا دو تست کنکور از این سطح تست‌ها می‌باشد. سوالات بسیار سخت کنکورهای اخیر باعث شد این سطح‌بندی رو برآتون انجام بدیم تا رتبه‌های برتر کنکور هم با دیدن این کتاب لذت ببرن.</p>	<p>IQ+</p> <p>بعد از اینکه روی تست‌های آبی و قرمز کامل مسلط شدی، و میخوای بیشتر تلاش کنی و درصد بالاتری به دست بیاری، میتوانی سراغ تست‌های IQ+ بروی. این تست‌ها سخت، چالشی، ترکیبی و پر محاسبه بوده و شما رو برای موفقیت در تست‌های سخت کنکور سراسری آماده میکنه.</p> <p>دقت کنید! تست‌های سخت و چالشی کنکورهای سراسری سال‌های قبل هم، جزء این تست‌ها هستن.</p>	 <p>تست‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده، تست‌های سطح بالاتر، ترکیبی و با محاسبات بیشتر بوده که برای تسلط بر زوایای مختلف مباحث برای تو طراحی شده‌اند. بعد از حل تست‌های آبی، تست‌های قرمز رو حل کن و خودت رو بیشتر به چالش بکش.</p>	 <p>در ابتدا باید تست‌هایی که با رنگ آبی مشخص شده رو جواب بدی، به زبان دیگه، حل تست‌های آبی در گام اول برای هر دانش‌آموزی واجبه. تست‌های آبی، تست‌های مفهومی با محاسبات ساده هستن که اعتماد به نفس تو رو در ابتدا بالا میبرن.</p>

معرفی ویژگی‌های کتاب



دام-تسویی

طرح‌های کنکور برای اینکه بفهمن روی مباحثت مسلطی با نه، میان در صورت سوال‌ها از عبارت‌هایی استفاده میکنن که تو حتی بعد از حل سوال، گزینه غلط رو جواب بدی. در برخی موارد هم گزینه‌ها رو به گونه‌ای قرار میدن که تو رو به اشتباه بندازن! این موارد رو با آیکون برآتون مشخص کرديم که روی همه جنبه‌های پنهان سوال‌ها هم مسلط بشی و روز کنکور، اشتباه نکنی.



روش سریع‌تر

در حل برخی از سوال‌ها، در کنار روش‌های تشریحی و تستی، میتوانی از سوال رو حل کنی. پس سعی کردیم به روزترین و خاص‌ترین روش‌های میانبر و سریع‌تر در حل سوال‌ها رو برات بیان کنیم تا پاسخنامه این کتاب، نسبت به کتاب‌های مشابه، متفاوت باشه و جامع‌ترین و کامل‌ترین پاسخنامه رو ببینی.



به جوره دیگه! در حل برخی از سوال‌ها، خواسته‌های سوال رو کمی عوض میکنن و در کنکورهای جدید ازش استفاده میکنن! پس در پاسخنامه کتاب، هر وقت آیکون رو دیدی، بدون میخوایم تو رو با تمام ایده‌ها و زوایای مختلف اون سوال آشنا کنیم.



هایلایت

درسنامه‌های کاربردی درسنامه‌ها و نکات مهم رو برات در پاسخنامه کتاب کردیم. در درسنامه‌ها از بیان نکات بیهوده و اضافی پرهیز شده تا خوندن اون‌ها کاربردی تر بشه. دیدن جداول و کادریندی‌های به تو رو با تمام ایده‌ها و جا، خوندن درسنامه‌ها رو برات لذت‌بخش میکنه.



تا جای ممکن، سعی کردیم فصل‌ها رو به مباحثت‌کوچکی تقسیم بکنیم، تا بتونی با دیدن هر تست، به زوایای مختلف و تیپ‌بندی در هر مبحث پی ببری. قبل شروع هر تیپ تست، برای اینکه بدونی قراره با چه مدل تستی رو به رو بشی، بهت دادیم. اینجوری در هر آزمون، سرنخ هر تست رو به راحتی توی ذهن‌ت پیدا میکنی.

تشکر و قدردانی:

● تشکر ویژه می‌کنم از اساتید عزیزی که در مراحل تالیف، همراه ما بودن به خصوص آقای نریمان فتح‌اللهی که تک‌تک تست‌ها رو با حوصله بررسی کردن. و همچنین تشکر و قدردانی می‌کنم از اساتید عزیزی که با نظرات و تجربه‌های ارزشمندشون، باعث شدن‌کتاب بهتری تالیف بشه.

● **اساتید:** معین کرمی، علی مقدمنیا، محمد مصطفی ابراهیمی، امید شیری‌نژاد، آرش عمید.

به امید موفقیت‌های بزرگت ...
سجاد عظمتی - مجید رفعتی

sajad.azemati



مثلثات

درس اول: مقدمات و مفاهیم اولیه مثلثات

۵۰	درجه و رادیان	۱۵
۵۱	نسبت‌های مثلثاتی مهم	۱۶
۵۵	دایره مثلثاتی	۱۷
۵۷	شیب خط و تانزانس	۱۸

درس دوم: اتحادها و روابط مثلثاتی

۵۸	روابط مثلثاتی مقدماتی	۱۹
۶۰	زاویه‌های متمم و مکمل	۲۰
۶۵	زاویه‌های ترکیبی ($\pi \pm \alpha, \pi \pm \beta$)	۲۱
۶۳	روابط	۲۲
۶۷	رابطه طلایی	۲۳
۶۸	کاربردها و نتایج روابط	۲۴
۷۰	نسبت‌های مثلثاتی $\alpha \pm \beta$	۲۵

درس سوم: توابع متناوب و نمودار ...

درس چهارم: معادلات مثلثاتی

۸۴	حل معادلات مثلثاتی با کمک روابط	۲۶
۸۵	حل معادلات مثلثاتی شامل کمان‌های $\alpha \pm \beta$	۲۷
۸۶	دسته‌بندی و فاکتورگیری	۲۸
۸۶	معادلات مثلثاتی کسری	۲۹
۸۸	مسائل ترکیبی و خواسته‌های خاص	۳۰

پاسخ‌نامه تشریحی

حد، پیوستگی و مجانب

درس اول: تقسیم چند جمله‌ای‌ها و ...

درس دوم: مفاهیم اولیه و محاسبه حد توابع

۹۳	همسايگی	۳۱
۹۴	فرائيندهای حدی	۳۲
۹۶	قضایای حد	۳۳
۱۰۰	ابهام $\frac{0}{0}$	۳۴

درس سوم: حد بینهایت و حد در بینهایت

۱۰۹	حد بینهایت	۳۵
۱۱۳	حد در بینهایت	۳۶

درس چهارم: مجانب‌های قائم و افقی تابع

درس پنجم: پیوستگی

۱۳۴	مفهوم پیوستگی	۳۷
۱۲۸	نقطه مرزی خاص	۳۸
۱۲۹	پیوستگی در بازه	۳۹

پاسخ‌نامه تشریحی

فهرست

تابع

درس اول: مفاهیم تابع

۱	شناسایی تابع
۲	مقدار تابع
۳	دامنه و برد تابع
۴	تساوی دو تابع

درس دوم: انتقال و تبدیل نمودار تابع

۵	انتقال و قرینه‌یابی
۶	انبساط و انقباض نمودار

درس سوم: انواع تابع

درس چهارم: توابع صعودی و نزولی

درس پنجم: اعمال جبری روی توابع و ترکیب توابع

۷	مقداردهی به ترکیب توابع
۸	ضابطه ترکیب توابع
۹	دامنه و برد ترکیب توابع
۱۰	وضعیت صعودی و نزولی توابع مركب

درس ششم: تابع یکبه‌یک و تابع وارون

۱۱	تابع وارون
۱۲	محاسبه ضابطه تابع وارون
۱۳	برخورد f و f^{-1} و برخورد g و g^{-1}
۱۴	ترکیب تابع f و f^{-1} و ترکیب تابع f و g

پاسخ‌نامه تشریحی

مشتق

درس اول: مفهوم هندسی مشتق و ...

درس دوم: تابع مشتق و قوانین محاسبه مشتق

۱۳۴	قواعد مشتق‌گیری
۱۳۷	تکنیک‌های مشتق‌گیری
۱۳۸	مشتق تابع مرکب
۱۴۲	مشتق مرتبه دوم
۱۴۳	تعريف مشتق با ظاهری متفاوت!
۱۴۴	مشتق توابع مثلثاتی
۱۴۹	معادله خط مماس

درس سوم: مشتق چپ و راست و مشتق‌پذیری

۱۵۳	مشتق تابع چند ضابطه‌ای
۱۵۵	مشتق توابع شامل قدرمطلق و جزء صحیح
۱۵۶	نقاط مشتق ناپذیر، دامنه تابع مشتق و مشتق‌پذیری ...
۱۵۹	نمودار تابع مشتق

درس چهارم: آهنگ تغییر

پاسخنامه تشریحی

قدرمطلق و براکت

درس اول: قدرمطلق

۲۱۵	تعریف و ویژگی‌های قدرمطلق
۲۱۶	معادلات قدرمطلق
۲۱۷	نامعادلات قدرمطلقی
۲۱۸	نمودارهای قدرمطلقی

درس دوم: جزء صحیح

۲۱۶	تعریف و ویژگی‌ها
۲۱۷	معادله و نامعادله شامل جزء صحیح
۲۱۸	نمودار توابع شامل جزء صحیح
۵۸۶	پاسخنامه تشریحی

توان گویا و عبارت جبری

درس اول: توان گویا و عبارت جبری

۲۲۰	ریشه و توان
۲۲۱	مقایسه مقادیر تقریبی ریشه n ام
۲۲۲	اعداد با توان گویا
۲۲۳	قوانين رادیکال‌ها

درس دوم: عبارت‌های جبری

۲۲۵	اتحادها
۲۲۸	ساده کردن عبارات رادیکالی
۲۳۰	گویا کردن

پاسخنامه تشریحی

کاربرد مشتق

درس اول: نقاط بحرانی و اکسترمم‌های تابع

۱۶۶	ارتباط یکنواختی تابع با مشتق آن
۱۶۸	نقاط بحرانی
۱۷۰	اکسترمم‌های نسبی تابع
۱۷۴	اکسترمم‌های مطلق

درس دوم: بهینه‌سازی

درس سوم: جهت ت-curv، نقطه عطف و رسم نمودار تابع

۱۸۳	جهت ت-curv یک تابع
۱۸۴	نقطه عطف
۱۸۶	نمودار شناسی

پاسخنامه تشریحی

مجموعه، الگو و دنباله



درس اول: مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

۲۶۶	مجموعه‌های اعداد	۱۰۰
۲۶۷	بازه‌ها	۱۰۱
۲۶۸	مجموعه‌های متناهی و نامتناهی	۱۰۲
۲۶۹	متهم یک مجموعه و مجموعه مرجع	۱۰۳
۲۷۰	قوانين مجموعه‌ها	۱۰۴
۲۷۱	محاسبه تعداد اعضای مجموعه‌ها	۱۰۵

درس دوم: الگو و دنباله

۲۷۳	دنباله خطی و درجه ۲	۱۰۶
۲۷۵	چند دنباله خاص (دنباله بازگشته، فیبوناچی و ...)	۱۰۷

درس سوم: دنباله‌های حسابی و هندسی

۲۷۷	دنباله حسابی	۱۰۸
۲۸۰	مجموع جملات دنباله حسابی	۱۰۹
۲۸۲	دنباله هندسی	۱۱۰
۲۸۵	مجموع جملات دنباله هندسی	۱۱۱

پاسخ‌نامهٔ تشریحی

هندسه تحلیلی



هندسه مختصاتی (تحلیلی)

۲۸۸	معادله خط	۱۱۲
۲۹۰	فاصله دو نقطه	۱۱۳
۲۹۳	فاصله نقطه از خط	۱۱۴
۲۹۶	فاصله دو خط موازی	۱۱۵

پاسخ‌نامهٔ تشریحی

معادله و نامعادله



درس اول: معادلات گویا و معادلات رادیکالی

۲۳۴	معادلات گویا	۸۱
۲۳۶	مسائل کاربردی معادلات گویا و مستطیل طلایی	۸۲
۲۳۷	معادلات گنج	۸۳

درس دوم: نامعادلات و تعیین علامت

۲۴۰	تعیین علامت	۸۴
۲۴۱	حل نامعادله	۸۵
۲۴۳	وضعیت دو منحنی	۸۶

پاسخ‌نامهٔ تشریحی

تابع نمایی و لگاریتمی



درس اول: تابع نمایی و ویژگی‌های آن

۲۴۶	تابع نمایی	۸۷
۲۴۶	معادلات و نامعادلات تابع نمایی	۸۸
۲۴۸	نمودارهای توابع نمایی	۸۹

درس دوم: تابع لگاریتمی و ویژگی‌های آن

۲۵۲	مفهوم لگاریتم	۹۰
۲۵۳	قوانين لگاریتم	۹۱
۲۵۷	دامنه توابع لگاریتمی	۹۲
۲۵۸	نمودار تابع لگاریتمی	۹۳
۲۶۰	معادلات لگاریتمی	۹۴
۲۶۲	نامعادله لگاریتمی	۹۵
۲۶۲	حل معادلات نمایی به کمک لگاریتم	۹۶
۲۶۳	ضابطه وارون تابع نمایی و لگاریتمی	۹۷
۲۶۳	کاربرد توابع نمایی و لگاریتمی	۹۸
۲۶۴	ترکیبی‌های لگاریتم	۹۹

پاسخ‌نامهٔ تشریحی

[۴] نسبت‌های مثلثاتی

اگر انتهای کمان x در ربع اول و $\sin(\frac{3\pi}{4} - 2x) = \frac{1}{3}$ کدام است؟ ۶۳۷

$-\frac{\sqrt{2}}{9}$ (۴ ○)

$-\frac{2}{9}$ (۳ ○)

$\frac{\sqrt{2}}{9}$ (۲ ○)

$\frac{2}{9}$ (۱ ○)

اگر $x+y = \frac{5\pi}{6}$ باشد، حاصل $(\sin x + \cos y)^4 + (\sin y + \cos x)^4$ کدام است؟ ۶۳۸

۴ (۴ ○)

۳ (۳ ○)

۲ (۲ ○)

۱ (۱ ○)

اگر $\cos 2x$ باشد، مقدار $\frac{\sin \delta x}{\sin x} - \frac{\cos \delta x}{\cos x} = 1$ کدام است؟ ۶۳۹

$\frac{1}{4}$ (۴ ○)

$\frac{1}{2}$ (۳ ○)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۲ ○)

$\frac{\sqrt{15}}{4}$ (۱ ○)

اگر $\cos 4^\circ + \frac{\sin 4^\circ}{\sin 2^\circ} = A$ باشد، مقدار $\cos 5^\circ$ کدام است؟ ۶۴۰

$\frac{A}{2}$ (۴ ○)

۲A (۳ ○)

$\frac{\sqrt{3}}{A}$ (۲ ○)

\sqrt{A} (۱ ○)

(خارج)

از رابطه $\sin \delta x \cos 3x - \cos \delta x \sin 3x = \frac{1}{3}$ کدام است؟ ۶۴۱

$\frac{4}{9}$ (۴ ○)

$\frac{1}{3}$ (۳ ○)

$\frac{2}{9}$ (۲ ○)

$\frac{1}{9}$ (۱ ○)

(خارج)

اگر $\cos(\frac{\pi}{4} - \alpha) - \cos(\frac{\pi}{4} + \alpha)$ و انتهای کمان α در ربع چهارم باشد، مقدار $\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{3}$ کدام است؟ ۶۴۲

$\frac{2}{3}$ (۴ ○)

$\frac{1}{3}$ (۳ ○)

$-\frac{1}{3}$ (۲ ○)

$-\frac{2}{3}$ (۱ ○)

(ریاضی داخل)

اگر انتهای کمان α در ربع دوم دایره مثلثاتی و $\cos(\frac{11\pi}{4} + \alpha) = \frac{\sqrt{2}}{10}$ باشد، مقدار $\sin \alpha$ کدام است؟ ۶۴۳

$\frac{4}{5}$ (۴ ○)

$\frac{3}{5}$ (۳ ○)

$-\frac{3}{5}$ (۲ ○)

$-\frac{4}{5}$ (۱ ○)

اگر $\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{3}{2}$ باشد، مقدار $(\tan x \cdot \cot y)^2$ کدام است؟ ۶۴۴

$\frac{16}{25}$ (۴ ○)

$\frac{25}{16}$ (۳ ○)

۳۶ (۲ ○)

۲۵ (۱ ○)

باشد، مقدار $\frac{\cos(\alpha - 2^\circ) + \cos(\alpha + 2^\circ)}{\sin(\alpha - 2^\circ) + \sin(\alpha + 2^\circ)} = \frac{1}{2}$ کدام است؟ ۶۴۵

۰/۸ (۴ ○)

۰/۶ (۳ ○)

۰/۴ (۲ ○)

۰/۲ (۱ ○)

اگر $\sin^2 y - \cos^2 y = \cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y)\sin(x-y) = \frac{\sqrt{2}}{3}$ باشد، مقدار $\cos(x+y)\cos(x-y) + \sin(x+y)\sin(x-y)$ کدام است؟ ۶۴۶

$-\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۴ ○)

$-\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۳ ○)

$-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۲ ○)

$\frac{\sqrt{3}}{3}$ (۱ ○)

باشد، مقدار $\tan \alpha = \frac{\frac{\tan \alpha}{\sqrt{3}} + \frac{2 \cos(\frac{5\pi}{6} - \alpha)}{\sqrt{3} \cos \alpha}}{\sqrt{3}} = \frac{3+4\sqrt{3}}{3}$ کدام است؟ ۶۴۷

$1 - \sqrt{3}$ (۴ ○)

$1 + \sqrt{3}$ (۳ ○)

$\sqrt{3} - 2$ (۲ ○)

$\sqrt{3} + 2$ (۱ ○)

باشد، مقدار $\sin(x + \frac{\pi}{3})$ کدام است؟ ۶۴۸

$\frac{1}{3}$ (۴ ○)

$\frac{3}{5}$ (۳ ○)

$\frac{2}{3}$ (۲ ○)

$\frac{1}{4}$ (۱ ○)

کدام است؟ $A = \frac{3}{\sin 165^\circ} - \frac{3\sqrt{3}}{\cos 165^\circ}$ مقدار ۶۴۹

$12\sqrt{2}$ (۴ ○)

$8\sqrt{2}$ (۳ ○)

$6\sqrt{2}$ (۲ ○)

$2\sqrt{2}$ (۱ ○)

باشد، مقدار $\sin 2x$ کدام است؟ ۶۵۰

$\frac{3}{5}$ (۴ ○)

$\frac{4}{5}$ (۳ ○)

$\frac{12}{25}$ (۲ ○)

$\frac{24}{25}$ (۱ ○)

- ۶۵۱** اگر $\cos(x-y) = \frac{1}{2}$ باشد، مقدار $\cos x + \cos y$ کدام است؟ IQ
- $\frac{1}{2}$ (۴ ○) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳ ○) $\frac{3}{2}$ (۲ ○) $\frac{3}{4}$ (۱ ○)
- ۶۵۲** اگر $\sin(x+y) = \pi - 3\pi$ باشد، مقدار $\sin x + \cos y$ کدام است؟ IQ
- $\pi - 7\pi$ (۴ ○) $\pi - 2\pi$ (۳ ○) $\pi - 3\pi$ (۲ ○) $\pi - 3\pi$ (۱ ○)
- ۶۵۳** اگر $\tan x / \cos x (1 - \sin x) = \frac{1}{4}$ و $0 < x < \frac{\pi}{2}$ باشد، مقدار $\sin(\frac{\pi}{4} - 2x) + \sin(\frac{3\pi}{4} + 2x)$ کدام است؟ IQ
- $\frac{5\sqrt{2} - 22}{18}$ (۴ ○) $\frac{7\sqrt{2} - 20}{9}$ (۳ ○) $\frac{5\sqrt{2} - 20}{9}$ (۲ ○) $\frac{7\sqrt{2} - 22}{18}$ (۱ ○)
- ۶۵۴** در معادله مثلثاتی $\sin(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{3}$ اگر $\sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 3 \sin 2x = m$ باشد، مقدار m کدام است؟ IQ
- 4 (۴ ○) 3 (۳ ○) 2 (۲ ○) 1 (۱ ○)
- ۶۵۵** در معادله مثلثاتی $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ اگر $m(\cos x - \sin x) - 3\sqrt{6} \sin 2x = \sqrt{6}$ باشد، مقدار m کدام است؟ IQ
- 3 (۴ ○) 6 (۳ ○) -3 (۲ ○) -6 (۱ ○)
- ۶۵۶** اگر $f(x) = 4 \sin x \cos 2x + 2 \sin x$ باشد، مقدار $f(-\frac{41\pi}{9})$ کدام است؟ IQ
- -1 (۴ ○) 1 (۳ ○) $\sqrt{3}$ (۲ ○) $-\sqrt{3}$ (۱ ○)
- ۶۵۷** بیشترین مقدار عبارت $A = 10 + 7 \sin^2 x + 12 \sin 2x$ کدام است؟ TNT
- 58 (۴ ○) 26 (۳ ○) 29 (۲ ○) 52 (۱ ○)
- ۶۵۸** سرچ حواست هست که مجموع زوایای داخلی هر مثلث برابر 180° است؟
- در مثلث ABC اگر $\cos \hat{A} \cos \hat{B} = \frac{3}{4} \sin \hat{A} \sin \hat{B}$ باشد، زاویه C چند درجه است؟ ۶۵۸
- 60° (۴ ○) 120° (۳ ○) 135° (۲ ○) 150° (۱ ○)
- ۶۵۹** در مثلث ABC با زوایه های داخلی A ، B و C رابطه $\cos B \cos C - \sin B \sin C = 1$ برقرار است. زاویه A چند درجه است؟ شیوه ساز داخل ۱۴۰۱
- در مثلث ABC با زوایه های داخلی A ، B و C رابطه $\cos B \cos C - \sin B \sin C = 1$ برقرار است. زاویه A چند درجه است؟ ۶۵۹
- 150° (۴ ○) 60° (۳ ○) 45° (۲ ○) 30° (۱ ○)
- ۶۶۰** در مثلث ABC اگر $(\sin A + \cos B)^2 + (\sin B + \cos A)^2 = 2 + \sqrt{2}$ باشد، زاویه C چند درجه می تواند باشد؟ شیوه ساز داخل ۱۴۰۱
- 150° (۴ ○) 135° (۳ ○) 75° (۲ ○) 60° (۱ ○)
- ۶۶۱** اندازه زاویه A در مثلث ABC ، 45 درجه بیشتر از اندازه زاویه B است. حاصل $2 \cos A \sin B - \sin C$ کدام است؟ شیوه ساز داخل ۱۴۰۱
- $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۴ ○) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳ ○) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲ ○) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱ ○)
- ۶۶۲** سرچ بیریم مثلثات رو با دترمینان ترکیب کنیم!
- باشد، مقدار $\begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix} = \frac{1}{3}$ کدام است؟ ۶۶۲ IQ
- 12 (۴ ○) 9 (۳ ○) 6 (۲ ○) 3 (۱ ○)
- ۶۶۳** اگر $a + b = \frac{3\pi}{2}$ باشد، مقدار $\begin{vmatrix} \sin^2 a & \sin^2 b \\ \cos^2 a & \cos^2 b \end{vmatrix}$ کدام است؟ ۶۶۳ IQ
- $-\sin 2a$ (۴ ○) $-\cos 2a$ (۳ ○) $\cos 2a$ (۲ ○) $\sin 2a$ (۱ ○)
- ۶۶۴** سرچ حالا بیریم سراغ سؤالات مربوط به
- اگر $\tan \alpha = 3$ و $\tan \beta = 4$ باشد، مقدار $\tan(\alpha + \beta)$ کدام است؟ ۶۶۴
- $\frac{7}{13}$ (۴ ○) $\frac{1}{11}$ (۳ ○) $\frac{1}{13}$ (۲ ○) $\frac{7}{11}$ (۱ ○)
- ۶۶۵** اگر $\cot y = \frac{1}{3}$ و $\tan x = \frac{1}{4}$ باشد، مقدار $\tan(2x + y)$ کدام است؟ ۶۶۵
- $-\frac{47}{9}$ (۴ ○) $-\frac{53}{9}$ (۳ ○) $-\frac{41}{9}$ (۲ ○) $-\frac{37}{9}$ (۱ ○)
- ۶۶۶** اگر $\sin 2x$ باشد، مقدار $\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{5}{2}$ کدام است؟ ۶۶۶
- $\frac{29}{21}$ (۴ ○) $\frac{59}{42}$ (۳ ○) $\frac{42}{59}$ (۲ ○) $\frac{21}{29}$ (۱ ○)

اگر $\tan(\alpha - \beta) \cdot \tan(\alpha + \beta) = 1$ باشد، مقدار $\tan^2 \alpha$ کدام است؟ ۶۶۷

$\frac{1}{4}(4)$

$\frac{1}{3}(3)$

$\frac{1}{2}(2)$

$\frac{1}{1}(1)$

اگر $\tan\left(\frac{\pi}{\lambda} - \alpha\right) = \frac{3}{2}$ باشد، مقدار $\tan\left(\frac{\pi}{\lambda} + \alpha\right)$ کدام است؟ ۶۶۸

$-\frac{1}{3}(4)$

$\frac{1}{3}(3)$

$-\frac{1}{5}(2)$

$\frac{1}{5}(1)$

اگر $\cot(2x - 2y) = 4$ و $\tan(x + 2y) = 2$ باشد، حاصل $\tan^3 x$ کدام است؟ ۶۶۹

$-\frac{3}{5\sqrt{2}}(4)$

$\frac{3}{2\sqrt{2}}(3)$

$-\frac{7}{6}(2)$

$-\frac{5}{11}(1)$

اگر $(\cos A + \cos B)^2 + (\sin A + \sin B)^2 = 3$ باشد، مقدار $\tan^2(A - B)$ کدام است؟ ۶۷۰

$5(4)$

$4(3)$

$3(2)$

$2(1)$

اگر $\sin y \cos x = \frac{3}{10}$ و $\sin x \cos y = \frac{1}{5}$ باشد، مقدار مثبت $\tan(x + y)$ کدام است؟ ۶۷۱

$\frac{1}{2}(4)$

$\sqrt{3}(3)$

$\frac{\sqrt{3}}{2}(2)$

$\frac{\sqrt{3}}{3}(1)$

اگر $\tan 2x - \tan x = \frac{1}{1 + \tan x \tan 2x}$ باشد، مقدار $\tan 2x$ کدام است؟ ۶۷۲

$\frac{5}{3}(4)$

$\frac{4}{3}(3)$

$\frac{2}{3}(2)$

$\frac{1}{3}(1)$

در مثلث ABC اگر $\cot B = \frac{1}{2}$ و $\cos A = \frac{3}{5}$ باشد، مقدار $\tan C$ کدام است؟ ۶۷۳

$3(4)$

$\frac{5}{3}(3)$

$2(2)$

$\frac{3}{2}(1)$

مقدار $\frac{\tan^2 27^\circ - \tan^2 18^\circ}{1 - \tan^2 27^\circ \tan^2 18^\circ}$ کدام است؟ ۶۷۴

$\tan 12^\circ(4)$

$\tan 8^\circ(3)$

$\tan 9^\circ(2)$

$\tan 2^\circ \tan 9^\circ(1)$

اگر $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ و انتهای کمان α در ربع چهارم باشد، حاصل $\frac{\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) + \tan(\alpha - \frac{\pi}{4})}{1 - \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) \tan(\alpha - \frac{\pi}{4})}$ کدام است؟ ۶۷۵

$2\sqrt{2}(4)$

$-\frac{2}{3}\sqrt{2}(3)$

$\frac{2}{3}\sqrt{2}(2)$

$-2\sqrt{2}(1)$

اگر $\tan x = \frac{y - \tan y}{1 + 2\tan y}$ باشد، مقدار $\tan(x + y)$ کدام است؟ ۶۷۶

$\frac{1}{3}(4)$

$3(3)$

$\frac{1}{2}(2)$

$2(1)$

حاصل $\frac{1 - \tan(\frac{\pi}{6} + x) \cdot \tan(\frac{\pi}{6} - x)}{\tan(\frac{\pi}{6} + x) + \tan(\frac{\pi}{6} - x)}$ کدام است؟ ۶۷۷

$\sqrt{3}(4)$

$\frac{\sqrt{3}}{3}(3)$

$2\sqrt{3}(2)$

$\frac{\sqrt{3}}{6}(1)$

در مثلث ABC اگر $\tan B = 3$ و $\tan A = \frac{2}{3}$ باشد، مقدار $\cot C$ کدام است؟ ۶۷۸

$\frac{11}{3}(4)$

$-\frac{3}{11}(3)$

$\frac{3}{11}(2)$

$-\frac{11}{3}(1)$

اگر $\tan 35^\circ - \cot 8^\circ = \frac{1}{a}$ باشد، مقدار $\tan 155^\circ$ کدام است؟ ۶۷۹

$-\frac{1}{a}(4)$

$a(3)$

$\frac{1}{a}(2)$

$a^2(1)$

اگر $\tan \alpha + \tan \beta = \frac{a}{2}$ و $\cot \alpha + \cot \beta = \frac{a}{2}$ باشد، مقدار $\cot(\alpha + \beta)$ کدام است؟ ۶۸۰

$\frac{13}{15}(4)$

$\frac{11}{15}(3)$

$\frac{1}{11}(2)$

$\frac{9}{11}(1)$

اگر $\sin y = \sin(2x + y)$ و $\tan x = 6$ باشد، مقدار $\cot(x + y)$ کدام است؟ ۶۸۱

$5(4)$

$0/3(3)$

$1/0(2)$

$0/1(1)$

- اگر $\tan(x+y) = 3$ و $\sin(x+y) = \frac{3}{5}$ باشد، مقدار $\tan x \tan y$ کدام است؟ ۶۸۴
- ۱ - $\sqrt{3}$ (۴ ○)
-۲ $\sqrt{2}$ (۳ ○)
-۳ (۲ ○)
-۲ $\sqrt{3}$ - $\sqrt{2}$ (۱ ○)
- اگر $\cot\beta = 3\tan\alpha$ و $\tan\alpha = 4 + \tan\beta$ باشد، مقدار $\cot\alpha$ کدام است؟ ۶۸۵
- ۶ (۴ ○)
۵ (۳ ○)
۳ (۲ ○)
۲ (۱ ○)
- اگر x زاویه‌ای در ربع اول باشد، مقدار $\tan(\frac{3x}{4})$ کدام است؟ ۶۸۶
- $\frac{2}{9}$ (۴ ○)
- $\frac{2}{11}$ (۳ ○)
 $\frac{9}{2}$ (۲ ○)
 $\frac{11}{2}$ (۱ ○)


- (شیوه‌ساز ریاضی ۹۹) اگر $\cot\beta$ و $\cot\alpha$ ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - 2x - 2 = 0$ باشد، مقدار $\tan(\alpha+\beta)$ کدام است؟ ۶۸۷
- $\frac{4}{\sqrt{3}}$ (۴ ○)
- $\frac{3}{4}$ (۳ ○)
 $\frac{2}{5}$ (۲ ○)
 $-\frac{2}{3}$ (۱ ○)
- مقدار $(1 + \tan A^\circ)(1 + \tan 37^\circ)$ کدام است؟ ۶۸۸
- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ (۴ ○)
۲ (۳ ○)
 $2\sqrt{2}$ (۲ ○)
 $1 + \sqrt{3}$ (۱ ○)
- اگر $\frac{\tan\alpha}{\tan(\alpha+\beta)}$ باشد، آن‌گاه حاصل $\frac{\sin(2\alpha+\beta)}{\sin\beta} = a$ کدام است؟ ۶۸۹
- $\frac{1+a}{1-a}$ (۴ ○)
 $\frac{1-a}{1+a}$ (۳ ○)
 $\frac{a-1}{a+1}$ (۲ ○)
 $\frac{a+1}{a-1}$ (۱ ○)

در تابع با ضابطه $f(x) = \frac{1}{1 + \tan x}$ طول و عرض تمام نقاط را برابر می‌کنیم، سپس نمودار حاصل را واحد در راستای محور y به پایین منتقل می‌کنیم. ضابطه تابع حاصل کدام است؟ ۶۸۸

- $\tan(\frac{\pi-x}{4})$ (۴ ○)
 $y = \tan(\frac{\pi-2x}{4})$ (۳ ○)
 $\tan(\frac{x-\pi}{4})$ (۲ ○)
 $y = \tan(\frac{2x-\pi}{4})$ (۱ ○)
- اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - 2kx + k - 1 = 0$ باشند و $x_1 + x_2 = \frac{3\pi}{4}$ باشد، مقدار k کدام است؟ ۶۸۹
- ۲ (۴ ○)
-۱ (۳ ○)
۲ (۲ ○)
۱ (۱ ○)

سرچ حلا و قوشة نسبت‌های مثلثاتی $\alpha \pm \beta$ را توی دایره مثلثاتی یا در شکل‌های هندسی بینیم.

- در شکل مقابل، دو نقطه $A(-\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ و $B(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ روی دایره مثلثاتی هستند. مقدار $\sin\theta$ کدام است؟ ۶۹۰



$$\frac{2}{3} (2 ○)$$

$$\frac{1}{3} (4 ○)$$

- با توجه به دایره مثلثاتی مقابل، اگر $BT = 2$ باشد، مقدار $\tan(T \hat{O} B)$ کدام است؟ ۶۹۱



$$\frac{1}{4} (1 ○)$$

$$\frac{1}{3} (2 ○)$$

$$\frac{1}{2} (3 ○)$$

$$\frac{2}{3} (4 ○)$$

- در مثلث مقابل؛ اگر $\tan\theta = \frac{3}{14}$ باشد، اندازه x کدام است؟ ۶۹۲



$$1 (1 ○)$$

$$1/5 (2 ○)$$

$$3 (3 ○)$$

$$2\sqrt{2} (4 ○)$$

- در مربع مقابل؛ اگر $3BF = 2CF$ و $EC = 2DE$ است. مقدار $\tan\alpha$ کدام است؟ ۶۹۳




$$\frac{15}{13} (2 ○)$$

$$\frac{13}{11} (4 ○)$$

$$\frac{12}{13} (1 ○)$$

$$\frac{11}{10} (3 ○)$$

در شکل مقابل مُقابِل $\triangle ABC$ است. $\angle A = 12^\circ$ و $CH = 5$ و $BH = 16$ و $\tan \theta$ کدام است؟ ۶۹۴




$$-\frac{56}{13} (2)$$

$$-\frac{63}{25} (1)$$

$$-\frac{56}{9} (4)$$

$$-\frac{63}{16} (3)$$

در مثلث مقابل $\triangle ABC$ است. $|AC| = 2 |CD| = 3 |BD|$ و $\tan \alpha$ کدام است؟ ۶۹۵




$$\frac{1}{3} (2)$$

$$\frac{1}{2} (1)$$

$$\frac{1}{4} (4)$$

$$\frac{1}{5} (3)$$

شکل مقابل از تعدادی مربع با ضلع یک واحد تشکیل شده است. $\tan \alpha$ کدام است؟ ۶۹۶




$$\frac{5}{8} (2)$$

$$\frac{3}{28} (1)$$

$$\frac{13}{16} (4)$$

$$\frac{11}{15} (3)$$

در شکل مقابل $A(-5, 12)$ و $B(4, 3)$ است. $\cos \theta$ کدام است؟ ۶۹۷




$$\frac{6}{19} (2)$$

$$\frac{8}{35} (1)$$

$$\frac{16}{65} (4)$$

$$\frac{2}{51} (3)$$

مطابق شکل، سه مربع با اضلاع ۳، ۴ و ۶ کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. $\tan(\widehat{FM}A)$ کدام است؟ ۶۹۸




$$-\frac{13}{9} (1)$$

$$13 (2)$$

$$14 (3)$$

$$-\frac{14}{9} (4)$$

با توجه به دو خط d_1 و d_2 ، $\cot \theta$ کدام است؟ ۶۹۹




$$-0/3 (1)$$

$$-0/2 (2)$$

$$-0/25 (3)$$

$$-0/75 (4)$$

در مثلث قائم الزاویه $\triangle ABC$ باشد، $EF = \sqrt{6}$ و $DF = \sqrt{3}$ و $BE = 2\sqrt{2}$ و $BD = 1$ اگر $\tan \alpha$ کدام است؟ ۷۰۰ TNT*




مقدار $\tan \alpha$ کدام است؟

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} (1)$$

$$\sqrt{3} (3)$$

در مثلث قائم الزاویه مقابل، ضلع $AG = 4$ و $AB = 6$ قسمت مساوی تقسیم شده است. اگر $\frac{\tan(\alpha_5)}{\tan(\alpha_1)}$ کدام است؟ ۷۰۱ TNT*



$$\frac{\tan(\alpha_5)}{\tan(\alpha_1)} \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{3}{4} (2)$$

$$\frac{6}{7} (1)$$

$$\frac{4}{9} (4)$$

$$\frac{4}{5} (3)$$

مسارخ حالا وقتی شه بریم سراغ روابط بین ریشه‌ها. در ابتداء روابط متقابله مثل $\alpha^r + \beta^r$ یا $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ یا ... را بررسی می‌کنیم.

اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $= -2x^2 - 4x = 0$ باشند، کدام گزینه نادرست است؟ 1961

$$\frac{\alpha + \beta}{\beta} = -3 \quad (4) \quad \alpha^3 + \beta^3 = 28 \quad (3) \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = -\frac{1}{2} \quad (2) \quad \alpha^2 + \beta^2 = 12 \quad (1)$$

اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - (m-2)x + 2m = 0$ باشند و مجموع ریشه‌ها برابر با ۱۰ باشد، حاصل $\alpha^3 + \beta^3$ کدام است؟ 1962

$$28 = 0 \quad (4) \quad 24 = 0 \quad (3) \quad 32 = 0 \quad (2) \quad 22 = 0 \quad (1)$$

(شیوه‌ساز داخل ۹۳) در معادله درجه دوم $= mx^2 - mx + m + 4 = 0$ اگر مجموع مربعات ریشه‌ها برابر ۷ باشد، مقدار m کدام است؟ 1963

$$-3 = 0 \quad (4) \quad -5 = 3 \quad (3) \quad 3 = 2 \quad (2) \quad -3 = 5 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $= 5x^2 - 5x + k = 0$ باشند و رابطه $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 3$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار k کدام است؟ 1964

$$5 = 4 \quad (4) \quad 3 = 3 \quad (3) \quad -4 = 2 \quad (2) \quad -6 = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - x - a = 0$ باشند، به ازای کدام مقدار a رابطه $\frac{x_1^3 + x_2^3}{x_1^2 + x_2^2} = \frac{4}{3}$ بین ریشه‌ها برقرار است؟ 1965

$$\frac{1}{5} = 4 \quad (4) \quad \frac{1}{3} = 3 \quad (3) \quad \frac{1}{2} = 2 \quad (2) \quad 1 = 1 \quad (1)$$

اگر a و b ریشه‌های معادله درجه دوم $= 5a^2 + 26ab + 5b^2 = 112$ باشند و رابطه $x^2 - 4x + 3m - 10 = 0$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار m کدام است؟ 1966

$$7 = 4 \quad (4) \quad 4 = 3 \quad (3) \quad 3 = 2 \quad (2) \quad 1 = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $= 5x^2 - 5x + m = 0$ باشند و مساحت مستطیلی با اضلاع $x_1 + m$ و $x_2 + m$ برابر ۱۶ باشد، مقدار m کدام است؟ 1967

$$-8 = 2 \quad (4) \quad 2 = 3 \quad (3) \quad 6 = 2 \quad (2) \quad 7 = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $= 3x^2 - 5x - 3 = 0$ باشند، مقدار $\frac{1}{3x_1 + 2} + \frac{1}{3x_2 + 2}$ کدام است؟ 1968

$$\frac{19}{7} = 4 \quad (4) \quad \frac{19}{11} = 3 \quad (3) \quad \frac{15}{11} = 2 \quad (2) \quad \frac{15}{7} = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $= \frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} = \frac{7}{12}$ باشند و رابطه $(m+1)x + m + 2 = 0$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار m کدام است؟ 1969

$$6 = 4 \quad (4) \quad 4 = 3 \quad (3) \quad -4 = 2 \quad (2) \quad -6 = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $= \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 1$ باشند و رابطه $(m-3)x + 2m - 13 = 0$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مجموع مقادیر طبیعی m کدام است؟ 1970

$$38 = 4 \quad (4) \quad 24 = 3 \quad (3) \quad 32 = 2 \quad (2) \quad 28 = 1 \quad (1)$$

(شیوه‌ساز داخل ۹۶) اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $= \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = 5$ و $x^2 - (5m-1)x + 9 = 0$ باشد، مقدار m کدام است؟ 1971

$$4 = 4 \quad (4) \quad 3 = 3 \quad (3) \quad 2 = 2 \quad (2) \quad 1 = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $= x^2 - 3x + 1 = 0$ باشند، حاصل $x_1\sqrt{x_2} + x_2\sqrt{x_1}$ کدام است؟ 1972

$$3 = 4 \quad (4) \quad \sqrt{3} = 3 \quad (3) \quad 5 = 2 \quad (2) \quad \sqrt{5} = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $= 2x^2 - 5x - 1 = 0$ باشند، مقدار $(x_1^2 + \frac{1}{x_1})(x_2^2 + \frac{1}{x_2})$ کدام است؟ 1973

$$-\frac{5}{4} = 4 \quad (4) \quad \frac{5}{4} = 3 \quad (3) \quad -\frac{3}{4} = 2 \quad (2) \quad \frac{3}{4} = 1 \quad (1)$$

x_1 و x_2 ریشه‌های متمایز معادله درجه دوم $= \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = x_2^2 - x_1^2 - 2x^2 - 5ax - 8 = 0$ هستند. اگر $\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = 2x^2 - 5ax - 8$ باشد، مقدار a کدام است؟ 1974

$$-\frac{7}{11} = 4 \quad (4) \quad -\frac{1}{10} = 3 \quad (3) \quad -\frac{4}{5} = 2 \quad (2) \quad -\frac{1}{5} = 1 \quad (1)$$

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - ax + b = 0$ باشند و رابطه $\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = \frac{1}{c}$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مجموع ریشه‌ها کدام است؟

±1 (4)

±6 (3)

±4 (2)

±2 (1)

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - mx + n = 0$ باشند و رابطه $x_1 x_2 + x_1 + x_2 = 10$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار m کدام است؟

3 -4 (4)

12 (3)

-1 ± √11 (2)

-4 (1)

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $2x^2 - 6x - 1 = 0$ باشند، مقدار $4x_1^2 x_2 + 4x_1 x_2^2 + 6x_1 + 6x_2$ کدام است؟

16 (4)

14 (3)

12 (2)

10 (1)

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - (a+2)x + 3 = 0$ باشند و رابطه $x_1^2 x_2^3 + 3x_1^3 x_2 = 81$ بین آن‌ها برقرار باشد، مقدار a کدام است؟

7 (4)

6 (3)

5 (2)

11 (1)

اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - x + m = 0$ باشند و رابطه $\frac{\alpha}{\beta-1} + \frac{\beta}{\alpha-1} = -2$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، بیشترین مقدار m کدام است؟

3 (4)

2 (3)

1/2 (2)

1/2 (1)

چه تعداد معادله درجه دوم به صورت $x^2 + ax + b = 0$ وجود دارد که در آن $a + b = 3$ و معادله دارای ریشه‌های صحیح متمایز باشد؟ (شیوه‌ساز داخل ۱۴۰۰)

6 (4)

4 (3)

2 (2)

11 (1)

سرخ بعضی وقت‌ها، طراح یک ارتباط بین ریشه‌های معادله مطرح می‌کنه، مثلًا می‌گه یکی از ریشه‌ها، دو برابر ریشه دیگر است. توی این سوالاً می‌تونیم سراغ جمع و ضرب ریشه‌ها بریم و ریشه‌ها رو پیدا کنیم.

اگر ریشه‌های معادله درجه دوم $(a+5)x^2 + (4a+3)x + 2a + 1 = 0$ معکوس یکدیگر باشند، مقدار a کدام است؟

6 (4)

5 (3)

4 (2)

3 (1)

معادله درجه دوم $3x^2 + (2m-1)x + 2 - m = 0$ دارای دو ریشه حقیقی است. اگر مجموع ریشه‌ها با معکوس حاصل ضرب آن دو ریشه برابر باشد، مقدار m کدام است؟ (داخل ۹۹)

-5/2 (4)

-1 (3)

3 (2)

7/2 (1)

به ازای دو مقدار a یک ریشه معادله $3x^2 - ax + 4 = 0$ سه برابر ریشه دیگر است. اختلاف این دو مقدار a کدام است؟ (داخل ۱۴۰۱)

18 (4)

16 (3)

9 (2)

8 (1)

اگر α و β ریشه‌های معادله $ax^2 - 8x + 4 = 0$ هستند. اگر مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله‌ای با ریشه‌های α^2 و β^2 ، $\alpha\beta$ و $\alpha^2\beta^2$ برابر باشند، مقدار a کدام است؟ (نوبت اول ۱۴۰۲)

4 (4)

3 (3)

2 (2)

11 (1)

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $-12x + 2m - 6 = 0$ باشند و رابطه $x_1 - x_2 = 6$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار m کدام است؟ (شیوه‌ساز داخل ۹۲)

25 (4)

22 (3)

21 (2)

18 (1)

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $3x_1 = -8x_2 + (2k-3)x - 12 = 0$ باشند و رابطه $3x_1 = -8x_2$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار طبیعی k کدام است؟

4 (4)

3 (3)

2 (2)

11 (1)

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 + (a-2)x + 16 = 0$ باشند، مقدار a کدام است؟

-12 (4)

8 (3)

12 (2)

-8 (1)

سرخ بعضی وقت‌یاری ریشه‌های معادله درجه دوم، به همراه یک عدد دیگه، دنباله حسابی یا هندسی می‌سازن.

اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 + 2(a+1)x + 2a - 1 = 0$ باشند، به ازای کدام مقدار a به ترتیب سه عدد α و β تشکیل دنباله هندسی می‌دهند؟ (خارج ۱۴۰۱)

1 (4)

-1 (3)

2 (2)

-2 (1)

به ازای کدام مقدار m ، عدد $\frac{1}{\lambda}$ واسطه حسابی بین دو ریشه حقیقی معادله $(m^2 - 4)x^2 - 3x + m = 0$ است؟

-4 (4)

4 (3)

-3 (2)

-4 و 4 (1)

۱۹۸۸ در معادله درجه دوم $mx^2 - (m+1)x + 1 = 0$ اگر واسطه حسابی بین ریشه‌ها برابر با واسطه هندسی بین آن‌ها باشد، مقدار m کدام است؟

- ۲ (۴) ○ -۱ (۳) ○ ۲ (۲) ○ ۱ (۱) ○

۱۹۸۹ ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 + 2x + A = 0$ هستند و x_1, x_2, x_3, x_4 ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - 14x + B = 0$ هستند. اگر

چهار جمله اول یک دنباله حسابی باشد، مقدار $\frac{B}{A}$ کدام است؟

- ۱۵ (۴) ○ ۱۲ (۳) ○ -۱۲ (۲) ○ -۱۵ (۱) ○

میرخ همیشه یادتون باش: ریشه هر معادله در آن معادله صدق می‌کنه. این جمله خیلی کاربردیه.

۱۹۹۰ اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - (m-1)x + 4 = 0$ باشند و رابطه $\sqrt{x_1} + \frac{2}{\sqrt{x_2}} = 2$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار m کدام است؟

- ۵ (۴) ○ ۶ (۳) ○ ۳ (۲) ○ ۲ (۱) ○

۱۹۹۱ ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 + 7x - m + 2 = 0$ بین ریشه‌ها برقرار است. مقدار m کدام است؟

- ۱۰ (۴) ○ -۸ (۳) ○ ۴ (۲) ○ ۲ (۱) ○

۱۹۹۲ ریشه‌های معادله درجه دوم $(a+1)x^2 + 2x + a = 0$ هستند و $x_1 + x_1 x_2 = -\frac{1}{a+1}$ است. مقدار a چقدر است؟

- $\frac{1}{2}$ (۴) ○ $-\frac{1}{2}$ (۳) ○ $\frac{3}{2}$ (۲) ○ $-\frac{3}{2}$ (۱) ○

۱۹۹۳ اگر α و β ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 + 3x - 5 = 0$ باشند، مقدار $\sqrt{\alpha^2(\delta-3\beta)}$ کدام است؟

- ۹ (۴) ○ ۵ (۳) ○ ۴ (۲) ○ ۲ (۱) ○

۱۹۹۴ اگر a و b ریشه‌های معادله $x^2 - 5x - 3 = 0$ باشند، مقدار عبارت $(a-2)(a-3) + (b-1)(b-4)$ کدام است؟

- ۲۰ (۴) ○ ۱۶ (۳) ○ ۱۲ (۲) ○ ۸ (۱) ○

۱۹۹۵ اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - 4x + 2 = 0$ باشند، مقدار $(x_1 + \frac{2}{x_1})^2 + x_2^2 + \frac{4}{x_2^2}$ کدام است؟

- ۳۰ (۴) ○ ۲۸ (۳) ○ ۱۶ (۲) ○ ۱۲ (۱) ○

۱۹۹۶ اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $(x_1^2 - 4x_1 + 4)(x_2^2 - 4x_2 + 4) = 0$ باشند، حاصل عبارت $x_1^2 - 4x_1 + 1 = x_2^2 - 4x_2 + 1$ کدام است؟

- ۱۸۵ (۴) ○ -۱۸۳ (۳) ○ -۱۸۰ (۲) ○ -۱۷۴ (۱) ○

۱۹۹۷ اگر یکی از ریشه‌های معادله $x^2 - x - 1 = 0$ برابر a باشد، مقدار $\frac{6a+4}{a^3}$ کدام است؟

- ۴ (۴) ○ $2\sqrt{2}$ (۳) ○ ۲ (۲) ○ $\sqrt{2}$ (۱) ○

۱۹۹۸ اگر a یکی از ریشه‌های معادله $x^2 + mx - 2 = 0$ باشد و $a^2 + \frac{4}{a^2} = 20$ باشد، مقدار m کدام می‌تواند باشد؟

- ۴ (۴) ○ ۳ (۳) ○ ۲ (۲) ○ -۲ (۱) ○

میرخ در تست‌های زیر ضرایب معادله با کمک ریشه‌های معادله نوشته شدن. در این سوالات باید به جمع و ضرب ریشه‌ها توجه کنید.

۱۹۹۹ اگر a و b ریشه‌های معادله $x^2 - (2a+b-2)x + b - 2 = 0$ باشند، مقدار $a^3 + b^2$ کدام است؟

- ۴ (۴) ○ ۴ (۳) ○ -۱۲ (۲) ○ ۱۲ (۱) ○

۲۰۰۰ اگر a و b ریشه‌های معادله $2x^2 - 10x + a^2 + b^2 = 0$ باشند، کدام گزینه در مورد ریشه‌های این معادله درست است؟

- (۱) دارای دو ریشه متمایز مثبت (۲) دارای دو ریشه متمایز منفی

- (۳) دارای دو ریشه یکسان مثبت (۴) دارای دو ریشه یکسان منفی

۲۰۰۱ اعداد صحیح m و n را در نظر بگیرید اگر ریشه‌های معادله درجه دوم $(m-2n)x^2 + 5n + 2 = 0$ برابر $m+n$ و $m-n$ باشد، مقدار

کدام است؟

- ۴ (۴) ○ -۲ (۳) ○ ۲ (۲) ○ ۴ (۱) ○

۲۰۰۲ اگر a و b اعداد طبیعی و ریشه‌های معادله $x^2 - (a^2 + b^2 - 12)x + a + b - 1 = 0$ باشند، مقدار $a + b$ کدام است؟

- ۱۲ (۴) ○ ۹ (۳) ○ ۵ (۲) ○ ۲ (۱) ○

سرچ در تست‌های زیر، دو معادله درجه دوم دارای ریشه مشترک هستند. در این سؤالات، به جمع و ضرب ریشه‌ها توجه کنید.

اگر دو معادله درجه دوم $(m-2)x^2 + 2x - 3 = 0$ و $mx + n = 0$ دارای ریشه‌های یکسان باشند، مقدار $m-n$ کدام است؟ ۲۰۰۴

-۵ (۴) ○

۱۲ (۳) ○

-۵ (۲) ○

۱۰ (۱) ○

معادله‌های $x^2 + 2x - 3m = 0$ و $x^2 + 6x + m = 0$ یک ریشه مشترک غیر صفر دارند. اختلاف ریشه‌های غیرمشترک کدام است؟ ۲۰۰۵

(ریاضی نوبت اول ۱۴۰۲)

۷ (۴) ○

۴ (۳) ○

۳ (۲) ○

۲ (۱) ○

یکی از ریشه‌های معادله $(a+1)x - 3 - b = 0$ برابر ۳ و یکی از ریشه‌های معادله $x^2 + ax + c = 0$ برابر -۲ است. اگر ریشه دیگر این دو معادله مشترک باشد، مقدار $c + \log_a(1-b)$ کدام است؟ ۲۰۰۶

$\frac{2}{3}$ (۴) ○

۲ (۳) ○

$\frac{3}{2}$ (۲) ○

۱ (۱) ○

معادله‌های درجه دوم $x^2 - 2x + m + 15 = 0$ و $x^2 - 7x + m = 0$ دارای یک ریشه مشترک هستند. مقدار m کدام است؟ ۲۰۰۶

-۳ (۴) ○

۳ (۳) ○

۴ (۲) ○

-۴ (۱) ○

سرچ در بعضی سؤالات، باید رابطه داده شده بین ریشه‌ها را دسته‌بندی کنیم تا به یک رابطه، برسی پ و P و ... برسیم.

اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 + x - 3 = 0$ باشند، مقدار $\alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta^3$ کدام است؟ ۲۰۰۷

-۶ (۴) ○

۱۲ (۳) ○

۶ (۲) ○

-۱۲ (۱) ○

اگر a و b ریشه‌های معادله $x^3 + 4x - 3m - 1 = 0$ باشند و رابطه $a^2 + 5a + b = 12$ بین ریشه‌ها برقرار باشد، مقدار m کدام است؟ ۲۰۰۸

۷ (۴) ○

۵ (۳) ○

۴ (۲) ○

۲ (۱) ○

اگر α و β ریشه‌های متمایز معادله $x^2 + x - 3 = 0$ باشند، مقدار $2\alpha^2 + \beta^2 + \alpha$ کدام است؟ ۲۰۰۹

۱۵ (۴) ○

۱۲ (۳) ○

۱۰ (۲) ○

۸ (۱) ○

اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - a = 0$ باشند، مقدار a چند برابر ریشه بزرگ‌تر معادله است؟ ۲۰۱۰

(ریاضی خارج ۱۴۰۲)

۹ (۳) ○

-۳ (۲) ○

۳ (۱) ○

سرچ معمولاً وقتی طراح، ریشه‌هارا مقایسه می‌کند، و یک رابطه‌ای بین ریشه‌هارا می‌پرسد، نیم‌نگاهی به محاسبه هر یک از ریشه‌ها داشته باشید.

اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 + 8x - 3 = 0$ باشند، حاصل $|\alpha + 2\beta| + |\alpha| - |\beta - 4|$ کدام است؟ ۲۰۱۱

$-\sqrt{19}$ (۴) ○

$\sqrt{19}$ (۳) ○

$-\sqrt{61}$ (۲) ○

$\sqrt{61}$ (۱) ○

اگر α و β ریشه‌های معادله $\alpha^2 + \alpha^3 + \beta^3 = 98 - 4\sqrt{6}$ هستند. اگر $\alpha < 0 < \beta$ و $\alpha < 0 < \beta$ باشد، مقدار a چقدر است؟ ۲۰۱۲

-۲/۵ (۴) ○

-۲ (۳) ○

-۱/۵ (۲) ○

-۱ (۱) ○

اگر α و β ریشه‌های معادله $3\alpha^2 + 2\beta^2 = 12\sqrt{2} + 85$ باشند. اگر $0 < \beta < \alpha$ و $\alpha < 0 < \beta$ باشد، مقدار a چقدر است؟ ۲۰۱۳

(ریاضی داخل ۱۴۰۱)

$\frac{21}{5}$ (۴) ○

$\frac{13}{4}$ (۳) ○

۲ (۲) ○

۱ (۱) ○

علامت ریشه‌ها

سرچ تست‌های زیر در مورد تعیین علامت ریشه‌هاست. برای این‌که علامت ریشه‌ها را تعیین کنیم، باید علامت S و P رو پیدا کنیم. حواس‌تون باش و وقتی معادله درجه دوم، ۲ ریشه حقیقی متمایز دارد، باید $\Delta > 0$ باشد.

معادله درجه دوم $2x^2 + mx + m + 6 = 0$ دارای دو ریشه متمایز مثبت است، بازه مقدایر m کدام است؟ ۲۰۱۴

(خارج ۹۹)

(-۶, -۴) ○

(-۶, ۰) (۳) ○

(-۴, -۲) (۲) ○

(-۴, ۰) (۱) ○

اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - 2mx + 2 + m = 0$ باشند، به ازای کدام مقدایر m رابطه $x_1 < x_2$ برقرار است؟ ۲۰۱۵

$m > 2$ (۴) ○

$-2 < m < 0$ (۳) ○

$m < -1$ (۲) ○

$-2 < m < -1$ (۱) ○

به ازای کدام مقدایر m معادله درجه دوم $x^2 - 2(m-1)x + m+1 = 0$ دو ریشه حقیقی متمایز هم‌علامت است؟ ۲۰۱۶

(-۱, ۰) \cup (۳, ۵) (۴) ○

(-۱, ۰) \cup (۳, $+\infty$) (۳) ○

(۳, $+\infty$) (۲) ○

($-\infty$, ۰) \cup (۳, $+\infty$) (۱) ○

- ۲۰۱۷** به ازای چند مقدار صحیح m ، معادله درجه دوم $(m-1)x^2 + mx + m^2 - 4 = 0$ دارای یک ریشه حقیقی مثبت و یک ریشه حقیقی منفی است؟
- ۱) شمار ۴ ○ ۲) $x < 3$ ○ ۳) $x > 2$ ○ ۴) $x < 1$ ○

- ۲۰۱۸** اگر a یک عدد حقیقی منفی باشد، کدام عبارت در مورد معادله $x^2 - (2a+3)x + a - 2 = 0$ درست است؟
- ۱) دو ریشه مثبت متمایز دارد. ۲) دو ریشه یکسان دارد.
۳) یک ریشه مثبت و یک ریشه منفی دارد. ۴) فاقد ریشه حقیقی است.

- ۲۰۱۹** اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $mx^2 + (m-1)x + m - 3 = 0$ باشند به طوری که $x_2 < 0 < x_1$ و $|x_2| < m < |x_1|$ محدوده m کدام است؟
- ۱) $m < 3$ ○ ۲) $1 < m < 3$ ○ ۳) $m < 1$ یا $m > 3$ ○ ۴) $0 < m < 3$ ○

نوشتن معادله درجه دوم

- ۲۰۲۰** اندازه طول مستطیلی که محیط آن ۲۲ سانتی‌متر و مساحت آن ۲۸ سانتی‌متر مریع است، کدام است؟

- ۱) 4 ○ ۲) 3 ○ ۳) 2 ○ ۴) 1 ○

- ۲۰۲۱** ریشه‌های کدام یک از معادله‌های زیر عکس و قرینه ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 1 = 0$ است؟

- $-x^2 + 2x + 3 = 0$ ○ $3x^2 + 2x - 1 = 0$ ○ $x^2 - 2x + 3 = 0$ ○ $3x^2 + 2x + 1 = 0$ ○

- ۲۰۲۲** اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 4 = 0$ باشند، ریشه‌های کدام معادله به صورت $\{\alpha^2 + \beta^2, \alpha\beta\}$ است؟

- $x^2 - 6x + 3 = 0$ ○ $x^2 - 8x - 48 = 0$ ○ $x^2 - 6x - 48 = 0$ ○ $x^2 - 8x - 24 = 0$ ○

- ۲۰۲۳** در کدام معادله زیر، رابطه $5(x_1 + 4)(x_2 + 4) = 25$ و $3(x_1 + x_2) + x_1 x_2 = 5$ بین ریشه‌ها برقرار است؟

- $x^2 - 4x + 2 = 0$ ○ $x^2 - 4x - 7 = 0$ ○ $x^2 - 3x + 2 = 0$ ○ $x^2 - 2x - 1 = 0$ ○

- ۲۰۲۴** ریشه‌های کدام معادله از معکوس ریشه‌های معادله درجه دوم $x^2 - 3x - 1 = 0$ یک واحد کمتر است؟

- $x^2 + 5x + 2 = 0$ ○ $x^2 - 5x + 2 = 0$ ○ $x^2 + 3x + 1 = 0$ ○ $x^2 - 3x + 1 = 0$ ○

- ۲۰۲۵** اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - 4x + 1 = 0$ باشند، ریشه‌های کدام معادله به صورت $\{\alpha + \frac{1}{\beta}, \beta + \frac{1}{\alpha}\}$ است؟

- $x^2 - 12x - 5 = 0$ ○ $x^2 - 12x + 9 = 0$ ○ $x^2 - 9x - 5 = 0$ ○ $x^2 - 8x + 6 = 0$ ○

- ۲۰۲۶** اگر x_1 و x_2 ریشه‌های معادله درجه دوم $2x^2 - (7m-1)x + 4m - 2 = 0$ باشند و واسطه حسابی بین ریشه‌های آن برابر با ۵ باشد،

- ریشه‌های کدام معادله به صورت $\{\frac{1}{x_1} + 1, \frac{1}{x_2} + 1\}$ است؟

- $5x^2 + 20x + 16 = 0$ ○ $5x^2 + 20x - 16 = 0$ ○ $5x^2 - 20x - 16 = 0$ ○ $5x^2 - 20x + 16 = 0$ ○

- ۲۰۲۷** ریشه‌های معادله $2x^2 - ax + b = 0$ نیم واحد از ریشه‌های معادله $2ax^2 + ax - 6 = 0$ بیشتر است. مقدار $\frac{ab}{c}$ کدام است؟ (داخل ۱۴۰۲)

- ۱) 4 ○ -۲) 3 ○ -۳) 2 ○ -۴) 1 ○

- ۲۰۲۸** اگر $\alpha + \frac{1}{\beta}$ و $\beta + \frac{1}{\alpha}$ ریشه‌های معادله $x^2 - 8x + 4 = 0$ باشند، آن‌گاه ریشه‌های کدام معادله به صورت $\{\alpha, \beta\}$ است؟

- $x^2 - 6x + 2 = 0$ ○ $x^2 - 6x + 1 = 0$ ○ $x^2 - 4x + 2 = 0$ ○ $x^2 - 4x + 1 = 0$ ○

- ۲۰۲۹** اگر ریشه‌های معادله $8x^2 - 3x - 1 = 0$ به صورت $\{\alpha^2\beta, \alpha\beta^2\}$ باشند، به ازای کدام مقدار k ریشه‌های معادله $4x^2 + kx - 2 = 0$ به صورت

- است؟ $\{\frac{1}{\alpha} + \beta, \frac{1}{\beta} + \alpha\}$

- ۱) 4 ○ -۳) 3 ○ ۳) 2 ○ ۱) 1 ○


- ۲۰۳۰** اگر $\alpha + 2$ و $\beta + 2$ ریشه‌های معادله $x^2 - 3x - 1 = 0$ باشند، ریشه‌های کدام معادله $1 + \alpha^2 + \beta^2$ هستند؟

- $2x^2 - 5x - 11 = 0$ ○ $x^2 - 11x + 19 = 0$ ○ $x^2 - 9x + 17 = 0$ ○ $x^2 - 8x - 1 = 0$ ○

- ۲۰۳۱** فرض کنید x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - 4x + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 0$ باشند، ریشه‌های کدام معادله $x^2 - 4x + 1 = 0$ است؟ (تجربی خارج ۱۴۰۰)


- $4x^2 + 51x = 197$ ○ $4x^2 = 51x + 197$ ○ $4x^2 + 51x = 221$ ○ $4x^2 = 51x + 221$ ○

۲۰۸۹ نمودار تابع درجه دوم $y = f(x)$ به صورت مقابل است. طول نقطه B کدام است؟



- ۱ (۱) ○
- ۲ (۲) ○
- ۳ (۳) ○
- ۴ (۴) ○

۲۰۹۰ در شکل مقابل، نقطه (۲, ۹) رأس سهمی است. طول پاره خط AB کدام است؟



- ۴ $\sqrt{3}$ (۱) ○
- ۵ $\sqrt{2}$ (۲) ○
- ۵ $\sqrt{3}$ (۳) ○
- ۴ $\sqrt{2}$ (۴) ○

۲۰۹۱ رأس سهمی تابع $f(x) = x^2 - 4x + m + 1$ روی محور x ها قرار دارد و نقطه A(m, n) روی این سهمی است. معادله سهمی که نقطه A رأس آن باشد و از نقطه رأس سهمی f می‌گذرد، کدام است؟

$$y = x^2 - 4x + 4 \quad (۲) \circ$$

$$y = -2x^2 + 12x - 17 \quad (۱) \circ$$

$$y = x^2 - 6x + 8 \quad (۴) \circ$$

$$y = -x^2 + 6x - 8 \quad (۳) \circ$$

۲۰۹۲ نقاط A(۳, y) و B(-5, y) روی یک سهمی واقع شده‌اند و عرض رأس سهمی برابر ۱ است. اگر این سهمی، محور x ها را در نقاطی با طول‌های

(ریاضی داخلی ۱۴۰۲) باشد، این سهمی محور y ها را در نقطه‌ای با کدام عرض قطع می‌کند؟

$$\frac{2}{3} \quad (۴) \circ$$

$$\frac{1}{3} \quad (۳) \circ$$

$$-\frac{2}{3} \quad (۲) \circ$$

$$-\frac{1}{3} \quad (۱) \circ$$

۲۰۹۳ سهمی گذرا از نقاط (۱, a) و (-۲, a) بر خط $y + 3 = 0$ مماس بوده و از هر چهار ناحیه مختصات می‌گذرد. اگر فاصله نقطه برخورد سهمی با

(مشابه ریاضی ۲۰۱۴) محور عرض‌ها تا مبدأ مختصات ۲ واحد باشد، مقدار a کدام است؟

$$-2 \quad (۲) \circ$$


$$-2 \quad (۱) \circ$$

$$6 \quad (۴) \circ$$

$$-6 \quad (۳) \circ$$

۲۰۹۴ دیگه وقتیه برم سراغ تست‌های ترکیبی! توی این تست‌ها باید سهمی رو زیر ذره‌بین بذارید و به همه ویژگی‌هاش توجه کنید.


۲۰۹۴ شکل مقابل، نمودار تابع $f(x) = -x^2 + 8x + k$ است. اگر $|OA| = |AB| = |BC|$ باشد، حاصل ضرب طول و عرض مختصات نقطه رأس کدام است؟




- ۸ (۱) ○
- ۱۰ (۲) ○
- ۱۴ (۳) ○
- ۱۶ (۴) ○

۲۰۹۵ نمودار تابع درجه دوم f با رأس A به صورت مقابل است. اگر مساحت مثلث OAB برابر ۱۶ باشد،

بیشترین مقدار تابع کدام است؟




- ۳۲ (۱) ○
- ۳۶ (۲) ○
- ۴۰ (۳) ○
- ۴۲ (۴) ○



نمودار تابع درجه دوم f به صورت مقابل است. اگر $|OA| = |OC| = 3|OB|$ و مساحت مثلث ABC برابر $\frac{11}{2}$ باشد. مقدار $f(3)$ کدام است؟

۲۰۹۶

برابر 24 باشد. مقدار $f(3)$ کدام است؟ $\frac{15}{2}$ $\frac{7}{3}$ $\frac{11}{2}$ $\frac{12}{5}$ 

در شکل مقابل نقطه $C(-3, -25)$ رأس سهمی و مساحت مستطیل زنگی برابر 48 واحد مربع است. طول پاره خط AB چند واحد است؟


۲۰۹۷

۸

۹

۱۰

۱۲



طبق شکل، نمودار تابع $f(x) = -x^3 + 4x + 1$ محور x را در ۲ نقطه A و E و محور y را در نقطه D قطع می‌کند. مساحت ذوزنقه $ABCD$ کدام است؟

۲۰۹۸

د

۳۶

۴۸

۵۴

۶

صفرهای تابع $y = 2x^2 - (m+2)x + m$ و نقطه تقاطع آن با محور عرضها، رئوس یک مثلث هستند. اگر مساحت این مثلث برابر $\frac{3}{4}$ باشد، کدام می‌تواند طول رأس سهمی $y = x^2 - mx + 1$ باشد؟ (ریاضی داخلی ۱۴۰۲)

۲۰۹۹

 $-\frac{1}{2}$ $-\frac{3}{4}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$

شکل مقابل بخشی از نمودار تابع درجه دوم $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ است. چه تعداد از روابط زیر درست است؟

۲۱۰۰


الف) $c = -15b$ ب) $b = 2a$ ج) $a = -3c$

۱

۲

۳

۴ صفر



نمودار دو تابع درجه دوم $f(x) = x^3 + bx + c$ و $g(x) = x^3 + ax - 2$ به صورت مقابل است. مقدار $f(2) + g(4)$ کدام است؟

۲۱۰۱


د) $f(2) + g(4)$

۱

۲

۳

۴



مطابق شکل، نمودارهای دو تابع $g(x) = -x^3 - 2x^2 + 3m - 7$ و $f(x) = (m-4)x^3 + (m+1)x + m + 3$ در نقطه A و B روی محورهای مختصات متقطع‌اند. فاصله رأس‌های این دو سهمی کدام است؟


۲۱۰۲


د) $2\sqrt{13}$

۲

۳

۴

 $2\sqrt{26}$ $4\sqrt{13}$ $4\sqrt{26}$



سهمی f با رأس $(2, 5)$ و سهمی g به صورت مقابل است. مقدار $gof(4)$ کدام است؟ ۱۱۰۴

- ۱۰ (۱) ○
- ۴ (۲) ○
- ۲۰ (۳) ○
- ۱۸ (۴) ○

۴) وضعیت سهمی و خط یا وضعیت دو سهمی نسبت به هم

خط $y = x + 2$ و سهمی $1 = x^2 - 3x + m - 1$ در دو نقطه متقطع‌اند. بیشترین مقدار صحیح m کدام است؟ ۱۱۰۵

- ۷ (۴) ○
- ۶ (۳) ○
- ۵ (۲) ○
- ۴ (۱) ○

چه تعداد از تابع‌های خطی گذرنده از نقطه $A(0, 3)$ نمودار منحنی به معادله $y = 2x^2 - x - 2$ را در دو نقطه قطع می‌کنند؟ ۱۱۰۶

- ۴ (۴) ○
- ۴ (۳) ○
- ۱ (۲) ○
- ۰ (۱) صفر ○

منحنی به معادله $1 = mx + (2x + 1)(x + 8)$ با خطوط مشترکی ندارد. مجموعه مقادیر m کدام است؟ ۱۱۰۷

- $5 < m < 13$ (۴) ○
- $7 < m < 15$ (۳) ○
- $15 < m < 23$ (۲) ○
- $9 < m < 25$ (۱) ○

سهمی $1 = -m - x$ و خط $y = -mx^2 + mx + 1$ یکدیگر را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کنند. حدود m شامل چند مقدار صحیح است؟ ۱۱۰۸

- (تجربی نوبت اول ۱۴۰۳)
- ۲ (۲) ○
- ۰ (۳) ○
- ۳ (۱) ○

دو عدد حقیقی a و b را در نظر بگیرید. اگر تابع درجه دوم $g(x) = 2b(a-x)$ و تابع خطی $f(x) = x^2 - 2ax + 2$ نقطه مشترکی نداشته باشند، بیشترین مقدار صحیح $a^2 + b^2$ کدام است؟ ۱۱۰۹

- ۴ (۴) ○
- ۳ (۳) ○
- ۲ (۲) ○
- ۱ (۱) ○

منحنی‌های دو سهمی به معادله $3 = 9x^2 - kx + 1 = y + 1$ بر خط $x = 0$ مماس هستند. فاصله دو نقطه تمسك کدام است؟ ۱۱۱۰

- ۲ (۴) ○
- $\frac{5}{3}$ (۳) ○
- $\frac{4}{3}$ (۲) ○
- $\frac{2}{3}$ (۱) ○

به ازای کدام مقادیر a دو سهمی $1 = -x^2 + x + a$ و $y = x^2 + 3x + 1$ در دو نقطه متقطع‌اند؟ ۱۱۱۱

- $a > 1$ (۴) ○
- $0 < a < \frac{1}{2}$ (۳) ○
- $a > \frac{1}{2}$ (۲) ○
- $a < 0$ (۱) ○

به ازای کدام مقدار m ، نمودار تابع $y = 4x^2 + (m+1)x + m + 6$ بر نیمساز ناحیه اول محورهای مختصات، مماس است؟ ۱۱۱۲ (تجربی خارج ۹۳)

- ۱۲ (۴) ○
- ۱۲, -۴ (۳) ○
- ۱۲, ۴ (۲) ○
- ۴ (۱) ○

به ازای چه مقدار از m ، نمودار تابع $y = -3x^2 + (2m-1)x + m - 6$ بر نیمساز ناحیه چهارم مماس است؟ ۱۱۱۳ (کنکور مجدد ۱۴۰۱)

- ۶ (۴) ○
- ۳ (۳) ○
- ۶ (۲) ○
- ۳ (۱) ○

به ازای کدام مقدار k دو سهمی $g(x) = kx^2 - 2x + 4$ و $f(x) = 4x^2 + 4x - k$ برهم مماس هستند؟ ۱۱۱۴

- ۰ (۴) هیچ مقدار k ○
- ± 5 (۳) ○
- ۵ (۲) ○
- ۵ (۱) ○

سهمی $1 = -x^2 + 2x + 1$ خط راست گذرا از $(1, 0)$ و با عرض از مبدأ -۱ را در نقاط A و B قطع می‌کند. اگر M وسط پاره خط AB باشد، فاصله ۱۱۱۵

(تجربی خارج ۱۴۰۰)

- $\frac{1}{2}$ (۴) ○
- $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) ○
- $\sqrt{2}$ (۲) ○
- ۲ (۱) ○

سهمی $f(x) = x^2 - 2x + n$ و خط $y = 4x + m$ در نقاط A و B متقاطع‌اند. مختصات نقطه میانی پاره خط AB برابر $M(a, ۱۷)$ است. ۱۱۱۶

(شبیه‌ساز خارج ۱۴۰۰)

مقدار m کدام است؟

- ۵ (۴) ○
- ۴ (۳) ○
- ۲ (۲) ○
- ۱ (۱) ○

گذر از نواحی



مسارخ بعضی وقت‌ها سهمی بالای محور x است که در این حالت از ناحیه‌های اول و دوم دستگاه مختصات می‌گذرد و بعضی وقت‌ها هم سهمی پایین محور x است که در این حالت از ناحیه‌های سوم و چهارم می‌گذرد.

۹۸ بـ ازای چند مقدار صحیح m ، نمودار سهمی ۱ $y = (m+2)x^3 - 2mx + 1$ فقط از ناحیه اول و دوم دستگاه مختصات می‌گذرد؟ (شیوه‌ساز خارج)

۶ (۴) ○

۵ (۳) ○

۴ (۲) ○

۳ (۱) ○

(خارج) ۹۸ بـ ازای کدام مجموعه مقادیر m ، سهمی به معادله $y = (1-m)x^3 + 2(m-3)x - 1$ همواره پایین محور x است؟

۲ < m < ۶ (۴) ○۲ < m < ۴ (۳) ○۲ < m < ۵ (۲) ○۱ < m < ۵ (۱) ○

۹۸ بـ ازای کدام مقدار a نمودار تابع با ضابطه $f(x) = (a-1)x^3 - 2x + a + 1$ پایین محور x ها و برآن مماس است؟

±√۲ (۴) ○

-√۲ + ۱ (۳) ○

√۲ (۲) ○

-√۲ (۱) ○

مسارخ حالابریم حالت‌هایی رو بررسی کنیم که سهمی فقط از یک ناحیه نمی‌گذرد یا از هر چهار ناحیه می‌گذرد.

۹۸ تابع درجه دوم $f(x) = (m-1)x^3 + (3m+5)x + m + 2$ از هر چهار ناحیه دستگاه مختصات می‌گذرد. مقادیر m کدام است؟

m > -۲ (۴) ○

m < ۱ (۳) ○

-۲ < m < ۱ (۲) ○

m < -۲ یا m > ۱ (۱) ○

۹۸ بـ ازای کدام مقادیر m ، سهمی ۳ فقط از ناحیه دوم محورهای مختصات نمی‌گذرد؟

(-∞, -۱] (۴) ○

(-∞, ۳] (۳) ○

(-۱, ۳] (۲) ○

[-۱, ۳) (۱) ○

۹۸ بـ ازای چند مقدار a ، سهمی ۳ از ناحیه سوم محورهای مختصات نمی‌گذرد؟

۰ < a < ۱ (۴) ○ هیچ مقدار

۲ (۳) ○

۱ (۲) ○

۰ < a ≤ ۱ (۱) ○ تمام مقادیر a

۹۸ بـ ازای کدام مقادیر m ، نمودار سهمی $y = mx^3 + (3m-1)x + m - 6$ حداقل از سه ناحیه می‌گذرد؟

[-۱, ۰] ∪ [۶, +∞) (۴) ○

[۶, +∞) (۳) ○

R - (۰, ۶) (۲) ○

(۰, ۶) (۱) ○

۹۸ بـ ازای کدام مقادیر m ، نمودار تابع $f(x) = x^3 + (m+2)x + 2m - 1$ دقیقاً از ۳ ناحیه محورهای مختصات عبور می‌کند؟

m < ۰ یا m > ۴ (۴) ○

m ≥ ۱/۲ (۳) ○

۱/۲ ≤ m < ۴ (۲) ○

m > ۴ (۱) ○

۹۸ بـ ازای کدام مجموعه مقادیر a ، سهمی به معادله $y = (a-3)x^3 + ax - 1$ از ناحیه اول محورهای مختصات نمی‌گذرد؟

۰ < a < ۳ (۴) ○

۲ < a < ۳ (۳) ○

۰ < a ≤ ۲ (۲) ○

۰ ≤ a ≤ ۲ (۱) ○

یادداشت:

۱۹۵۶

فرض می‌کنیم α و β ریشه‌های معادله هستند، پس:

$$\begin{aligned} x^2 - mx + m + 4 &= 0 \Rightarrow S = \alpha + \beta = m, \quad P = \alpha\beta = m + 4 \\ \Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 &= 7 \Rightarrow S^2 - 2P = 7 \Rightarrow m^2 - 2(m + 4) = 7 \\ \Rightarrow m^2 - 2m - 15 &= 0 \Rightarrow (m - 5)(m + 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 5 \\ m = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

در ضمن $m = 5$ قابل قبول نیست چون به ازای آن Δ منفی می‌شود.
همیشه یاد باشید توی این مسائل علامت Δ روچک کنی.

۱۹۵۷

چون x_1 و x_2 ریشه‌های معادله هستند، پس:

$$\begin{aligned} x^2 - 5x + k &= 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 5, \quad P = x_1 x_2 = k \\ \frac{x_1 + x_2}{x_2} = 3 &\Rightarrow \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = 3 \Rightarrow \frac{S^2 - 2P}{P} = 3 \Rightarrow \frac{5^2 - 2k}{k} = 3 \Rightarrow k = 5 \end{aligned}$$

۱۹۵۸

چون x_1 و x_2 ریشه‌های معادله هستند، پس:

$$\begin{aligned} x^2 - x - a &= 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 1, \quad P = x_1 x_2 = -a \\ \frac{x_1^3 + x_2^3}{x_1^2 + x_2^2} = \frac{4}{3} &\Rightarrow \frac{S^3 - 3PS}{S^2 - 2P} = \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{1^3 - 3(-a)}{1^2 - 2(-a)} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{1+3a}{1+2a} = \frac{4}{3} \Rightarrow a = 1$$

۱۹۵۹

در معادله $x^2 - 4x + 3m - 1 = 0$ مجموع ریشه‌ها برابر $= 4$ و $a + b = 3m - 1$ است. حال رابطه داده شده را ساده می‌کنیم و داریم:

$$5(a^2 + b^2) + 2ab = 112 \Rightarrow 5(4^2 - 2P) + 26P = 112$$

$$\Rightarrow 80 - 10P + 26P = 112 \Rightarrow 16P = 32 \Rightarrow P = 2$$

$$\Rightarrow 3m - 1 = 2 \Rightarrow 3m = 12 \Rightarrow m = 4$$

۱۹۶۰

چون x_1 و x_2 ریشه‌های معادله هستند، پس:

$$x^2 - 5x + m = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 5, \quad P = x_1 x_2 = m$$

از طرفی مساحت مستطیل برابر $= 16$ است، پس:

$$(x_1 + m)(x_2 + m) = 16 \Rightarrow x_1 x_2 + m(x_1 + x_2) + m^2 = 16$$

$$\Rightarrow m + 5m + m^2 = 16 \Rightarrow \underbrace{m^2 + 6m - 16}_{(m-2)(m+8)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = -8 \end{cases}$$

در ضمن به ازای $m = -8$ محيط مستطیل، عددی منفی می‌شود!

۱۹۶۱

چون x_1 و x_2 ریشه‌های معادله هستند، پس:

$$x^2 - 5x - 3 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 5, \quad P = x_1 x_2 = -3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3x_1 + 2} + \frac{1}{3x_2 + 2} = \frac{(3x_2 + 2) + (3x_1 + 2)}{(3x_1 + 2)(3x_2 + 2)}$$

$$= \frac{3(x_1 + x_2) + 4}{9x_1 x_2 + 6(x_1 + x_2) + 4} = \frac{3(5) + 4}{9(-3) + 6(5) + 4} = \frac{19}{17}$$

با توجه به صورت سؤال، مساحت مثلث برابر است با:

$$S = \frac{1}{2} \alpha c = c^2 \Rightarrow \alpha = 2c$$

حالا حاصل ضرب و مجموع ریشه‌های معادله $x^2 + 5x + c = 0$ برابر c است، پس:

$$1) P = \alpha\beta \Rightarrow \alpha\beta = c \xrightarrow{\alpha=2c} 2c\beta = c \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$$

$$2) S = \alpha + \beta = -5 \Rightarrow 2c + \frac{1}{2} = -5 \Rightarrow c = -\frac{11}{4} = -2.75$$

۱۹۶۲

ضرایب معادله $2kx^2 - 4x - 5 = 0$ صحیح هستند، پس n نیز عددی صحیح است. حالا حاصل ضرب ریشه‌ها را پیدا می‌کنیم:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{-4k - 5}{2k} = -2 - \frac{5}{2k}$$

برای این‌که حاصل ضرب ماکسیمم شود، باید $\frac{5}{2k} = -\frac{1}{2}$ این اتفاق می‌افتد. پس $k = -\frac{1}{2}$ است و داریم:
 $-x^2 - 4x + 2 - 5 = 0 \xrightarrow{x=(-1)} x^2 + 4x + 3 = 0$

$$\xrightarrow{a+c=b} \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = -3 \end{cases}$$

پس تفاضل ریشه‌ها برابر $= 2$ است.

۱۹۶۳

در معادله $x^2 - 2x - 4 = 0$ داریم:

$$S = \alpha + \beta = 2, \quad P = \alpha\beta = -4$$

حالاتک تک گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

$$1) \alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 2P = 2^2 - 2(-4) = 12$$

$$2) \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{S}{P} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$$

$$3) \alpha^3 + \beta^3 = S^3 - 3PS = 2^3 - 3(-4)(2) = 32$$

$$4) \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = \frac{S^2 - 2P}{P} = \frac{12}{-4} = -3$$

۱۹۶۴

اگر ریشه‌های معادله درجه دوم را α و β در نظر بگیریم، آن‌گاه:

$$S = \alpha + \beta = 1 \Rightarrow \frac{-b}{a} = 1 \Rightarrow \frac{(m-2)}{1} = 1$$

$$\Rightarrow m - 2 = 1 \Rightarrow m = 3$$

پس معادله به صورت $x^2 - 1 \cdot x + 24 = 0$ و حاصل ضرب ریشه‌های

آن برابر با $= 24$ است. در نتیجه خواهیم داشت:

$$\alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 3SP = 1^2 - 3 \cdot 1 \cdot 24 = 100 - 72 = 28$$

۱۹۷۳

$$x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:} \\ 2x^2 - 5ax - 1 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = \frac{5a}{2}, P = x_1 x_2 = -\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} = x_2 - x_1 \Rightarrow \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} = (x_2 - x_1)(x_1 + x_2) \\ \Rightarrow -\frac{1}{4} = \frac{5a}{2} \Rightarrow 1 \cdot a = -1 \Rightarrow a = -\frac{1}{5}$$

۱۹۷۴

$$\text{در معادله } x^2 - ax + 1 = 0 \text{ داریم:} \\ |x_2 - x_1| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \sqrt{a^2 - 32}, P = x_1 x_2 = 1$$

$$\text{حال با توجه به رابطه } \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \frac{1}{4} \text{ داریم:}$$

$$\frac{|x_2 - x_1|}{|x_1 x_2|} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{\sqrt{a^2 - 32}}{1} = \frac{1}{4} \Rightarrow \sqrt{a^2 - 32} = 2 \\ \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = \pm 6 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = a = (\pm 6) = \pm 6$$

۱ ۱۹۷۵

$$\text{در معادله } x^2 - (m-1)x + m+2 = 0 \text{ داریم:} \\ S = x_1 + x_2 = m-1, P = x_1 x_2 = m+2$$

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 = 1 \Rightarrow x_1 x_2 (x_1 + x_2) = 1 \Rightarrow (m+2)(m-1) = 1 \\ \Rightarrow m^2 + m - 12 = 0 \Rightarrow (m+4)(m-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 3 & \text{خ} \\ m = -4 & \text{ب} \end{cases}$$

به ازای $m = 3$ معادله ریشه حقیقی ندارد.
اگه علامت Δ رو چک نکنی، گزینه (۴) رو میزنی.

۲ ۱۹۷۵

$$x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:} \\ 2x^2 - 6x - 1 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 3, P = x_1 x_2 = -\frac{1}{2} \\ \text{حال مقدار } 4x_1^2 x_2 + 4x_1 x_2^2 + 6x_1 + 6x_2 \text{ را پیدا می‌کنیم:} \\ 4x_1 x_2 (x_1 + x_2) + 6(x_1 + x_2) = 4(-\frac{1}{2})(3) + 6(3) = 12$$

۳ ۱۹۷۶

$$\text{در معادله } x^2 - (a+2)x + 3 = 0 \text{ داریم:} \\ S = x_1 + x_2 = a+2, P = x_1 x_2 = 3$$

$$x_1^2 x_2^2 + 3x_1^2 x_2 = 81 \Rightarrow x_1^2 x_2^2 x_1 + 3x_1 x_2 x_1 = 81 \\ \Rightarrow (x_1 x_2)^2 x_1 + 3(x_1 x_2) x_1 = 81 \Rightarrow 9x_1 + 9x_2 = 81 \\ \Rightarrow x_1 + x_2 = 9 \Rightarrow a+2 = 9 \Rightarrow a = 7$$

۴ ۱۹۷۷

$$\text{در معادله } x^2 - x + m = 0 \text{ مجموع ریشه‌ها برابر } 1 \text{ و حاصل ضرب ریشه‌ها } P = m \text{ است، پس:}$$

$$\frac{\alpha}{\beta-1} + \frac{\beta}{\alpha-1} = -2 \Rightarrow \frac{\alpha(\alpha-1) + \beta(\beta-1)}{(\beta-1)(\alpha-1)} = -2 \\ \Rightarrow \frac{(\alpha^2 + \beta^2) - (\alpha + \beta)}{\alpha\beta - (\alpha + \beta) + 1} = -2 \Rightarrow \frac{S^2 - 2P - S}{P - S + 1} = -2 \\ \Rightarrow \frac{1 - 2m - 1}{m - 1 + 1} = \frac{-2m}{m} = -2$$

چون $x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:}$

$$x^2 - (m+1)x + m+2 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = m+1,$$

$$P = x_1 x_2 = m+2$$

$$\frac{1}{x_1+1} + \frac{1}{x_2+1} = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{(x_2+1)+(x_1+1)}{(x_1+1)(x_2+1)} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{x_1 + x_2 + 2}{x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \frac{m+1+2}{m+2+m+1+1} = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{m+3}{2m+4} = \frac{1}{12} \Rightarrow m = 4$$

۱ ۱۹۷۸

چون $x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:}$

$$x^2 - (m-3)x + 2m-13 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = m-3,$$

$$P = x_1 x_2 = 2m-13$$

حالا نامعادله $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} > 1$ را حل می‌کنیم:

$$\frac{x_1+x_2}{x_1 x_2} > 1 \Rightarrow \frac{m-3}{2m-13} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{-m+1}{2m-13} > 0 \Rightarrow \frac{13}{2} < m < 1.$$

البته باید $\Delta > 0$ باشد:

$$\Delta = (m-3)^2 - 4(1)(2m-13) = m^2 - 14m + 61 = (m-7)^2 + 12 > 0$$

پس همه مقادیر طبیعی m در بازه $(1, \frac{13}{2})$ قابل قبول‌اند و مجموع آن‌ها برابر است با:

۲ ۱۹۷۹

چون $x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:}$

$$x^2 - (5m-1)x + 9 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 5m-1, P = x_1 x_2 = 9$$

حالا طرفین تساوی $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} = 5$ را به توان ۲ می‌رسانیم و داریم:

$$x_1 + x_2 + 2\sqrt{x_1 x_2} = 25 \Rightarrow 5m-1 + 2\sqrt{9} = 25 \Rightarrow m = 4$$

ن یه هوره دیگه! طراح کنکور سراسری سال ۹۶ همین سؤالو اینهوری مطرح کرد:
«مجموع هنر هم در ریشه این معادله درجه دو برابر ۵ است.»

۱ ۱۹۸۰

چون $x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:}$

$$x^2 - 3x + 1 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = 3, P = x_1 x_2 = 1$$

حال با فرض $A = x_1 \sqrt{x_2} + x_2 \sqrt{x_1}$ داریم:

$$A^2 = x_1^2 x_2 + x_2^2 x_1 + 2x_1 x_2 \sqrt{x_1 x_2}$$

$$= 1 \times 3 + 2 \times 1 \times \sqrt{1} = 5 \Rightarrow A = \sqrt{5}$$

۲ ۱۹۸۱

چون $x_1 \text{ و } x_2 \text{ ریشه‌های معادله هستند، پس:}$

$$2x^2 - 5x - 1 = 0 \Rightarrow S = x_1 + x_2 = \frac{5}{2}, P = x_1 x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow (x_1^2 + \frac{1}{x_2})(x_2^2 + \frac{1}{x_1}) = (x_1 x_2)^2 + x_1 + x_2 + \frac{1}{x_1 x_2}$$

$$= (-\frac{1}{2})^2 + \frac{5}{2} + \frac{1}{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} + \frac{5}{2} - 2 = \frac{3}{4}$$

از آن جایی که m در مخرج کسر قرار دارد، $p \neq m$ است. از طرفی معادله باید دارای ریشه باشد:

$$\Delta \geq 0 \Rightarrow (-1)^2 - 4(1)m \geq 0 \Rightarrow m \leq \frac{1}{4}, m \neq 0.$$

پس بیشترین مقدار m برابر $\frac{1}{4}$ است.

۱۹۷۸

اگر α و β ریشه‌های صحیح معادله $x^2 + ax + b = 0$ باشند، داریم:

$$\begin{aligned} S &= \alpha + \beta = -a & \xrightarrow{a+b=3} & -(\alpha + \beta) + \alpha\beta = 3 \\ P &= \alpha\beta = b & & \xrightarrow{(\alpha-1)(\beta-1)=1} \\ & \Rightarrow (\alpha - 1)(\beta - 1) = 4 \end{aligned}$$

حال چون α و β اعداد صحیح هستند، حالت‌های زیر را داریم:

$$\begin{aligned} 1) \quad \begin{cases} \alpha - 1 = 1 \Rightarrow \alpha = 2 \\ \beta - 1 = 4 \Rightarrow \beta = 5 \end{cases} & \quad 2) \quad \begin{cases} \alpha - 1 = -1 \Rightarrow \alpha = 0 \\ \beta - 1 = -4 \Rightarrow \beta = -3 \end{cases} \end{aligned}$$

۱۹۷۹

ریشه‌های معادله $(a + \Delta)x^2 + (4a + 3)x + 2a + 1 = 0$ معکوس یکدیگرند، پس:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 x_2 = 1 \Rightarrow P = \frac{c}{a} = 1 \Rightarrow \frac{2a+1}{a+\Delta} = 1 \\ & \Rightarrow 2a + 1 = a + \Delta \Rightarrow a = 4 \end{aligned}$$

۱۹۸۰

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها به ترتیب $\frac{2-m}{3}$ و $S = -\frac{2m-1}{3}$ است. حال چون مجموع ریشه‌ها با معکوس حاصل ضرب آنها برابر است، پس:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{P} \Rightarrow -\frac{2m-1}{3} = \frac{3}{2-m} \Rightarrow 2m^2 - 5m + 2 = 9 \\ & \Rightarrow 2m^2 - 5m - 7 = 0 \xrightarrow{a+c=b} m = -1, m = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

به ازای $m = -1$ معادله فاقد ریشه حقیقی است، زیرا $\Delta < 0$ می‌شود: $m = -1: 3x^2 - 3x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 0 \Rightarrow \Delta = 1 - 4 < 0$.

۱۹۸۱

در معادله $3x^2 - ax + 4 = 0$ حاصل ضرب ریشه‌ها برابر $\frac{4}{3}$ است. در ضمن $\alpha = 3\beta$ است، پس:

$$\alpha\beta = \frac{4}{3} \Rightarrow 3\beta \times \beta = \frac{4}{3} \Rightarrow \beta^2 = \frac{4}{9} \Rightarrow \begin{cases} \beta = \frac{2}{3} \Rightarrow \alpha = 2 \\ \beta = -\frac{2}{3} \Rightarrow \alpha = -2 \end{cases}$$

از طرفی مجموع ریشه‌ها برابر $\frac{a}{3}$ است، پس:

$$\alpha + \beta = \pm \frac{a}{3} = \frac{a}{3} \Rightarrow a = \pm a \Rightarrow |a_2 - a_1| = |-a - a| = 16$$

۱۹۸۲

در معادله $ax^2 - 8x + 4 = 0$ داریم: $\alpha + \beta = \frac{8}{a}$ ، $\alpha\beta = \frac{4}{a}$. حال با توجه به این که مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله‌ای با ریشه‌های $\alpha\beta^2$ ، $\beta\alpha^2$ برابر هستند داریم:

$$\beta\alpha^2 + \alpha\beta^2 = \alpha^2\beta + \beta^2\alpha \xrightarrow{+ \alpha\beta} \alpha + \beta = (\alpha\beta)^2$$

$$\frac{\alpha}{a} = \left(\frac{8}{a}\right)^2 \Rightarrow 1 = \frac{64}{a^2} \Rightarrow a = 2 \Rightarrow \log_{\sqrt{2}} a = \log_{\sqrt{2}} 2 = 2$$

با توجه به معادله مجموع ریشه‌ها برابر $12 = x_1 + x_2$ است. از طرفی

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 12 \\ 2x_1 - x_2 = 6 \end{cases} \Rightarrow 3x_1 = 18 \Rightarrow x_1 = 6$$

در ضمن $6 = x_1$ یکی از ریشه‌های معادله است در آن صدق می‌کند:

$$x^2 - 12x + 2m - 6 = 0 \xrightarrow{x_1=6} 36 - 72 + 2m - 6 = 0 \Rightarrow m = 21$$

لطفاً یه پوره دیگه! قبول دارید که می‌توینیم رابطه صورت سؤال رو به شکل $x = 2X - 6$ بنویسیم؟ فرب طرح همین سؤال رو در کنکور داشت! این پوره مطرح کرد: «اگر یکی از ریشه‌های معادله $= 0 = 12X + 2m - 6 = 12X + 2m - 12$ از دو برابر ریشه دیگر، 6 واحد کمتر باشد، مقدار m کدام است؟»

در معادله $12 = 2k - 3x + (2k - 3)x = 2x^2 + (2k - 3)x - 12 = 0$ حاصل ضرب ریشه‌ها برابر

$$x_1 x_2 = -\frac{\lambda}{\mu} = -\frac{12}{2} = -6 \text{ است. در ضمن } x_1 x_2 = \frac{-12}{2} = -6$$

$$x_1 x_2 = -6 \Rightarrow \left(-\frac{\lambda}{\mu} x_2\right) (x_2) = -6 \Rightarrow x_2 = \frac{9}{\lambda} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{3}{2} \Rightarrow x_1 = -4 \\ x_2 = -\frac{3}{2} \Rightarrow x_1 = 4 \end{cases}$$

از طرفی مجموع ریشه‌ها برابر $\frac{2k - 3}{2}$ است. پس:

$$x_1 + x_2 = \pm \frac{\Delta}{2} = -\frac{2k - 3}{2} \xrightarrow{k \in \mathbb{N}} k = 4$$

در معادله $0 = x^2 + (a - 2)x + 16 = 0$ حاصل ضرب ریشه‌ها برابر $x_1 x_2 = 16$ است. در ضمن با توجه به صورت سؤال $x_1 = x_2 = 16$ است،

$$x_1 x_2 = 16 \xrightarrow{x_2 = x_1^3} x_1^4 = 16 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1 = -2 \end{cases}$$

اگر $x_1 = -2$ باشد، $x_2 = -8$ است که در رابطه $x_1 > x_2$ صدق می‌کند، پس با توجه به مجموع ریشه‌ها داریم:

$$x_1 + x_2 = -(a - 2) \Rightarrow (-2) + (-8) = -a + 2 \Rightarrow a = 12$$

چون سه جمله $\alpha\beta = a^2$ ، $\alpha\beta = \beta\alpha$ ، $\alpha\beta = a$ تشکیل دنباله هندسی داده‌اند، پس

است. از طرفی در معادله $0 = x^2 + 2(a+1)x + 2a - 1 = 0$ حاصل ضرب ریشه‌ها از رابطه $-1 = \alpha\beta = 2a - 1$ به دست می‌آید، پس:

$$\begin{cases} \alpha\beta = a^2 \\ \alpha\beta = 2a - 1 \end{cases} \Rightarrow a^2 = 2a - 1 \Rightarrow a^2 - 2a + 1 = 0 \Rightarrow a = 1$$

اگر ریشه‌های معادله را α و β در نظر بگیریم، از آن جایی که عدد $\frac{1}{\lambda}$

واسطه حسابی بین ریشه‌های حقیقی معادله است، بنابراین:

$$\alpha + \beta = 2\left(\frac{1}{\lambda}\right) \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{1}{\lambda}$$

از طرفی در معادله داده شده، مجموع ریشه‌ها برابر است با:

$$S = -\frac{-3}{m^2 - 4} = \frac{3}{m^2 - 4} = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow m^2 - 4 = 12 \Rightarrow m = \pm 4$$

۱۹۹۱

با توجه به معادله، مجموع ریشه‌ها برابر $-7 = x_1 + x_2$ است. حال با توجه به رابطه $x_2^2 + x_1 x_2 = 35$ داریم:

$$x_2(x_1 + x_2) = 35 \Rightarrow -7x_2 = 35 \Rightarrow x_2 = -5$$

در ضمن چون $-5 = x_2$ یکی از ریشه‌های معادله است، در آن صدق می‌کند:

$$x_2^2 + 7x_2 - m + 2 = 0 \xrightarrow{x_2 = -5} 25 - 35 - m + 2 = 0$$

$$\Rightarrow m = -8$$

۱۹۹۲

در معادله $(a+1)x^2 - 2x + a = 0$ حاصل ضرب ریشه‌ها برابر $x_1 x_2 = \frac{a}{a+1}$ است، پس با جایگذاری در رابطه صورت سؤال داریم:

$$x_1 + x_1 x_2 = -\frac{1}{a+1} \Rightarrow x_1 + \frac{a}{a+1} = -\frac{1}{a+1}$$

$$\Rightarrow x_1 = -\frac{a+1}{a+1} = -1$$

چون $-1 = x_1$ یکی از ریشه‌های معادله است، پس در آن صدق می‌کند:

$$(a+1)x^2 + 2x + a = 0 \xrightarrow{x_1 = -1} (a+1) - 2 + a = 0$$

$$\Rightarrow 2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

۱۹۹۳

چون β یکی از ریشه‌های معادله است، پس در آن صدق می‌کند:

$$\beta^2 + 3\beta - 5 = 0 \Rightarrow 5 - 3\beta = \beta^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{\alpha^2(5 - 3\beta)} = \sqrt{\alpha^2\beta^2} = \sqrt{(\alpha\beta)^2} = \sqrt{25} = 5$$

۱۹۹۴

چون a و b ریشه‌های معادله $x^2 - 5x - 3 = 0$ هستند پس در معادله

صدق می‌کنند:

$$\begin{cases} a^2 - 5a - 3 = 0 \Rightarrow a^2 - 5a = 3 \\ b^2 - 5b - 3 = 0 \Rightarrow b^2 - 5b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (a-2)(a-3) + (b-1)(b-4) = (a^2 - 5a + 6) + (b^2 - 5b + 4)$$

$$= (3+6) + (3+4) = 16$$

۱۹۹۵

چون x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 + 2 = 4x$ هستند، در آن صدق می‌کنند: $(x_1, x_2 \neq 0)$

$$1) x_1^2 + 2 = 4x_1 \xrightarrow{\div x_1} x_1 + \frac{2}{x_1} = 4$$

$$2) x_2^2 + 2 = 4x_2 \xrightarrow{\div x_2} x_2 + \frac{2}{x_2} = 4$$

حالا حاصل عبارت خواسته شده را پیدا می‌کنیم:

$$(x_1 + \frac{2}{x_1})^2 + x_2^2 + \frac{4}{x_2^2} = (x_1 + \frac{2}{x_1})^2 + (x_2 + \frac{2}{x_2})^2 - 4$$

$$= 4^2 + 4^2 - 4 = 28$$

حال Δ را به ازای $m = 4$ و $m = -4$ به دست می‌آوریم تا بینیم کدام مقدار قابل قبول است:

$$m = 4: 12x^2 - 3x + 4 = 0 \Rightarrow \Delta = \underbrace{(-3)^2 - 4(12)(4)}_{9 - 192} = -183 < 0$$

به ازای $m = 4$ معادله، ریشه حقیقی ندارد.

$$m = -4: 12x^2 - 3x - 4 = 0$$

دام تستی اميدوارم گزینه (۱) رو نزدہ باشی؛ چون $m = 4$ دلتا رو منفی می‌کنه.

$$\Rightarrow \Delta = \underbrace{(-3)^2 - 4(12)(-4)}_{9 + 192} = 201 > 0 \quad \checkmark$$

۱ ۱۹۸۸

در معادله $mx^2 - (m+1)x + 1 = 0$ داریم:

$$S = \alpha + \beta = \frac{m+1}{m}, \quad P = \alpha\beta = \frac{1}{m}$$

حال فرض می‌کنیم k واسطه حسابی و هندسی α و β است، پس:

$$\begin{cases} k = \frac{\alpha + \beta}{2} \Rightarrow (\frac{m+1}{2m})^2 = \frac{1}{m} \Rightarrow \frac{m^2 + 2m + 1}{4m^2} = \frac{1}{m} \\ k^2 = \alpha\beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow m^2 + 2m + 1 = 4m \Rightarrow \underbrace{m^2 - 2m + 1}_{(m-1)^2} = 0 \Rightarrow m = 1$$

وش سریع نیاز به حل معادله نبود، با عددگذاری ۱ می‌توانستی درستی این تساوی رو چک کنی.

۱ ۱۹۸۹

چون x_1, x_2, x_3, x_4 چهار جمله اول یک دنباله حسابی هستند، پس جمله اول را x_1 و قدرنسبت را d در نظر می‌گیریم. حال در هر معادله مجموع ریشه‌ها را پیدا می‌کنیم:

$$1) x^2 + 2x + A = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 = -2 \Rightarrow x_1 + (x_1 + d) = -2$$

$$2) x^2 - 4x + B = 0 \Rightarrow x_3 + x_4 = 4 \Rightarrow (x_1 + 2d) + (x_1 + 3d) = 4$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + d = -2 \\ 2x_1 + 5d = 4 \end{cases} \Rightarrow d = 4, \quad x_1 = -3$$

پس $-3 = x_1 = x_2$ و $4 = x_3 = x_4$ است و داریم:

$$\frac{B}{A} = \frac{x_3 x_4}{x_1 x_2} = \frac{16 \times 16}{-3 \times -3} = -16$$

۱ ۱۹۹۰

با توجه به معادله، حاصل ضرب ریشه‌ها برابر $4 = x_1 x_2$ است و با توجه به رابطه $\sqrt{x_1} + \frac{2}{\sqrt{x_2}} = 2$ داریم:

$$\frac{\sqrt{x_1 x_2} + 2}{\sqrt{x_2}} = 2 \Rightarrow \frac{\sqrt{4} + 2}{\sqrt{4}} = 2 \Rightarrow \sqrt{x_2} = 2 \Rightarrow x_2 = 4$$

در ضمن چون $4 = x_2$ یکی از ریشه‌های معادله است، در آن صدق می‌کند:

$$x^2 - (m-1)x + 4 = 0 \xrightarrow{x_2 = 4} 16 - 4(m-1) + 4 = 0 \Rightarrow m = 6$$

۱۹۹۶

 $x_1^2 - 4x_1 + 1 = 0 \Rightarrow x_1^2 = 4x_1 - 1 \Rightarrow (x_2^2 - 4x_1 + 4)(x_1^2 - 4x_2 + 4)$

$$\begin{cases} x_1^2 - 4x_1 + 1 = 0 \Rightarrow x_1^2 = 4x_1 - 1 \\ x_2^2 - 4x_2 + 1 = 0 \Rightarrow x_2^2 = 4x_2 - 1 \end{cases}$$

$$= (4x_2 - 1 - 4x_1 + 4)(4x_1 - 1 - 4x_2 + 4)$$

$$= (3 + 4(x_2 - x_1))(3 - 4(x_2 - x_1)) = 9 - 16(x_2 - x_1)^2$$

$$|x_2 - x_1| = \sqrt{\frac{\Delta}{|a|}} = \sqrt{12} \text{ می‌دانیم } x^2 - 4x + 1 = 0 \text{ در معادله است، پس:}$$

$$9 - 16(x_2 - x_1)^2 = 9 - 16(\sqrt{12})^2 = 9 - 192 = -183$$

۱۹۹۷

 چون a یکی از ریشه‌های معادله است، پس در آن صدق می‌کند:

$$x^2 - x - 1 = 0 \xrightarrow{x=a} a^2 - a - 1 = 0 \Rightarrow a^2 = a + 1$$

 حال a را ساده می‌کنیم و آن را در مخرج کسر خواسته شده قرار می‌دهیم:

$$a^4 = (a^2)^2 = (a+1)^2 = a^2 + 2a + 1 = a + 1 + 2a + 1 = 3a + 2$$

$$\Rightarrow \frac{6a+4}{a^4} = \frac{6a+4}{3a+2} = 2$$

۱۹۹۸

 چون a یکی از ریشه‌های معادله $x^2 + mx - 2 = 0$ است، در آن صدق می‌کند:

$$a^2 + ma - 2 = 0 \Rightarrow a^2 - 2 = -ma \xrightarrow{+a} a - \frac{2}{a} = -m$$

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲}} a^2 + \frac{4}{a^2} - 4 = m^2 \Rightarrow a^2 + \frac{4}{a^2} = m^2 + 4$$

 از طرفی $a^2 + \frac{4}{a^2} = 20$ است، پس:

$$m^2 + 4 = 20 \Rightarrow m^2 = 16 \Rightarrow \begin{cases} m = -4 \\ m = 4 \end{cases}$$

۱۹۹۹

 چون a و b ریشه‌های معادله $x^2 - (2a+b-2)x + b - 2 = 0$ هستند، پس جمع و ضرب ریشه‌ها را می‌نویسیم:

$$1) S = a + b = 2a + b - 2 \Rightarrow a = 2$$

$$2) P = ab = b - 2 \xrightarrow{a=2} 2b = b - 2 \Rightarrow b = -2$$

 بنابراین $a^3 + b^3 = 8 + 4 = 12$ است.

 دام‌تسوی اگه a و b رو جایه‌جاکنی، به گزینه (۴) می‌رسی.

۲۰۰۰

 در معادله $1 \cdot x + a^2 + b^2 = 2x$ حاصل ضرب ریشه‌ها برابر است با:

$$P = ab = \frac{a^2 + b^2}{2} \Rightarrow a^2 + b^2 = 2ab \Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 = 0$$

$$\Rightarrow (a - b)^2 = 0 \Rightarrow a = b$$

از طرفی مجموع ریشه‌ها برابر است با:

$$S = a + b = \frac{1}{2} = 0 \xrightarrow{a=b} a = b = \frac{0}{2}$$

پس معادله دارای دو ریشهٔ یکسان با علامت مثبت است.

۱۹۹۵

 چون $m + n$ و $m - n$ ریشه‌های معادله $x^2 - (m-2n)x + 5n + 2 = 0$ هستند، پس جمع و ضرب ریشه‌ها را می‌نویسیم:

$$1) S = (m+n) + (m-n) = m - 2n \Rightarrow 2m = m - 2n \Rightarrow m = -2n$$

$$2) P = (m+n)(m-n) = 5n + 2 \Rightarrow \underbrace{(-2n+n)(-2n-n)}_{3n^2} = 5n + 2$$

$$\Rightarrow 3n^2 - 5n - 2 = 0 \Rightarrow (n-2)(3n+1) = 0$$

$$\xrightarrow{n \in \mathbb{Z}} n = 2 \Rightarrow m = -4$$

۱۹۹۶

 در معادله $x^2 - (a^2 + b^2 - 12)x + a + b - 1 = 0$ مجموع و حاصل ضرب ریشه‌ها را می‌نویسیم:

$$1) ab = a + b - 1 \Rightarrow P = S - 1$$

$$2) a + b = a^2 + b^2 - 12 \Rightarrow S = S^2 - 2P - 12$$

$$\Rightarrow S = S^2 - 2(S-1) - 12 \Rightarrow \underbrace{S^2 - 3S - 10}_{(S-5)(S+2)} = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = 5 \\ S = -2 \end{cases}$$

 چون a و b اعداد طبیعی هستند، پس مجموع آنها برابر است. $S = a + b = 5$

۱۹۹۷

چون دو معادله دارای ریشه‌های یکسان هستند، پس حاصل ضرب و جمع ریشه‌های دو معادله با یکدیگر برابر است:

$$(m-2)x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow S_1 = -\frac{2}{m-2}, P_1 = \frac{-3}{m-2}$$

$$4x^2 + mx + n = 0 \Rightarrow S_2 = -\frac{m}{4}, P_2 = \frac{n}{4}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{m-2} = -\frac{m}{4} \Rightarrow \underbrace{m^2 - 2m - 8}_{(m-4)(m+2)} = 0 \Rightarrow m = 4, m = -2$$

 در ضمن به ازای $(m-2)x^2 + 2x - 3 = 0$ $m = -2$ است. $\Delta = -44 < 0$ حقيقة ندارد چون $\Delta = -44 < 0$.

$$\frac{-3}{m-2} = \frac{n}{4} \xrightarrow{m=4} -\frac{3}{2} = \frac{n}{4} \Rightarrow n = -6 \Rightarrow m - n = 10$$

 اگر با -2 میرفتی، توی دام می‌افتدی و گزینه (۴) رو می‌زدی!

۱۹۹۸

 فرض می‌کنیم x ریشه مشترک هر دو معادله است و داریم:

$$x^2 + 6x + m = 0 \Rightarrow S_1 = \alpha + x = -6$$

$$x^2 + 2x - 3m = 0 \Rightarrow S_2 = \beta + x = -2$$

$$\Rightarrow S_2 - S_1 = \beta - \alpha = -2 - (-6) = 4$$

۱۹۹۹

 اگر ریشه مشترک معادله‌ها را x در نظر بگیریم، آن‌گاه با توجه به مجموع ریشه‌ها در هر معادله داریم:

$$1) x^2 - (a+1)x - 3 - b = 0 \Rightarrow S_1 = 3 + x = (a+1)$$

$$2) x^2 + ax + c = 0 \Rightarrow S_2 = -2 + x = -a$$

$$5 = 2a + 1 \Rightarrow a = 2$$

حالا این روابط را از هم کم می‌کنیم:

۳ ۲۰۵

$$\text{در معادله } 3x^2 - 12x - a = 0 \text{ داریم:}$$

$$S = \alpha + \beta = 4, \quad P = -\frac{a}{3}$$

در ضمن چون α یکی از ریشه‌های معادله است در آن صدق می‌کند:

$$3x^2 - 12x - a = 0 \xrightarrow{x=\alpha} 3\alpha^2 - 12\alpha - a = 0 \Rightarrow \alpha^2 - 4\alpha = \frac{a}{3}$$

حال با توجه به رابطه $2\alpha^2 + \beta^2 - 4\alpha = 7$ داریم:

$$\underbrace{\alpha^2 + \beta^2}_{S^2 - 2P} + \underbrace{\alpha^2 - 4\alpha}_{\frac{a}{3}} = 7 \Rightarrow (4)^2 - 2(-\frac{a}{3}) + \frac{a}{3} = 7 \Rightarrow a = -9$$

پس معادله به شکل $= 3x^2 - 12x + 9 = 0$ است و داریم:

$$3(x^2 - 4x + 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 3 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{\beta} = \frac{-9}{3} = -3$$

۳ ۲۰۶

ابتدا ریشه‌های معادله را به دست می‌آوریم:

$$x^2 + \lambda x - 3 = 0 \xrightarrow[\alpha > 0]{\Delta = 7\lambda} \begin{cases} \alpha = \frac{-\lambda + \sqrt{7\lambda}}{2} = -4 + \sqrt{19} \\ \beta = \frac{-\lambda - \sqrt{7\lambda}}{2} = -4 - \sqrt{19} \end{cases}$$

$$\Rightarrow |\underbrace{\alpha + 2\beta}_{-} + |\underbrace{\alpha}_{+} - |\underbrace{\beta - 4}_{-}| = -(\alpha + 2\beta) + (\alpha) + (\beta - 4)$$

$$= -\beta - 4 = -(-4 - \sqrt{19}) - 4 = \sqrt{19}$$

۳ ۲۰۷

در معادله $x^2 - 4x + a = 0$ مجموع ریشه‌ها برابر $S = 4$ و حاصل ضرب ریشه‌ها برابر $P = a$ است. حال هر یک از ریشه‌ها را پیدا می‌کنیم:

$$\Delta = 16 - 4a \Rightarrow \alpha, \beta = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4a}}{2} \xrightarrow{\alpha < 0} \alpha = 2 - \sqrt{4 - a}$$

حال رابطه $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta$ را ساده‌تر می‌کنیم:

$$\alpha^2 + (\alpha^2 + \beta^2) = (2 - \sqrt{4 - a})^2 + (S^2 - 3SP)$$

$$= (4 + 4 - a - 4\sqrt{4 - a}) + (64 - 12a) = 72 - 13a - 4\sqrt{4 - a}$$

از طرفی با توجه به صورت سؤال $\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta = 98 - 4\sqrt{6}$ است،

پس با مقایسه طرف راست این دو رابطه داریم:

$$72 - 13a = 98 \Rightarrow a = -2$$

۱ ۲۰۸

در معادله $x^2 + 6x + a = 0$ مجموع ریشه‌ها برابر $S = -6$ و حاصل ضرب ریشه‌ها برابر $P = a$ است. حال هر یک از ریشه‌ها را پیدا می‌کنیم:

$$\Delta = 36 - 4a \Rightarrow \alpha, \beta = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4a}}{2} \xrightarrow{\alpha < \beta} \alpha = -3 - \sqrt{9 - a}$$

حال رابطه $\alpha^2 + 2\beta^2 + 3\alpha\beta$ را ساده‌تر می‌کنیم:

$$2(\alpha^2 + \beta^2) + \alpha^2 = 2(S^2 - 2P) + (-3 - \sqrt{9 - a})^2$$

$$= 2(36 - 2a) + (9 + 9 - a + 6\sqrt{9 - a}) = 90 - 5a + 6\sqrt{9 - a}$$

از طرفی با توجه به صورت سؤال $3\alpha^2 + 2\beta^2 = 85 + 12\sqrt{2}$ است؛ پس

با مقایسه طرف راست این دو رابطه، داریم:

حال معادله را بازنویسی می‌کنیم و ریشه هر کدام را در معادله قرار می‌دهیم:

$$1) x^2 - 3x - 3 - b = 0 \xrightarrow{x_1 = 3} 3^2 - 3 \times 3 - 3 - b = 0 \Rightarrow b = -3$$

$$2) x^2 + 2x + c = 0 \xrightarrow{x_2 = -2} (-2)^2 + 2(-2) + c = 0 \Rightarrow c = 0$$

$$\Rightarrow c + \log_a(1 - b) = 0 + \log_2 4 = 2$$

۳ ۲۰۹

ریشه‌های معادله $x^2 - 2x + m = 0$ را α و β و ریشه‌های معادله $x^2 - 7x + m + 15 = 0$ را γ و δ در نظر می‌گیریم. حالا مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های هر معادله را می‌نویسیم:

$$1) \begin{cases} \alpha + \gamma = 2 \\ \beta + \delta = 7 - 2 = 5 \end{cases} \Rightarrow \beta - \alpha = 7 - 2 = 5$$

$$2) \begin{cases} \alpha\gamma = m \\ \beta\delta = m + 15 \end{cases} \Rightarrow \underbrace{(\beta - \alpha)}_{5} \cdot x_0 = 15 \Rightarrow x_0 = 3$$

چون $x_0 = 3$ ریشه معادله است، پس در آنها صدق می‌کند:

$$x^2 - 2x + m = 0 \xrightarrow{x_0 = 3} 3^2 - 2(3) + m = 0 \Rightarrow m = -3$$

۱ ۲۰۷

در معادله $x^2 + x - 3 = 0$ داریم:

$$S = \alpha + \beta = -1, \quad P = \alpha\beta = -3$$

حالا از $\alpha\beta$ فاکتور می‌گیریم:

$$\alpha^3\beta + \alpha^2\beta + \alpha\beta = \alpha\beta(\alpha^2 + \alpha + 1)$$

از طرفی چون α ریشه معادله است، پس در آن صدق می‌کند:

$$\alpha^2 + \alpha - 3 = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \alpha = 3$$

حالا حاصل عبارت خواسته شده را پیدا می‌کنیم:

$$\alpha\beta(\alpha^2 + \alpha + 1) = -3(3 + 1) = -12$$

۳ ۲۰۸

در معادله $x^2 + 4x - 3m - 1 = 0$ مجموع ریشه‌ها $\alpha + b = -4$ است. در ضمن چون a یکی از ریشه‌های معادله است، پس در آن صدق می‌کند:

$$x^2 + 4x - 3m - 1 = 0 \xrightarrow{x=a} a^2 + 4a = 3m + 1$$

حال با توجه به رابطه $a^2 + 4a + b = 12$ داریم:

$$\underbrace{a^2 + 4a}_{3m+1} + \underbrace{a+b}_{-4} = 12 \Rightarrow 3m - 3 = 12 \Rightarrow 3m = 15 \Rightarrow m = 5$$

۲ ۲۰۹

چون α و β ریشه‌های معادله $x^2 + x - 3 = 0$ هستند، پس

$\alpha = \beta = -3$ است. در ضمن چون α یکی از ریشه‌های معادله است، پس در آن صدق می‌کند:

$$x^2 + x - 3 = 0 \xrightarrow{x=a} \alpha^2 + \alpha - 3 = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \alpha = 3$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 + \beta^2 + \alpha = \underbrace{\alpha^2 + \beta^2}_{S^2 - 2P} + \underbrace{\alpha^2 + \alpha}_{3} = (-1)^2 - 2(-3) + 3 = 10$$

چون معادله دارای یک ریشهٔ حقیقی مثبت و یک ریشهٔ حقیقی منفی است، پس حاصل ضرب ریشه‌ها منفی است:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{m^2 - 4}{m-1} < 0 \Rightarrow \frac{m^2 - 4}{m-1} < 0$$

m	-2	1	2	
-	+	-	+	
	-	+	-	+

پس مقدادر قابل قبول برای m به صورت بازه $(1, 2) \cup (-\infty, -2)$ است و بی شمار مقدار صحیح برای m وجود دارد.

در معادله $x^2 + a - 2 = 0$ چون a منفی است بنابراین حاصل ضرب ریشه‌ها یعنی $-2 - x_1 x_2$ منفی است. پس معادله یک ریشهٔ حقیقی مثبت و یک ریشهٔ حقیقی منفی دارد.

چون x_1 منفی و x_2 مثبت است، پس حاصل ضرب ریشه‌ها منفی است:

$$1) P = \frac{c}{a} = \frac{m-3}{m} < 0 \Rightarrow 0 < m < 3$$

از طرفی $|x_1| > x_2$ است، یعنی قدر مطلق ریشهٔ منفی، بزرگ‌تر است، پس جمع ریشه‌ها منفی است:

$$2) S = -\frac{b}{a} = -\frac{m-1}{m} < 0 \Rightarrow m < 1 \text{ یا } m > 1$$

از اشتراک مقدادر به دست آمده، نتیجه می‌گیریم $3 < m < 1$ است.

پوش سریع میتوانستی بدون هیچ اطلاعاتی، عددگذاری کنی. فقط توی گزینهٔ (۴) ممکنه اذیت بشی.

اگر طول مستطیل را x_1 و عرض آن را x_2 در نظر بگیریم، با توجه به صورت سؤال داریم:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 22 \\ x_1 x_2 = 28 \end{cases} \Rightarrow x_1 + x_2 = 11$$

بنابراین x_1 و x_2 ریشه‌های معادله $x^2 - 11x + 28 = 0$ هستند:

$$x^2 - 11x + 28 = 0 \Rightarrow (x-4)(x-7) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 7 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

اگر بخواهیم معادلهٔ درجهٔ دومی با ریشه‌های x_1 و x_2 تشکیل دهیم، کافی است $S = x_1 + x_2$ و $P = x_1 x_2$ را پیدا کنیم و معادله را به صورت زیر بنویسیم:

می‌توانید در معادله $x^2 - 2x - 1 = 0$ ، جای a و c را با هم عوض کرده و b را قرینه کنیم، پس معادلهٔ مورد نظر برابر است با:

$$x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x + 3 = 0 \quad \text{معادلهٔ جدید} \quad \text{معادلهٔ اولیه}$$

قرینه

باید $\Delta > 0$ و $S > 0$ باشد:

$$1) \Delta = b^2 - 4ac > 0 \Rightarrow m^2 - 4(2)(m+6) > 0$$

$$\Rightarrow m^2 - 8m - 48 > 0 \Rightarrow (m-12)(m+4) > 0 \Rightarrow m < -4 \text{ یا } m > 12$$

$$2) S = -\frac{b}{a} > 0 \Rightarrow -\frac{m}{2} > 0 \Rightarrow m < 0$$

$$3) P = \frac{c}{a} = \frac{m+6}{2} > 0 \Rightarrow m+6 > 0 \Rightarrow m > -6$$

پوش سریع این تیپ تست‌های عددگذاری به راحتی قابل حل هستند. اگر $m = -3$ بزاری، Δ منفی می‌شود و گزینه‌های (۱) و (۲) و (۳) حذف می‌شوند.

از اشتراک جواب‌های به دست آمده از (۱) و (۲) و (۳) مقدادر قابل قبول برای m به صورت بازه $(-6, -4)$ است.

همایویت

P	S	Δ	علامت ریشه‌ها
+	+	+	دوریشهٔ مثبت
+	-	+	دوریشهٔ منفی
-		+	دوریشهٔ ناهم علامت

توجه کنید وقتی $P < 0$ است (۰ و c هم علامت نیستند) قطعاً Δ مثبت است.

۱ ۲۰۱۵

باید $\Delta > 0$ و $S > 0$ باشد:

$$1) \Delta = (-2m)^2 - 4(1)(m+2) > 0 \Rightarrow 4m^2 - 4m - 8 > 0$$

$$\Rightarrow 4(m^2 - m - 2) > 0 \Rightarrow 4(m-2)(m+1) > 0 \Rightarrow m < -1 \text{ یا } m > 2$$

$$2) S = 2m < 0 \Rightarrow m < 0$$

$$3) P = m+2 > 0 \Rightarrow m > -2$$

از اشتراک (۱) و (۲) و (۳) مقدادر قابل قبول برای m به صورت بازه $(-2, -1)$ است.

پوش سریع یه هوره دیگه! طراح می‌تونست همین سؤال رو اینهوری پرسه: «معادله درجهٔ دو $m^2 - 2mx + 2 + m = 0$ به ازای کدام مقدادر m دارای دوریشهٔ حقیقی متمایز با علامت منفی است؟»

پوش سریع بازم عددگذاری کنیم:
۱) گزینهٔ (۳) حذف می‌شود. با $m = -1$ گزینهٔ (۲) حذف می‌شود و با $m = 3$ گزینهٔ (۴) حذف می‌شود.

۲ ۲۰۱۶

باید $\Delta > 0$ و $P > 0$ باشد:

$$1) \Delta = 4(m-1)^2 - 4(1)(m+1) > 0 \Rightarrow 4(m^2 - 3m) > 0$$

$$\Rightarrow 4m(m-3) > 0 \Rightarrow m < 0 \text{ یا } m > 3$$

$$2) P = m+1 > 0 \Rightarrow m > -1$$

از اشتراک جواب (۱) و (۲) مقدادر قابل قبول برای m به صورت بازه $(-1, 0)$ است.

۳ ۲۰۲۵

به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

$$1) \text{ مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله } x^2 - 4x + 1 = 0 \text{ را}$$

$$S = \alpha + \beta = 4, P = \alpha\beta = 1 \text{ می‌نویسیم:}$$

(۲) مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله جدید را می‌نویسیم:

$$S_{\text{new}} = (\alpha + \frac{\gamma}{\beta}) + (\beta + \frac{\gamma}{\alpha}) = \alpha + \beta + \frac{\gamma}{\alpha} + \frac{\gamma}{\beta}$$

$$= \alpha + \beta + 2(\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}) = 4 + 2(\frac{4}{1}) = 12$$

$$P_{\text{new}} = (\alpha + \frac{\gamma}{\beta})(\beta + \frac{\gamma}{\alpha}) = \alpha\beta + \frac{\gamma}{\alpha\beta} + 2 + 2 = 1 + \frac{4}{1} + 4 = 9$$

$$(3) \text{ معادله جدید را با کمک رابطه } Sx + P = 0 \text{ می‌نویسیم:}$$

$$x^2 - 12x + 9 = 0 : \text{ معادله جدید}$$

۳ ۲۰۲۶

ابتدا مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله $x^2 - 2x - 4 = 0$ را

$$S = \alpha + \beta = 2, P = \alpha\beta = -4 \text{ می‌نویسیم:}$$

یکی از ریشه‌های معادله جدید، برابر $\alpha^2 + \beta^2$ است، پس:

$$\alpha^2 + \beta^2 = S^2 - 2P = 4 - 2(-4) = 12$$

حالا جمع و ضرب ریشه‌های معادله جدید را می‌نویسیم:

$$S_{\text{new}} = (\alpha^2 + \beta^2) + \alpha\beta = 12 + (-4) = 8$$

$$P_{\text{new}} = (\alpha^2 + \beta^2)(\alpha\beta) = 12 \times -4 = -48$$

$$\Rightarrow \text{ معادله جدید } x^2 - 8x - 48 = 0.$$

مثال

اگر بخواهیم معادله درجه دومی بنویسیم که ریشه‌های آن با ریشه‌های یک معادله دیگر ارتباط داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

۱) ابتدا S و P معادله اولیه را تشکیل می‌دهیم.۲) به کمک S و P معادله اولیه، S و P معادله خواسته شده را

به دست می‌آوریم.

۳) مطابق رابطه $x^2 - Sx + P = 0$ معادله جدید را می‌نویسیم.

۳ ۲۰۲۷

ابتدا با استفاده از روابط داده شده S و P معادله را پیدا می‌کنیم:

$$1) (x_1 + x_2) + x_1 x_2 = 5 \Rightarrow 3S + P = 5$$

$$2) (x_1 + 4)(x_2 + 4) = 25 \Rightarrow 4(x_1 + x_2) + x_1 x_2 = 9 \Rightarrow 4S + P = 9$$

از (۱) و (۲) نتیجه می‌گیریم $S = 4$ و $P = -7$ است. حال معادله جدید را با کمک رابطه $x^2 - Sx + P = 0$ می‌نویسیم:

$$x^2 - 4x - 7 = 0 : \text{ معادله جدید}$$

۴ ۲۰۲۸

به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

۱) ریشه‌های معادله $x^2 - 3x - 1 = 0$ را α و β در نظر می‌گیریم:

$$S = \alpha + \beta = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}, P = \alpha\beta = -\frac{1}{2}$$

۲) ریشه‌های معادله جدید برابر -1 و $\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}$ است. بنابراین

مجموع و حاصل ضرب این ریشه‌ها را می‌یابیم:

$$S_{\text{new}} = (\frac{1}{\alpha} - 1) + (\frac{1}{\beta} - 1) = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} - 2 = \frac{\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} - 2 = -3 - 2 = -5$$

$$P_{\text{new}} = (\frac{1}{\alpha} - 1)(\frac{1}{\beta} - 1) = \frac{1}{\alpha\beta} - (\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}) + 1$$

$$= \frac{1}{-\frac{1}{2}} - (\underbrace{\frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}}_{-3}) + 1 = 2$$

۳) معادله جدید را با کمک رابطه $x^2 - Sx + P = 0$ می‌نویسیم:

$$x^2 - (-5)x + 2 = 0 \Rightarrow x^2 + 5x + 2 = 0 : \text{ معادله جدید}$$

وش سریعتر اگه به گزینه‌ها نگاه کنی متوجه میشی S متفاوتی دارند.پس کافیه S جدید رو پیدا کنی و بری سراغ گزینه‌ها.

۳ ۲۰۸۳

چون نمودار محور x ها را در دو نقطه با طول های ۱ و ۵ قطع می کند، پس معادله منحنی رابه صورت $(x-5)(x+1)$ است و $y = k(x+1)$ در نظر می گیریم. از طرفی نمودار محور y ها را در نقطه ای به عرض ۱ قطع می کند، پس:

$$1 = k(0+1)(0-5) \Rightarrow k = -2$$

$$y = -2(x+1)(x-5) = -2x^2 + 8x + 1$$

است و داریم:

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{2(-2)} = 2 \Rightarrow y_S = -2(2)^2 + 8(2) + 1 = 17$$

۱ ۲۰۸۴

سهمی محور x ها را در دو نقطه به طول های ۲ و ۴ قطع کرده است، پس طول رأس سهمی برابر ۱ است و چون بیشترین مقدار تابع برابر ۳ است، پس رأس سهمی نقطه $A(1, 3)$ است. پس


معادله سهمی را می نویسیم:

$$f(x) = k(x+2)(x-4) \xrightarrow{(1, 3)} 3 = k(3)(-3) \Rightarrow k = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{1}{3}(x+2)(x-4) \Rightarrow f(0) = -\frac{1}{3}(2)(-4) = \frac{8}{3} \Rightarrow a = \frac{8}{3}$$

۲ ۲۰۸۴

خط $y = x - 4$ محور x ها را در نقطه ای به طول ۴ و محور y را در نقطه ای به عرض ۴ قطع می کند. در ضمن سهمی و خط در این دو نقطه مشترک اند، پس معادله سهمی را به صورت زیر در نظر می گیریم:



$$\Rightarrow f(x) = k(x+2)(x-4)$$

$$\xrightarrow{f(0) = -4} -4 = k(2)(-4)$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

پس $f(x) = \frac{1}{2}(x+2)(x-4)$ است. حالا کمترین مقدار تابع را پیدا می کنیم:

$$x_S = \frac{-2+4}{2} = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{1}{2}(3)(-3) = -\frac{9}{2}$$

پس کمترین مقدار تابع f برابر $-\frac{9}{2}$ است و محدوده گُرد آن به صورت $R_f = [-\frac{9}{2}, +\infty)$ است.

۲ ۲۰۸۵

مختصات رأس سهمی f نقطه $(1, 3)$ است و این سهمی از مبدأ مختصات می گذرد، پس:

$$f(x) = k(x-1)^2 + 1 \xrightarrow{(1, 3)} 1 = k + 1 \Rightarrow k = -1$$

$$\Rightarrow f(x) = -(x-1)^2 + 1$$

در ضمن $1 = -x + g(x)$ است. حالا سراغ حل معادله می رویم:

$$f(x) = g^2(x) \Rightarrow -(x-1)^2 + 1 = (-x+1)^2$$

$$\Rightarrow 2(x-1)^2 = 1 \Rightarrow (x-1)^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x^2 - 2x + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow S = 2$$

اگر صفرهای تابع $f(x) = x^2 - 3x + m$ را α و β در نظر بگیریم، با توجه به نمودار، داریم:

$$\begin{aligned} \text{اگر } \alpha < \beta \Rightarrow af(x) < 0 \Rightarrow 1 \times f(2) < 0 \\ \Rightarrow 4 - 6 + m < 0 \Rightarrow m < 2 \end{aligned}$$


مثال

تابع درجه دوم $f(x) = ax^2 + bx + c$ را در نظر بگیرید. اگر α و β ریشه های معادله $ax^2 + bx + c = 0$ باشند و عدد x بین این دو ریشه باشد، همواره $af(x) < 0$ است:



۱ ۲۰۷۹

اگر یکی از صفرهای تابع $f(x) = x^2 - 6x + m - 1$ را α در نظر بگیریم، با توجه به وضعیت های زیر، داریم:




$$\Rightarrow f(2)f(5) < 0 \Rightarrow (m-9)(m-6) < 0 \Rightarrow 6 < m < 9$$

پس دو مقدار $m = 7$ و $m = 8$ قابل قبول اند.

۲ ۲۰۸۰

اگر $\alpha < \beta$ است، پس با توجه به شکل های زیر، داریم: چون $\alpha < \beta$ است، پس با توجه به شکل های زیر، داریم:



$$\Rightarrow f(1)f(3) < 0 \Rightarrow (2m-3)(14m-3) < 0 \Rightarrow \frac{3}{14} < m < \frac{3}{2}$$

۳ ۲۰۸۱

سهی محور x ها را در دو نقطه به طول های ۴ و صفر قطع کرده و از نقطه $(1, 2)$ می گذرد، پس:

$$f(x) = kx(x+4) \xrightarrow{(1, 2)} 2 = k(1)(5) \Rightarrow k = \frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{2}{5}x(x+4) \Rightarrow f(-1) + f(-2) = \left(-\frac{6}{5}\right) + \left(-\frac{8}{5}\right) = -2.8$$

مثال

برای نوشتن معادله سهمی، ۳ حالت کلی داریم:

داده های سؤال	ضایعه سهمی
۱	$y = a(x-x_1)(x-x_2)$ و x_1, x_2 صفرهای سهمی اند.
۲	$y = a(x-x_S)^2 + y_S$ نقطه (x_S, y_S) رأس سهمی است.
۳	با حل سه معادله و سه مجهول، ضرایب را پیدا می کنیم. سه نقطه از سهمی.

چون نقطه $(2, 9)$ رأس سهمی است، پس معادله آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$f(x) = k(x - 2)^2 + 9 \xrightarrow{(-1, 0)} f(-1) = k(-3)^2 + 9 = 0 \\ \Rightarrow k = -1 \Rightarrow f(x) = -(x - 2)^2 + 9$$

حال نقاط برحورد با محورهای مختصات را پیدا می‌کنیم:
 $f(0) = -(0 - 2)^2 + 9 = 5 \Rightarrow A(0, 5)$

$$f(x) = 0 \Rightarrow -(x - 2)^2 + 9 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 9 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 5 \end{cases}$$

پس $(0, 5)$ است و فاصله دو نقطه A و B برابر است با:
 $AB = \sqrt{(5 - 0)^2 + (0 - 5)^2} = 5\sqrt{2}$

طول رأس سهمی $f(x) = x^2 - 4x + m + 1$ برابر $x_s = 2$ است.
 چون رأس سهمی روی محور x قرار دارد، پس $f(2) = 0$ است:
 $f(2) = 4 - 8 + m + 1 = 0 \Rightarrow m = 3$

پس $x^2 - 4x + 4$ است و چون نقطه $A(3, n)$ روی این سهمی است، پس:

$$f(3) = n \Rightarrow n = 9 - 12 + 4 = 1$$

حالا باید معادله سهمی با رأس $(3, 1)$ و گذرنده از نقطه $(0, 0)$ را بنویسیم:

$$y = k(x - 3)^2 + 1 \xrightarrow{(2, 0)} 0 = k(-1)^2 + 1 \Rightarrow k = -1 \\ \Rightarrow y = -(x - 3)^2 + 1 \Rightarrow y = -x^2 + 6x - 8$$

چون نقاط $A(3, 1)$ و $B(-5, y)$ هم عرض هستند، پس طول رأس سهمی $x_S = \frac{-5 + 3}{2} = -1$ است. از طرفی $y_S = 1$ است، پس

ضابطه سهمی به شکل زیر می‌باشد:
 $y = k(x + 1)^2 + 1 \Rightarrow y = kx^2 + 2kx + k + 1$

در ضمن با توجه به صورت سؤال α و β ریشه‌های سهمی هستند، پس $\alpha \beta = \frac{k+1}{k}$ و $S = \alpha + \beta = -\frac{2k}{k} = -2$ است و داریم:

$$\alpha^2 + \beta^2 = 5 \Rightarrow S^2 - 2P = 5 \Rightarrow (-2)^2 - 2P = 5 \Rightarrow P = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{k+1}{k} = -\frac{1}{2} \Rightarrow k = -\frac{2}{3} \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}$$

به ازای $x = 0$ عرض از مبدأ سهمی به دست می‌آید:
 $y(0) = \frac{1}{3}$

دام تستی عجله نکن! بعضی‌ها $k = -\frac{2}{3}$ به دست می‌ارون و همونو می‌زنن!

چون $(1, 9)$ رأس سهمی است، پس معادله سهمی را به صورت $y = k(x + 1)^2 + 9$ می‌نویسیم حال چون سهمی از نقطه $(3, 1)$ می‌گذرد، پس:

$$1 = k(3 + 1)^2 + 9 \Rightarrow 16k = -8 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$$

بنابراین معادله سهمی به صورت $y = -\frac{1}{2}(x + 1)^2 + 9$ خواهد بود.
 با جای‌گذاری گزینه‌ها، نقطه $(5, -9)$ روی سهمی قرار دارد.

چون این سهمی محور تقارن خود را در نقطه $(2, -7)$ قطع می‌کند، پس نقطه $(2, -7)$ رأس سهمی است. بنابراین معادله آن را به صورت $y = k(x - 2)^2 - 7$ در نظر می‌گیریم. حال چون این سهمی از نقطه $(1, 6)$ می‌گذرد، پس:

$$y = k(x - 2)^2 - 7 \xrightarrow{(6, 1)} 1 = k(6 - 2)^2 - 7 \Rightarrow 16k = 8 \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

پس معادله سهمی به صورت $y = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 7$ است که از میان گزینه‌ها، فقط نقطه $(1, -2)$ در آن صدق می‌کند.

روش سریع نقاط هم عرض توی سهمی یادته که؟!
 اگر میانگین طول دو نقطه بشه طول رأس سهمی، درنتیجه اون دو نقطه هم عرض هستن:
 $x_S = \frac{6 + (-2)}{2} = 2 \rightarrow 2$ گزینه (4)

چون نقطه $(0, 5)$ روی سهمی قرار دارد، پس عرض از مبدأ سهمی برابر 5 است، یعنی $c = 5$. حال با توجه به این‌که نقاط $(-2, 5)$ و $(1, 1)$ روی سهمی قرار دارند پس در معادله سهمی $y = ax^2 + bx + c$ در این معادله صدق می‌کند:

$$(-2, 5) : 5 = 4a - 2b + 5 \Rightarrow 4a = 2b \Rightarrow 2a = b \quad (1)$$

$$(1, 1) : 1 = a + b + 5 \Rightarrow a + b = 6 \xrightarrow{(1)} a = 2, b = 4$$

بنابراین معادله سهمی به صورت $y = 2x^2 + 4x + 5$ است. در میان گزینه‌ها، فقط مختصات $(3, -4)$ در این معادله صدق می‌کند.

چون سهمی با دهانه رویه پایین در نقطه $x = 2$ بر محور x هما مماس است و محورها را در نقطه -4 قطع می‌کند، پس:

$$f(x) = -(x - 2)^2 = -x^2 + 4x - 4$$

از طرفی خط گذرنده از دو نقطه A و B با جهت مثبت محور x زاویه 45° می‌سازد پس شبیه آن برابر $m = \tan 45^\circ = 1$ است و عرض از مبدأ آن برابر -4 است، پس معادله آن $y = x - 4$ است. حالا نقاط برخورد خط و سهمی را پیدا می‌کنیم:

$$-x^2 + 4x - 4 = x - 4 \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$$

پس طول نقطه B برابر $x = 3$ است.

پس $(0, -2)$ و $C(6, 0)$ است و معادله سهمی به صورت زیر است:

$$f(x) = k(x+2)(x-6) \xrightarrow{A(0,6)} 6 = k(2)(-6) \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{1}{2}(x+2)(x-6) \Rightarrow f(3) = -\frac{1}{2} \times (5) \times (-3) = \frac{15}{2}$$

۱۴ ۲۰۹۷

چون مساحت مستطیل رنگی برابر ۴۸ است، پس:

$$S = |-3| \times |m| = 48 \Rightarrow m = -16$$

پس رأس سهمی نقطه $C(-3, -25)$ است و محور y را در نقطه ای با عرض -16 قطع کرده است، بنابراین می‌توانیم معادله سهمی را

بنویسیم و صفرهای تابع را پیدا کنیم:

$$y = k(x+3)^2 - 25 \xrightarrow{(-0,-16)} -16 = k(0+3)^2 - 25 \Rightarrow 9k = 9$$

$$\Rightarrow k = 1 \Rightarrow y = (x+3)^2 - 25$$

حالا صفرهای تابع را پیدا می‌کنیم:

$$(x+3)^2 - 25 = 0 \Rightarrow (x+3)^2 = 25 \Rightarrow \begin{cases} x_A = 2 \\ x_B = -8 \end{cases} \Rightarrow |AB| = 10$$

۱۴ ۲۰۹۸

ابتدا مختصات نقاط A و D را پیدا می‌کنیم:

$$1) f(x) = 0 \Rightarrow -x^2 + 4x + 12 = 0 \Rightarrow -(x-6)(x+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_A = -2 \\ x_E = 6 \end{cases}$$

$$2) f(0) = 12 \Rightarrow D(0, 12)$$

چون دو نقطه C و D هم عرض اند، ضابطه تابع را برابر ۱۲ می‌گذاریم تا طول نقطه C پیدا شود:

$$-x^2 + 4x + 12 = 12 \Rightarrow -x^2 + 4x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_D = 0 \\ x_C = 4 \end{cases}$$

چون دو نقطه C و B هم طول اند، پس $B(4, 0)$ است و مساحت ذوزنقه رنگی برابر است با:

$$S = \frac{(|AB| + |CD|) \times |OD|}{2} = \frac{(6+4) \times 12}{2} = 60$$

۱۴ ۲۰۹۹

با توجه به این که در معادله $2x^2 - (m+2)x + m = 0$ ضرایب برابر صفر است پس ریشه‌های معادله به صورت 1 و $\frac{m}{2}$ می‌باشد.

بنابراین:

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \left(\frac{m}{2} - 1\right)m \right|$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{1}{2} |m(m-2)| \Rightarrow \begin{cases} m^2 - 2m + 3 = 0 \Rightarrow \Delta < 0 \\ m^2 - 2m - 3 = 0 \Rightarrow m = -1, 3 \end{cases}$$

با توجه به این که طول رأس سهمی $y = x^2 - mx + 1$ به صورت $x_S = \frac{m}{2}$ می‌باشد پس $x_S = -\frac{1}{2}$ و $x_S = \frac{3}{2}$ می‌توانند رأس سهمی مورد نظر باشند.

حالا ضابطه تابع g را با داشتن رأس $(4, 0)$ می‌نویسیم:

$$g(x) = k(x - 4)^2 \xrightarrow{A(2, 5)} 5 = 4k \Rightarrow k = \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow g(x) = \frac{5}{4}(x - 4)^2$$

بنابراین می‌توانیم $gof(4)$ را پیدا کنیم:

$$g(f(4)) = g(0) = \frac{5}{4}(0 - 4)^2 = \frac{5}{4} \times 16 = 20.$$

۱۳ ۲۰۱۴

چون سهمی و خط $y = x + 2$ در دو نقطه متقاطع‌اند، پس $\Delta > 0$ در معادله تلاقی مثبت است:

$$\begin{cases} y = x^2 - 3x + m - 1 \Rightarrow x^2 - 3x + m - 1 = x + 2 \\ y = x + 2 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 4x + m - 3 = 0 \xrightarrow{\Delta > 0} \Delta = 16 - 4(m - 3) > 0$$

$$\Rightarrow 4 > m - 3 \Rightarrow 7 > m$$

پس بیشترین مقدار صحیح m برابر ۶ است.

ثابت

برای بررسی وضعیت سهمی و خط نسبت به هم با معادله‌های $y_1 = mx + h$ و خط $y_2 = ax^2 + bx + c$ ابتدا معادله تلاقی $y_1 = y_2$ را تشکیل می‌دهیم. سپس همه عبارت‌ها را به یک طرف تساوی منتقل می‌کنیم و در معادله درجه دوم ایجاد شده، علامت Δ را پیدا می‌کنیم:

$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$	علامت Δ
یکدیگر را قطع نمی‌کنند.	در یک نقطه بر هم مماس‌اند.	در ۲ نقطه متقاطع‌اند.	وضعیت خط و سهمی
			شکل


۱۴ ۲۰۰۵

معادله خطوط گذرنده از نقطه $(0, 3)$ به صورت $y = mx + 3$ هستند. حالا باید علامت Δ را در معادله تلاقی این خطوط با سهمی $y = 2x^2 - x - 2$ پیدا کنیم:

$$\begin{cases} y = 2x^2 - x - 2 \Rightarrow 2x^2 - x - 2 = mx + 3 \\ y = mx + 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2x^2 - (m+1)x - 5 = 0 \Rightarrow \Delta = (m+1)^2 + 40.$$

چون علامت Δ همواره مثبت است، پس همه خطوط گذرنده از نقطه $(0, 3)$ ، سهمی را در دو نقطه قطع می‌کنند.



۱۵ ۲۰۰۵
با توجه به نمودار صورت سؤال، دو نقطه با طول‌های $x = -2$ و $x = -1$ بوده هم عرض هستند. بنابراین طول رأس سهمی برابر $1 - (-2) = 3$ است. پس اگر سهمی را تکمیل کنیم، داریم:

$$\frac{x_1 + 3}{2} = -1 \Rightarrow x_1 = -5$$


پس مجموع و حاصل ضرب صفرها برابر است با:

$$S = -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow b = 2a$$

$$P = \frac{c}{a} = -15 \Rightarrow c = -15a$$

با تقسیم این دو رابطه بر یکدیگر داریم:


$$\frac{c}{b} = \frac{-15a}{2a} \Rightarrow c = \frac{-15}{2}b$$



$$-a = 1 + (-2) \Rightarrow a = 1$$


حالا چون تابع g محور x را در دو نقطه به طول ۱ و ۵ قطع می‌کند، پس $(x - 5)(x + 1) = 0$ است. بنابراین:

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + x - 2 \\ g(x) = x^2 - 6x + 5 \end{cases} \Rightarrow f(2) + g(4) = 4 + (-3) = 1$$



پس سهمی f به صورت $(-3, 1)$ و مختصات رأس سهمی g به صورت $(1, 9)$ است و فاصله آن‌ها برابر است با:

$$\sqrt{(-3+1)^2 + (-1-9)^2} = \sqrt{4+100} = \sqrt{104} = 2\sqrt{26}$$



۲ ۵۴۰

ابتدا مخرج مشترک می‌گیریم و سپس از رابطه $\sin(\alpha + \beta)$ استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\cos 4^\circ}{\cos 2^\circ} + \frac{\sin 4^\circ}{\sin 2^\circ} = \frac{\cos 4^\circ \sin 2^\circ + \sin 4^\circ \cos 2^\circ}{\cos 2^\circ \sin 2^\circ}$$

$$= \frac{\sin(2^\circ + 4^\circ)}{\frac{1}{2} \sin 4^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2} \cos 4^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\cos 4^\circ} = A$$

$$\Rightarrow \cos 4^\circ = \frac{\sqrt{3}}{A}$$

۱ ۵۴۱

با توجه به رابطه $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ داریم:

$$\sin \Delta x \cos 3x - \cos \Delta x \sin 3x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow \sin(\Delta x - 3x) = \sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

حال برای محاسبه $\cos 2\alpha$ از رابطه $\cos 4x = 1 - 2\sin^2 \alpha$ استفاده می‌کنیم:

$$\cos 4x = 1 - 2\sin^2 2x = 1 - 2\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 = 1 - 2\left(\frac{1}{9}\right) = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

۱ ۵۴۲

ابتدا عبارت $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right)$ را ساده می‌کنیم:

$$(\cos \frac{\pi}{4} \cos \alpha + \sin \frac{\pi}{4} \sin \alpha) - (\cos \frac{\pi}{4} \cos \alpha - \sin \frac{\pi}{4} \sin \alpha)$$

$$= 2 \sin \frac{\pi}{4} \sin \alpha = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \sin \alpha = \sqrt{2} \sin \alpha$$

۱ ۵۴۳

حال از آنجایی که $\cos \alpha = \frac{\sqrt{7}}{3}$ است، خواهیم داشت:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{\sqrt{7}}{3}\right)^2 = 1 - \frac{7}{9} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi \Rightarrow \sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \sqrt{2} \sin \alpha = \sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{3}\right) = -\frac{2}{3}$$

پنجه در گله! طراح کنکور سال ۹۳ مشابه این تست را وینهوری پرسید: «اگر $\cos(x + \frac{\pi}{\mu}) + \cos(x - \frac{\pi}{\mu}) = \frac{2}{\mu}$ باشد، مقدار $\cos 2x$ کدام است؟»

۳ ۵۴۴

ابتدا $\cos\left(-\frac{11\pi}{4} + \alpha\right)$ را ساده می‌کنیم:

$$\cos(2\pi - \frac{\pi}{4} + \alpha) = -\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = -[\cos \frac{\pi}{4} \cos \alpha + \sin \frac{\pi}{4} \sin \alpha]$$

حال با توجه به این که $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{1}$ است، $\cos \alpha$ را به دست می‌آوریم:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{1}\right)^2 = 1 - \frac{2}{1} = \frac{9}{1}$$

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{9}}{1} = -\frac{\sqrt{9}}{1}$$

$$\Rightarrow -\cos\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = -\left[\underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \left(\frac{-\sqrt{9}}{1}\right)}_{\frac{\sqrt{2}}{1} + \frac{1}{1} = \frac{3}{1}} + \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{9}}{1}\right] = \frac{3}{5}$$

۲ ۵۴۵

بنابراین داریم:

$$\log(\sin x - \cos x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \log a - 1 \Rightarrow \log\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) = \log \sqrt{a} - \log 1.$$

$$\Rightarrow \log\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right) = \log\left(\frac{\sqrt{a}}{1}\right) \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{a}}{1} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{a}{1}$$

$$\Rightarrow a = 4 \Rightarrow a = 4.$$

۲ ۵۴۶

$$\frac{\cos 2x \cos x + \sin 2x \sin x}{\cos(2x-x)} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{3\pi}{2} - 2x\right) = -\cos 2x = -(2\cos^2 x - 1) = -(2 \cdot \frac{1}{9} - 1) = \frac{7}{9}$$

۲ ۵۴۷

سینوس و کسینوس زاویه $\alpha + \beta$ روابط $\cos(\alpha + \beta)$ و $\sin(\alpha + \beta)$ به صورت زیر است:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

اگر در این روابط به جای β زاویه $-\beta$ جای گذاری کنیم، داریم:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

روابط فرعی زیر را به خاطر داشته باشید:

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

۳ ۵۴۸

با استفاده از اتحاد مربع داریم:

$$(sinx+cosy)^2 + (siny+cosx)^2 = sin^2 x + 2sinxcosy + cos^2 y + sin^2 y + 2sinycosx + cos^2 x = 2(sin x cos y + sin y cos x) + 2$$

$$+ \underbrace{sin^2 x + cos^2 x}_{1} + \underbrace{sin^2 y + cos^2 y}_{1} = 2sin(x+y) + 2$$

همچنان با توجه به این که $x + y = \frac{5\pi}{6}$ است، داریم:

$$\sin(x+y) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \Rightarrow \sin(x+y) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\sin(x+y) + 2 = 2\left(\frac{1}{2}\right) + 2 = 3$$

۳ ۵۴۹

$$\frac{\sin \Delta x}{\sin x} - \frac{\cos \Delta x}{\cos x} = 1 \Rightarrow \frac{\sin \Delta x \cos x - \cos \Delta x \sin x}{\sin x \cos x}$$

$$= \frac{\sin(\Delta x - x)}{\frac{1}{2} \sin 2x} = \frac{2 \sin 4x}{\sin 2x} = \frac{4 \sin 2x \cos 2x}{\sin 2x}$$

$$= 4 \cos 2x = 1 \Rightarrow \cos 2x = \frac{1}{4}$$

۱ ۶۴۸

طرفین رابطه داده شده را بر عدد ۲ تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = \frac{1}{4} \Rightarrow \cos \frac{\pi}{3} \sin x + \sin \frac{\pi}{3} \cos x = \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{4} \Rightarrow \sin(x + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{4}$$

۲ ۶۴۹

$$A = ۳ \left(\frac{1}{\sin(18^\circ - 15^\circ)} - \frac{\sqrt{3}}{\cos(18^\circ - 15^\circ)} \right)$$

$$= ۳ \left(\frac{1}{\sin 15^\circ} + \frac{\tan 15^\circ}{\cos 15^\circ} \right) = ۳ \times \frac{\cos 15^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 15^\circ \cos 15^\circ}$$

$$= ۳ \times \frac{\cos 15^\circ \cos 15^\circ + \sin 15^\circ \sin 15^\circ}{\frac{1}{2}}$$

$$= ۲۴ \cos(6^\circ - 15^\circ) = ۲۴ \frac{\sqrt{2}}{2} = ۱۲\sqrt{2}$$

۱ ۶۵۰

ابتدا طرف راست تساوی را ساده می‌کنیم:

$$\frac{۲\cos(x+y)}{\frac{۳}{۴} - \tan y} = \sin(x+y) + \sin(x-y)$$

$$\Rightarrow \frac{۲(\cos x \cos y - \sin x \sin y)}{\frac{۳}{۴} - \tan y}$$

$$= \sin x \cos y + \sin y \cos x + \sin x \cos y - \sin y \cos x$$

$$\Rightarrow \frac{۲(\cos x \cos y - \sin x \sin y)}{\frac{۳}{۴} \sin x \cos y} = \frac{۳}{۴} - \tan y$$

$$\Rightarrow \frac{\cos x \cos y}{\sin x \cos y} - \frac{\sin x \sin y}{\sin x \cos y} = \frac{۳}{۴} - \tan y$$

$$\Rightarrow \cot x - \tan y = \frac{۳}{۴} - \tan y \Rightarrow \cot x = \frac{۳}{۴} \Rightarrow \tan x = \frac{۴}{۳}$$

۳ ۶۵۱

ابتدا طرفین روابط داده شده را به توان دو می‌رسانیم و سپس آن‌ها را با هم جمع می‌کنیم:

$$\begin{cases} \cos x + \cos y = \frac{1}{2} & \text{توان ۲} \\ \sin x + \sin y = \sqrt{3} & \text{توان ۲} \end{cases} \Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 y + ۲\cos x \cos y = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \cos^2 x + \cos^2 y + ۲\sin x \sin y = \frac{۳}{4}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\cos^2 x}_{1} + \underbrace{\sin^2 x}_{1} + \underbrace{\cos^2 y}_{1} + \underbrace{\sin^2 y}_{1} + ۲(\cos x \cos y + \sin x \sin y) = \frac{۳}{4}$$

$$= \frac{۳}{4} + \frac{۱}{4} \Rightarrow ۲\cos(x-y) = \frac{۳}{4} \Rightarrow \cos(x-y) = \frac{۳}{8}$$

۱ ۶۴۹

$$\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{۳}{۲} \Rightarrow \frac{\sin x \cos y + \sin y \cos x}{\sin x \cos y - \sin y \cos x} = \frac{۳}{۲}$$

$$۲\sin x \cos y + ۲\sin y \cos x = ۳\sin x \cos y - ۳\sin y \cos x$$

$$\sin x \cos y = \Delta \sin y \cos x \xrightarrow{+ \cos x \sin y} \frac{\sin x}{\cos x} \times \frac{\cos y}{\sin y} = \Delta$$

$$\tan x \cdot \cot y = \Delta \xrightarrow{\text{توان ۲}} (\tan x \cdot \cot y)^2 = \Delta$$

۱ ۶۴۵

با استفاده از رابطه بسط مجموع و تفاضل داریم:

$$\frac{\cos(\alpha - 2^\circ) + \cos(\alpha + 2^\circ)}{\sin(\alpha - 2^\circ) + \sin(\alpha + 2^\circ)} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \alpha \cos 2^\circ + \sin \alpha \sin 2^\circ + \cos \alpha \cos 2^\circ - \sin \alpha \sin 2^\circ}{\sin \alpha \cos 2^\circ - \cos \alpha \sin 2^\circ + \sin \alpha \cos 2^\circ + \cos \alpha \sin 2^\circ}$$

$$= \frac{2\cos \alpha \cos 2^\circ}{2\sin \alpha \cos 2^\circ} = \cot \alpha = \frac{1}{2}$$

باتوجه به این که $\cot \alpha = \frac{1}{2}$ است، داریم:

$$\begin{cases} \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \frac{4}{5} = ۰.۸$$

۱ ۶۴۶

$$\cos(x+y) \cos(x-y) + \sin(x+y) \sin(x-y) = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$$\Rightarrow \cos((x+y) - (x-y)) = \cos 2y = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

از طرفی با توجه به رابطه $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$ داریم:

$$\sin^2 y - \cos^2 y = -\cos 2y = -\frac{\sqrt{2}}{3}$$

این پهنه دیگه! توی همین سوال، طراح می‌توانست این پهنه را پرسه: «اگر x و y زاویه‌هایی هاده باشند، مقدار $\cos y$ کدام است؟»
 $\cos y = \frac{\sqrt{2}}{\mu} \Rightarrow \cos^2 y = \frac{2}{\mu^2} \Rightarrow \cos^2 y - 1 = \frac{2}{\mu^2} \Rightarrow \cos y = \sqrt{\frac{3+\sqrt{2}}{\mu^2}}$

۱ ۶۴۷

$$\frac{\tan \alpha}{\sqrt{3}} + \frac{2 \cos(\frac{\Delta\pi}{6} - \alpha)}{\sqrt{3} \cos \alpha} = \frac{3+4\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{2(\cos(\frac{\Delta\pi}{6}) \cos \alpha + \sin(\frac{\Delta\pi}{6}) \sin \alpha)}{\sqrt{3} \cos \alpha} = \frac{3+4\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha}{\sqrt{3} \cos \alpha} + \frac{2(-\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha)}{\sqrt{3} \cos \alpha} = \frac{3+4\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha}{\sqrt{3} \cos \alpha} = \frac{3+4\sqrt{3}}{3} \Rightarrow 6\sin \alpha - 3\sqrt{3} \cos \alpha$$

$$= (3\sqrt{3} + 12) \cos \alpha \Rightarrow 6\sin \alpha = (6\sqrt{3} + 12) \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{6\sqrt{3} + 12}{6} = \sqrt{3} + 2$$

۱ ۶۵۶

ضابطهٔ تابع f را با استفاده از رابطهٔ $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ ساده می‌کنیم:

$$f(x) = 4\sin x(1 - 2\sin^2 x) + 2\sin x = \frac{6\sin x - 8\sin^3 x}{2(3\sin x - 4\sin^3 x)}$$

$$\Rightarrow f(x) = 2\sin^3 x \Rightarrow f\left(\frac{4\pi}{9}\right) = 2\sin^3 \frac{4\pi}{9}$$

$$= 2\sin\left(4\pi - \frac{\pi}{3}\right) = 2\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -2\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$$

اینلاین

۴۳۰ نسبت مثلثاتی ۳α و ۲α

اگر در روابط مثلثاتی $\cos(\alpha + \beta)$ و $\sin(\alpha + \beta)$ به جای β زاویهٔ 2α قرار دهیم، آن‌گاه نسبت‌های مثلثاتی زاویهٔ 3α به دست می‌آیند.

$$\sin 3\alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha \quad \cos 3\alpha = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

۱ ۶۵۷

ابتدا رابطهٔ داده شده را ساده می‌کنیم:

$$A = 1 + 7\sin^2 x + 12\sin 2x = 1 + \frac{7(1 - \cos 2x)}{2} + 12\sin 2x$$

$$= \frac{27}{2} + 12\sin 2x - \frac{7}{2}\cos 2x$$

حال با استفاده از نامساوی $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a\sin \theta + b\cos \theta \leq \sqrt{a^2 + b^2}$

$$-\sqrt{144 + \frac{49}{4}} \leq 12\sin 2x - \frac{7}{2}\cos 2x \leq \sqrt{144 + \frac{49}{4}}$$

$$\Rightarrow -\frac{25}{2} \leq 12\sin 2x - \frac{7}{2}\cos 2x \leq \frac{25}{2}$$

$$\frac{+27}{2} \rightarrow \frac{27}{2} - \frac{25}{2} \leq \frac{27}{2} + 12\sin 2x - \frac{7}{2}\cos 2x \leq \frac{27}{2} + \frac{25}{2}$$

$$\Rightarrow 1 \leq A \leq 26$$

۱ ۶۵۸

$$\begin{cases} 1) \cos \hat{A} \cos \hat{B} = \frac{1}{4} \\ 2) \sin \hat{A} \sin \hat{B} = \frac{1}{4} \end{cases} \xrightarrow{(1)-(2)} \cos \hat{A} \cos \hat{B} - \sin \hat{A} \sin \hat{B} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos(\hat{A} + \hat{B}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \hat{A} + \hat{B} = 6^\circ$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 18^\circ \rightarrow \hat{C} = 18^\circ - 6^\circ = 12^\circ$$

۱ ۶۵۹

با توجه به این که $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 18^\circ$ است، رابطهٔ داده شده را ساده

$$\underbrace{\cos \frac{\hat{B}}{2} \cos \frac{\hat{C}}{2} - \sin \frac{\hat{B}}{2} \sin \frac{\hat{C}}{2}}_{\cos(\frac{\hat{B}}{2} + \frac{\hat{C}}{2})} + \sin \frac{\hat{A}}{2} = 1 \quad \text{می‌کنیم:}$$

$$\Rightarrow \cos(\underbrace{\frac{\hat{B}}{2} + \frac{\hat{C}}{2}}_{90^\circ - \frac{\hat{A}}{2}}) + \sin \frac{\hat{A}}{2} = 1 \Rightarrow \sin \frac{\hat{A}}{2} + \sin \frac{\hat{A}}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\hat{A}}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{\hat{A}}{2} = 30^\circ \Rightarrow \hat{A} = 6^\circ$$

۱ ۶۵۲

$$\sin x + \cos y = \pi - 3$$

$$\xrightarrow{\text{توان}} \sin^2 x + \cos^2 y + 2\sin x \cos y = \pi^2 - 6\pi + 9 \quad (1)$$

اگر رابطهٔ $(\sin y + \cos x)^2 = A$ را برابر با A فرض کنیم، داریم:

$$(\sin y + \cos x)^2 = A \Rightarrow \sin^2 y + \cos^2 x + 2\sin y \cos x = A \quad (2)$$

حال طرفین رابطهٔ (1) و (2) را با هم جمع می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x + \cos^2 y + \sin^2 y + 2\sin x \cos y + 2\sin y \cos x \\ = \pi^2 - 6\pi + 9 + A \Rightarrow 2 + 2(\underbrace{\sin x \cos y + \sin y \cos x}_{\sin(x+y)}) \\ = \pi^2 - 6\pi + 9 + A \end{aligned}$$

$$2(\pi^2 - 3\pi) = \pi^2 - 6\pi + 7 + A \Rightarrow A = \pi^2 - 7$$

۱ ۶۵۳

$$\frac{\tan x}{\cos x}(1 - \sin x) = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{\sin x(1 - \sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\sin x - \sin^2 x}{1 - \sin^2 x} = \frac{1}{4} \Rightarrow 4\sin x - 4\sin^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$3\sin^2 x - 4\sin x + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c} 3 \\ \diagdown \\ 1 \\ \diagup \\ 2\sqrt{2} \end{array} \Rightarrow \cos x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x = 2\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) = \frac{4\sqrt{2}}{9}$$

حال با توجه به این که $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{7}{9}$ است و داریم:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{\pi}{4} - 2x\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2x\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 2x - \sin 2x) - \cos 2x \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{7}{9} - \frac{4\sqrt{2}}{9}\right) - \frac{7}{9} = \frac{7\sqrt{2}}{18} - \frac{7}{18} - \frac{14}{18} = \frac{7\sqrt{2} - 22}{18} \end{aligned}$$

۱ ۶۵۴

$$\sin(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x) = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \sin x - \cos x = \frac{\sqrt{2}}{3} \xrightarrow{\text{توان}} 1 - \sin 2x = \frac{2}{9} \Rightarrow \sin 2x = \frac{7}{9}$$

$$\text{حال با توجه به این که } \sin 2x = \frac{7}{9} \text{ و } \sin x - \cos x = \frac{\sqrt{2}}{3} \text{ است،}$$

با جای‌گذاری در رابطهٔ صورت سؤال داریم:

$$\sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 3\sin 2x = m$$

$$\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{3} + 3\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) = m \Rightarrow m = 3$$

۱ ۶۵۵

$$\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \cos x - \sin x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \xrightarrow{\text{توان}} 1 - \sin 2x = \frac{2}{3} \Rightarrow \sin 2x = \frac{1}{3}$$

$$\text{حال با توجه به این که } \sin 2x = \frac{1}{3} \text{ و } \cos x - \sin x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \text{ است،}$$

داریم: $m(\cos x - \sin x) - 3\sqrt{6} \sin 2x = \sqrt{6}$

$$\Rightarrow m\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) - 3\sqrt{6}\left(\frac{1}{3}\right) = \sqrt{6} \xrightarrow{x\sqrt{6}} 2m - 6 = \sqrt{6} \Rightarrow m = 6$$

۳ ۶۶۴

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = ۲ + \tan \beta = ۴$$

$$\Rightarrow ۴ - ۱۲ \tan \beta = ۲ + \tan \beta \Rightarrow \tan \beta = \frac{1}{12}$$

مثال

۳ ۶۶۵

اتحاد برای محاسبه تانژانت مجموع دو زاویه، از اتحاد های زیر استفاده می کنیم:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

در رابطه بالا اگر به جای β زاویه $\frac{\pi}{4}$ قرار دهیم، به رابطه های پر کاربرد زیر می رسیم:

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \frac{1 - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha}$$

با توجه به این که $\cot y = \frac{1}{\tan y}$ است، پس $\tan y = ۳$ می باشد.

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2\left(\frac{1}{3}\right)}{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{1}{15}$$

همچنین $\tan(2x+y) = \frac{\tan 2x + \tan y}{1 - \tan 2x \tan y} = \frac{\frac{1}{15} + 3}{1 - \frac{1}{15} \times 3} = \frac{53}{-3} = -\frac{53}{9}$

با توجه به رابطه $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}$ داریم:

$$\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \frac{1 + \tan 2x}{1 - \tan 2x} = \frac{1 + \frac{1}{15}}{1 - \frac{1}{15}} = \frac{16}{14} = \frac{8}{7}$$

$$\tan(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2 + 2 \tan x = 1 - \tan x \Rightarrow \tan x = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{2\left(\frac{1}{3}\right)}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$\tan(\alpha - \beta) \tan(\alpha + \beta) = 1 \Rightarrow \tan(\alpha + \beta) = \frac{1}{\tan(\alpha - \beta)}$

$$\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{1 + \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta}$$

$$\Rightarrow \tan^2 \alpha - \tan^2 \beta = 1 - \tan^2 \alpha \tan^2 \beta$$

$$\Rightarrow \tan^2 \alpha + \tan^2 \alpha \tan^2 \beta = 1 + \tan^2 \beta$$

$$\Rightarrow \tan^2 \alpha (1 + \tan^2 \beta) = 1 + \tan^2 \beta \xrightarrow{\div (1 + \tan^2 \beta)} \tan^2 \alpha = 1$$

۳ ۶۶۵

$$(\sin A + \cos B)^2 + (\sin B + \cos A)^2 = ۲ + \sqrt{۲}$$

$$\Rightarrow \sin^2 A + \cos^2 B + ۲ \sin A \cos B + \sin^2 B + \cos^2 A + ۲ \sin B \cos A = ۲ + \sqrt{۲}$$

$$\Rightarrow ۲ + ۲(\sin A \cos B + \sin B \cos A) = ۲ + \sqrt{۲}$$

$$\Rightarrow \sin(A+B) = \frac{\sqrt{۲}}{2}$$

حال با توجه به این که $A + B = ۱۸^\circ$ است، داریم:

$$\sin(A+B) = \sin(18^\circ - C) = \frac{\sqrt{۲}}{2}$$

$$\Rightarrow \sin C = \frac{\sqrt{۲}}{2} \Rightarrow C = ۴۵^\circ \text{ یا } ۱۳۵^\circ$$

۳ ۶۶۶

با توجه به صورت سؤال $\hat{A} = \hat{B} + ۴۵^\circ$ است. پس:

$$\cos \hat{A} = \cos(\hat{B} + ۴۵^\circ) = \cos B \cos ۴۵^\circ - \sin B \sin ۴۵^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{۲}}{2} (\cos B - \sin B)$$

از طرفی می دانیم $\sin C = \sin(\pi - (A+B)) = \sin(A+B)$ است، پس:

$$2 \cos A \sin B - \sin C = 2 \times \frac{\sqrt{۲}}{2} (\cos B - \sin B) \sin B - \sin(A+B)$$

$$= \frac{\sqrt{۲}}{2} (2 \sin B \cos B - 2 \sin^2 B) - (\sin 2B \cos 45^\circ + \sin 45^\circ \cos 2B)$$

$$= \frac{\sqrt{۲}}{2} (\sin 2B + \cos 2B - 1) - \frac{\sqrt{۲}}{2} (\sin 2B + \cos 2B) = -\frac{\sqrt{۲}}{2}$$

۳ ۶۶۷

پیشنهاد با توجه به صورت سؤال $\hat{A} = \hat{B} + ۴۵^\circ$ است. می توانیم فرض کنیم $\hat{B} = ۴۵^\circ$ و $\hat{A} = ۹۰^\circ$ است. پس $\hat{C} = ۴۵^\circ$ می باشد.

$$2 \cos A \sin B - \sin C = \underbrace{2 \cos 90^\circ \sin 45^\circ}_{0} - \sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{۲}}{2}$$

۳ ۶۶۸

با توجه به این که $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ است و داریم:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \cos \alpha & \sin \alpha \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \alpha \sin \alpha - (-\sin \alpha) \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \cos \alpha \sin \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\cot \alpha} = \cot \alpha + \tan \alpha = \frac{2}{\sin 2\alpha} = \frac{2}{\frac{1}{2}} = 4$$

۳ ۶۶۹

$$\begin{vmatrix} \sin^2 a & \sin^2 b \\ \cos^2 a & \cos^2 b \end{vmatrix} = \sin^2 a \cos^2 b - \sin^2 b \cos^2 a$$

$$= (\sin a \cos b - \sin b \cos a)(\sin a \cos b + \sin b \cos a)$$

$$= \sin(a-b) \sin(a+b) \xrightarrow{a+b=\frac{\pi}{2}} \sin(a - (\frac{\pi}{2} - b)) \sin \frac{\pi}{2}$$

$$= \sin(\frac{\pi}{2} - a) = -\cos a$$

حال چون $C = \pi - (A+B)$ است؛ داریم:

$$\tan C = \tan(\pi - (A+B)) = -\tan(A+B) = -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

$$= \frac{\frac{4}{3} + 2}{1 - \frac{4}{3} \times 2} = -\frac{\frac{10}{3}}{-\frac{5}{3}} = 2$$

با استفاده از اتحاد مزدوج داریم:

$$\begin{aligned} \frac{\tan 22^\circ - \tan 18^\circ}{1 - \tan 22^\circ \tan 18^\circ} &= \frac{\tan 22^\circ + \tan 18^\circ}{1 - \tan 22^\circ \tan 18^\circ} \times \frac{\tan 22^\circ - \tan 18^\circ}{1 + \tan 22^\circ \tan 18^\circ} \\ &= \underbrace{\tan(22^\circ + 18^\circ)}_1 \times \tan(22^\circ - 18^\circ) = \tan 4^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) + \tan(\alpha - \frac{\pi}{4})}{1 - \tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) \tan(\alpha - \frac{\pi}{4})} &= \tan((\alpha + \frac{\pi}{4}) + (\alpha - \frac{\pi}{4})) \\ &= \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \end{aligned}$$

حال با توجه به این که $\cos \alpha$ و انتهای کمان α در ربع چهارم است، داریم:

$$\begin{aligned} \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} &\Rightarrow \begin{array}{c} \text{hypotenuse} \sqrt{3} \\ \text{adjacent} 1 \\ \text{angle } \alpha \end{array} \Rightarrow \tan \alpha = -\sqrt{2} \\ \Rightarrow \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} &= \frac{2(-\sqrt{2})}{1 - (-\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\tan x = \frac{2 - \tan y}{1 + 2 \tan y} \Rightarrow \tan x + 2 \tan x \tan y = 2 - \tan y$$

$$\tan x + \tan y = 2(1 - \tan x \tan y)$$

$$\frac{2(1 - \tan x \tan y)}{1 - \tan x \tan y} \Rightarrow \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y} = 2 \Rightarrow \tan(x+y) = 2$$

$$\begin{aligned} \frac{1 - \tan(\frac{\pi}{6} + x) \cdot \tan(\frac{\pi}{6} - x)}{\tan(\frac{\pi}{6} + x) + \tan(\frac{\pi}{6} - x)} &= \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{6} + x) + \tan(\frac{\pi}{6} - x)} \\ &= \frac{1}{\tan((\frac{\pi}{6} + x) + (\frac{\pi}{6} - x))} = \frac{1}{\tan \frac{\pi}{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

با توجه به این که $A + B + C = 180^\circ$ است؛ داریم:

$$\begin{aligned} \tan C &= -\tan(A+B) \Rightarrow \tan C = -\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} \\ &= -\frac{\frac{2}{3} + 2}{1 - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3}} = \frac{11}{3} \Rightarrow \cot C = \frac{1}{\tan C} = \frac{1}{11} = \frac{3}{11} \end{aligned}$$

مجموع دو زاویه $\frac{\pi}{4} - \alpha$ و $\frac{\pi}{4} + \alpha$ است؛ در نتیجه:

$$\tan(\frac{\pi}{4} + \alpha + \frac{\pi}{4} - \alpha) = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan(\frac{\pi}{4} + \alpha) + \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{1 - \tan(\frac{\pi}{4} + \alpha) \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)} = 1 \xrightarrow{\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) = x} \frac{\frac{3}{2} + x}{1 - \frac{3}{2} x} = 1$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{3}{2} x = \frac{3}{2} + x \Rightarrow -\frac{1}{2} = \frac{5}{2} x$$

$$\Rightarrow x = -\frac{1}{5} \Rightarrow \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) = -\frac{1}{5}$$

با کمک زاویه های $2x - 2y$ و $x + 2y$ داریم:

$$\tan(\gamma x - \gamma y + x + \gamma y) = \frac{\tan(2x - 2y) + \tan(x + 2y)}{1 - \tan(2x - 2y) \tan(x + 2y)}$$

$$\Rightarrow \tan 3x = \frac{4+2}{1-4\times 2} = -\frac{6}{5} \Rightarrow \cot 3x = -\frac{5}{6}$$

$$\cos^2 A + \cos^2 B + 2 \cos A \cos B + \sin^2 A$$

$$+ \sin^2 B + 2 \sin A \sin B = 3$$

$$\Rightarrow 3 + 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B) = 3 \Rightarrow 2 \cos(A-B) = 1$$

$$\Rightarrow \cos(A-B) = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\cos^2(A-B)} = 4$$

$$\Rightarrow 1 + \tan^2(A-B) = 4 \Rightarrow \tan^2(A-B) = 3$$

ابتدا طرفین تساوی های داده شده را با هم جمع می کنیم:

$$\begin{cases} 1) \sin x \cos y = \frac{1}{5} \\ 2) \sin y \cos x = \frac{3}{10} \end{cases} \xrightarrow{(1)+(2)} \sin x \cos y + \sin y \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin(x+y) = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{array}{c} \text{hypotenuse} 1 \\ \text{opposite} x+y \\ \text{adjacent} \sqrt{3} \end{array}$$

$$\Rightarrow \tan(x+y) = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$


$$\frac{\tan 2x - \tan x}{1 + \tan x \tan 2x} = \tan(2x - x) = \tan x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2(\frac{1}{2})}{1 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

$$\begin{array}{c} \text{hypotenuse} \sqrt{5} \\ \text{opposite } A \\ \text{adjacent } 3 \end{array} \Rightarrow \tan A = \frac{4}{3}$$

$$\cot B = \frac{1}{\tan B} = 2$$

۳ ۶۹۰




حال با توجه به این که $\theta = \beta - \alpha$ می‌باشد، داریم:

$$\sin \theta = \sin(\beta - \alpha) = \sin \beta \cos \alpha - \cos \beta \sin \alpha$$

$$\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{2}{\sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$


۳ ۶۹۱



$$\begin{aligned} \tan(T \hat{O} B) &= \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \\ &= \frac{3 - 1}{1 + 3 \times 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$


۳ ۶۹۲

ابتدا $\tan(\alpha + \theta)$ و $\tan \alpha$ را به دست می‌آوریم:



۳ ۶۹۳

باتوجه به این که $EC = 2DE$ است پس $DC = DE + EC = 3DE$ می‌باشد. همچنین $BC = BF + CF = \frac{5}{2}BF$ است پس $CF = \frac{3}{2}BF$ می‌باشد. بنابراین:



۳ ۶۸۶

باتوجه به این که $37^\circ + \lambda^\circ = 45^\circ$ است؛ داریم:

$$\tan(37^\circ + \lambda^\circ) = \tan 45^\circ \Rightarrow \frac{\tan 37^\circ + \tan \lambda^\circ}{1 - \tan 37^\circ \tan \lambda^\circ} = 1$$

$$\Rightarrow \tan 37^\circ + \tan \lambda^\circ = 1 - \tan 37^\circ \tan \lambda^\circ$$

$$\Rightarrow \tan 37^\circ + \tan \lambda^\circ + \tan 37^\circ \tan \lambda^\circ = 1$$

$$\xrightarrow{+1} 1 + \tan 37^\circ + \tan \lambda^\circ (1 + \tan 37^\circ) = 2$$

$$(1 + \tan 37^\circ)(1 + \tan \lambda^\circ) = 2$$

۳ ۶۸۷

$$\frac{\sin(2\alpha + \beta)}{\sin \beta} = \frac{\sin 2\alpha \cos \beta + \sin \beta \cos 2\alpha}{\sin \beta}$$

$$= \sin 2\alpha \cot \beta + \cos 2\alpha = a$$

حال حاصل عبارت خواسته شده را به دست می‌آوریم:

$$\frac{\tan \alpha}{\tan(\alpha + \beta)} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)}} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}}$$

$$= \frac{\sin \alpha \cos \alpha \cos \beta - \sin^2 \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos^2 \alpha} = \frac{\frac{1}{2} \sin 2\alpha \cos \beta - \sin^2 \alpha \sin \beta}{\frac{1}{2} \sin 2\alpha \cos \beta + \sin \beta \cos^2 \alpha}$$

$$= \frac{\sin 2\alpha \cot \beta - \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha \cot \beta + \sin \beta \cos^2 \alpha} = \frac{\sin 2\alpha \cot \beta + \cos 2\alpha - 1}{\sin 2\alpha \cot \beta + \cos 2\alpha + 1} = \frac{a - 1}{a + 1}$$

۳ ۶۸۸

$$f(x) = \frac{1}{1 + \tan x} \xrightarrow{\text{طول و عرض نقاط دو برابر}} y = \frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}}$$

$$\xrightarrow{\text{یک واحد سمت پایین}} y = \frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} - 1 = \frac{1 - \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan \frac{x}{2}}$$

$$= \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) = \tan\left(\frac{\pi - 2x}{4}\right)$$

۳ ۶۸۹

$$x_1 + x_2 = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \tan(x_1 + x_2) = \tan \frac{3\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan x_1 + \tan x_2}{1 - \tan x_1 \tan x_2} = -1$$


$$\Rightarrow \tan x_1 + \tan x_2 = \tan x_1 \tan x_2 - 1 \quad (1)$$

از طرفی با توجه به معادله $x^2 - 2kx + k - 1 = 0$ داریم:

$$\tan x_1 + \tan x_2 = -\frac{b}{a} = 2k, \tan x_1 \tan x_2 = \frac{c}{a} = k - 1$$

$$\xrightarrow{(1)} 2k = k - 1 - 1 \Rightarrow k = -2$$

۱۶۹۷




حال با توجه به این‌که $\theta = \pi - (\alpha + \beta)$ است، داریم:

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \cos(\pi - (\alpha + \beta)) = -\cos(\alpha + \beta) \\ &= -(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) = -\left(\frac{4}{5} \times \frac{5}{13} - \frac{3}{5} \times \frac{12}{13}\right) = \frac{16}{65} \end{aligned}$$


۱۶۹۸

با توجه به این‌که $\tan(FMA) = \tan(\alpha + \beta)$ است؛ داریم:



۱۶۹۹

با توجه به این‌که θ زاویه خارجی مثلث ABC می‌باشد؛ پس $\theta = \alpha + \beta$ است. بنابراین:




۱۷۰۰

ابتدا با استفاده از رابطه فیثاغورث در مثلث DBE طول ضلع DE را به دست می‌آوریم:

$$(DE)^2 = (2\sqrt{2})^2 + 1^2 = 9 \Rightarrow DE = 3$$

حال چون در مثلث DEF رابطه فیثاغورث برقرار می‌باشد، پس این مثلث قائم‌الزاویه است. بنابراین:




حال چون $\alpha = \frac{\pi}{2} - (x+y)$ است و داریم:

$$\begin{aligned} \tan \alpha &= \tan\left(\frac{\pi}{2} - (x+y)\right) = \cot(x+y) = \frac{1}{\tan(x+y)} \\ &= \frac{1}{\frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}} = \frac{1 - \tan x \tan y}{\tan x + \tan y} = \frac{1 - \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{3}} \\ &= \frac{\frac{13}{12}}{\frac{11}{12}} = \frac{13}{11} \end{aligned}$$


۱۶۹۸

چون θ زاویه خارجی می‌باشد پس $\theta = \pi - (\alpha + \beta)$ است و داریم:



۱۶۹۸

چون $|BC| = \frac{2}{3}|CD| + |CD| = \frac{5}{3}|CD|$ است پس $|BD| = \frac{2}{3}|CD|$ است.



$$\begin{aligned} \Rightarrow 3x + 3 &= 5 - 5x \Rightarrow 8x = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{4} \\ \text{ابتدا } x \text{ و } \tan y \text{ را به دست می‌آوریم:} \end{aligned}$$

ابتدا $x = \frac{3}{4}$ ، $\tan y = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} \text{حال با توجه به این‌که } \alpha &= \frac{\pi}{2} - (x+y) \text{ است؛ داریم:} \\ \tan \alpha &= \tan\left(\frac{\pi}{2} - (x+y)\right) = \cot(x+y) = \frac{1}{\tan(x+y)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}} = \frac{1 - \tan x \tan y}{\tan x + \tan y} = \frac{1 - \frac{3}{4} \times \frac{1}{4}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{13}{16}}{\frac{4}{4}} = \frac{13}{16} \end{aligned}$$