



(خارج از کشور ۹۲ با تغییر)

۱. شکل مقابل نشانگر کدام است؟

- (۱) فسیل تریلوبیت
- (۲) امواج ریلی
- (۳) جریان دریایی سطحی
- (۴) کهکشان راه شیری

۲. اجرام مختلف تشکیل دهنده یک کهکشان تحت تأثیر کدام نیروها در کنار هم قرار می‌گیرند؟ (خارج از کشور ۹۸)

- (۱) گرانش متقابل
- (۲) گرانش هسته
- (۳) حاصل از انفجار اولیه
- (۴) الکتروستاتیک کولنی

۳. همه عبارت‌ها مفهوم درستی را از «ویژگی‌های کهکشان راه شیری» بیان می‌کنند، به جز:

- (۱) خورشید در یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار گرفته است.
- (۲) از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای تشکیل شده است.
- (۳) براساس اندازه‌گیری‌های نجومی، احتمال دور شدن آن، از سایر کهکشان‌ها وجود دارد.
- (۴) گرد و غبارهای بین ستاره‌ها و سیاره‌ها، تحت تأثیر نیروی گرانشی متقابل، استقرار یافته است.

## ✓ پاسخ تست نمونه

۱. گزینه «۴» کهکشان راه شیری مارپیچی‌شکل است که منظومه شمسی ما در لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد.
۲. گزینه «۱» اجزای تشکیل دهنده کهکشان‌ها شامل تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای (اغلب گاز و گرد و غبار) هستند که تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل یکدیگر رانگه داشته‌اند.
۳. گزینه «۱» کهکشان‌ها از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای (اغلب گاز و گرد و غبار) تشکیل شده‌اند که تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل یکدیگر رانگه داشته‌اند. کیهان در حال گسترش است و کهکشان‌ها در حال دورشدن از یکدیگر هستند. نوار مهمناندو کم‌نوری که شامل انبوهای از اجرام در شب‌های صاف و بدون ابر مشاهده می‌شود، کهکشان راه شیری نام دارد. کهکشان راه شیری مارپیچی‌شکل است که منظومه شمسی ما، در لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد.



## ۴ نظرات دانشمندان مختلف در مورد منظومه شمسی


۴

مشاوره علاوه بر یادگیری مفاهیم اولیه در این بسته، موارد موجود را به صورت مقایسه‌ای نیز به خاطر بسپارید.

کوپرنیک	بطلمیوس
۱ ارائه نظریه خورشید مرکزی	۱ ارائه نظریه زمین مرکزی
۲ زمین به همراه ماه و دیگر سیارات به دور خورشید می‌چرخد.	۲ زمین در مرکز عالم قرار دارد (ثابت است) و ماه و
۳ مدار حرکت سیارات: دایره‌ای شکل خورشید و ۵ سیاره عطارد، زهره، مریخ، مشتری و	۳ خورشید و ۵ سیاره عطارد، زهره، مریخ، مشتری و
۴ جهت چرخش سیارات: مخالف حرکت عقربه‌های ساعت زحل به دور آن می‌چرخد.	۴ مدار حرکت سیارات: دایره‌ای شکل
۵ حرکت روزانه خورشید در آسمان، ظاهری و نتیجه چرخش زمین به دور محور خود است.	۵ جهت چرخش سیارات: مخالف حرکت عقربه‌های ساعت
۶ نزدیک‌ترین سیاره به خورشید: عطارد دورترین سیاره از خورشید: زحل	۶ نزدیک‌ترین جرم آسمانی به زمین: ماه دورترین سیاره نسبت به زمین: زحل



## ارتباط زاویه تابش نور خورشید با فصول مختلف سال



وضعیت	مکان	زمان
طول روز و شب مساوی	عمود بر مدار استوا	اول بهار
—	عمود بر عرض‌های جغرافیایی بالاتر	در طول بهار
طولانی‌ترین روز و کوتاه‌ترین شب	عمود بر مدار رأس السرطان	در اول تابستان
—	عمود بر عرض‌های جغرافیایی کمتر از $23^{\circ}5$ درجه	در طول تابستان
طول شب و روز مساوی	عمود بر مدار استوا	در اول پاییز
طولانی‌ترین شب و کوتاه‌ترین روز	عمود بر مدار رأس الجدی	در اول زمستان

★ **حوالهای باش** ۱ فصل‌ها در نیمکره شمالی و جنوبی عکس یکدیگر هستند. ۲ جهت سایه در نیمکره شمالی (در مدارهای بالاتر از رأس السرطان) به سمت شمال و در نیمکره جنوبی (در مدارهای پایین‌تر از رأس الجدی) به سمت جنوب است.

## تست نمونه

- روی دایره استوا میله‌ای را به صورت عمود بر زمین نصب کردہ‌ایم. طول سایه این میله به هنگام ظهر شرعی چه روزهایی تقریباً یکسان است؟  
(سراسری ۸۵)  
۱) اول تیر و اول دی ۲) اول مهر و اول تیر ۳) اول فروردین و اول تیر ۴) همه روزهای سال
- میله‌ای در روی مدار استوا بر زمین عمود است. جهت سایه این میله به هنگام ظهر شرعی در طول سال کدام است?  
(خارج از کشور ۸۵)  
۱) تمام سال به سمت شمال ۲) در طول سال یک دور کامل به دور میله می‌چرخد.  
۳) حدود ۶ ماه به سمت شمال و حدود ۶ ماه به سمت جنوب  
۴) حدود ۶ ماه سایه ندارد، ۳ ماه به سمت شمال و ۳ ماه به سمت جنوب
- زمانی که در قطب جنوب مدت زمان شب ۱۲ ساعت است، در همان موقع، مدت شب به ترتیب در استوا و قطب شمال چند ساعت است؟  
(خارج از کشور ۸۶)  
۱) ۱۲-۱۲ ۲) ۱۸-۱۲ ۳) ۲۴-۱۲ ۴) ۲۴-۱۸



**۶. گزینه «۳»** جهت سایه اجسام در نیمکره شمالی به سمت شمال و در نیمکره جنوبی به سمت جنوب می‌باشد. با توجه به این که خورشید در نیمکره جنوبی در اول زمستان بر مدار رأسالجدى ( $23^{\circ} / 5$  درجه جنوبی) تابش قائم دارد، پس سایه‌ای تشکیل نمی‌شود. در نتیجه سایه از عرض‌های  $23^{\circ} / 5$  درجه جنوبی به بعد و تا حدود  $90$  درجه جنوبی تشکیل می‌شود و جهت آن به سمت جنوب خواهد بود.

**۷. گزینه «۴»** در اواخر بهار، خورشید بر مدار رأسالسرطان ( $23^{\circ} / 5$  شمالی) عمود می‌تابد که در این حالت اجسام سایه ندارند.  $15$  روز بعد از پنجم خرداد یعنی در بیستم خرداد، در عرض جغرافیایی  $17$  درجه شمالی (مدار نزدیک به  $5 / 23$  درجه)، خورشید از عرض جغرافیایی بالاتری می‌تابد. برای این که سایه میله به سمت جنوب باشد، باید اجسام در عرض‌های جغرافیایی کمتر از  $5 / 23$  درجه شمالی قرار داشته باشند.

**۸. گزینه «۲»** شب و روز بر اثر حرکت وضعی زمین به وجود می‌آیند. انحراف  $5 / 23$  درجه‌ای محور زمین نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید، سبب ایجاد اختلاف مدت زمان روز و شب در عرض‌های جغرافیایی مختلف می‌شود. بدطوری که در مناطق استوایی طول مدت شب و روز در تمام مدت سال برابر است ( $12$  ساعت روز و  $12$  ساعت شب) و در سایر نقاط با افزایش عرض جغرافیایی، این اختلاف بیشتر می‌شود.

**۹. گزینه «۱»** حرکت زمین و انحراف  $5 / 23$  درجه‌ای محور آن نسبت به خط عمود بر سطح مدار گردش زمین به دور خورشید، باعث می‌شود زاویه تابش نور خورشید در عرض‌های جغرافیایی مختلف، متفاوت باشد. به عنوان مثال خورشید در اول تیرماه بر مدار رأسالسرطان تابش قائم دارد.



## تکوین زمین و آغاز زندگی در آن



**مشاوره** در سال‌های اخیر سوالات زیادی از این موضوع حفظی طرح شده است. پس آن را به خوبی یاد بگیرید.

### مراحل تکوین زمین

سرد شدن گوی مذاب با گذشت زمان و تشکیل سنگ‌های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ‌کره (حدود  $4$  میلیارد سال قبل)

تشکیل سیاره زمین به صورت کره‌ای مذاب و قرارگیری در مدار خود (حدود  $4 / 6$  میلیارد سال قبل)

تجمع ذرات کیهانی و آغاز شکل‌گیری منظومه شمسی (حدود  $6$  میلیارد سال قبل)

تشکیل اقیانوس‌ها و ایجاد زیستکره تحت تأثیر انرژی خورشید






سردتر شدن کره زمین و تبدیل بخار آب به مایع و تشکیل آب‌کره

فوران آتشفسان‌های متعدد و خروج تدریجی گازهای اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن و... از داخل زمین و تشکیل هوکره


حرکت ورقه‌های سنگ‌کره و تشکیل سنگ‌های دگرگونی تحت تأثیر فشار و گرمای زیاد

ایجاد چرخه آب، فرسایش، رسوب‌گذاری و تشکیل سنگ‌های رسوبی

آغاز زندگی تکیاخته‌ها در دریاهای کم‌عمق



(سراسری ۱۴۰)



(خارج از کشور ۱۴۰)



۳. به ترتیب، جوانترین و مسن‌ترین پدیده‌های زمین‌شناسی، در شکل مقابل کدام‌اند؟

(خارج از کشور ۹۳)

۱) گسل F<sub>1</sub> و تزریق توده نفوذی

۲) گسل F<sub>2</sub> و رسوب‌گذاری لایه‌های ۱ تا ۳

۳) تزریق توده نفوذی و تشکیل لایه‌های ۱ تا ۶

۴) رسوب‌گذاری لایه‌های ۴ تا ۶ و رسوب‌گذاری لایه‌های ۱ تا ۳

۴. کدام گزینه سه پدیده زمین‌شناسی متوالی را در شکل مقابل معرفی می‌کند؟

(خارج از کشور ۹۴)

۱) رسوب‌گذاری، فرسایش، چین‌خوردگی

۲) نفوذ توده A، نفوذ توده B، فرسایش

۳) رسوب‌گذاری، چین‌خوردگی، نفوذ توده A

۴) فرسایش، رسوب‌گذاری مجدد، نفوذ توده B

۵. کدام ترتیب سن نسبی را نمی‌توانیم برای شکل مقابل به کار ببریم؟

(سراسری ۹۵)

۱) رسوب‌گذاری، چین‌خوردگی، شکستگی

۲) رسوب‌گذاری، شکستگی، نفوذ مایما

۳) چین‌خوردگی، شکستگی، نفوذ مایما

۴) شکستگی، نفوذ مایما، فرسایش

۶. کدام عبارت برای شکل مقابل درست است؟

۱) B قدیمی‌تر از D و E جدیدتر از F

۲) C قدیمی‌تر از F و A جدیدتر از D

۳) C جدیدتر از B و A قدیمی‌تر از D

۴) F جدیدتر از C و D قدیمی‌تر از A

۷. سن نسبی کدام لایه یا توده نفوذی از بقیه کمتر است؟ (خارج از کشور ۹۷)

A (۱)

B (۲)

C (۳)

D (۴)

۸. در شکل زیر، سن نسبی کدام‌یک از بقیه بیشتر است؟

۱) رس

۲) گسل

۳) گرانیت

۴) سنگ آهک




۹. سن نسبی سنگ‌های شکل زیر از قدیم به جدید، کدام است؟

۱) نفوذی B، ماسه‌سنگ، سنگ آهک، نفوذی A

۲) ماسه‌سنگ، سنگ آهک، نفوذی A، نفوذی B

۳) ماسه‌سنگ، نفوذی B، سنگ آهک، نفوذی A

۴) ماسه‌سنگ، سنگ آهک، نفوذی B، نفوذی A





## مزوزویک

**مشاوره** مانند بسته قبل، توجه به زمان‌های زمین‌شناسی و جانداران شاخص هر یک از دوره‌ها مهم استند.

فصل

۳۹

زمین‌شناسی	کرتاسه	انقراض دایناسورها نخستین گیاهان گل‌دار	۶۶
	ژوراسیک	نخستین پرنده	
	تریاس	نخستین پستاندار نخستین دایناسور	۲۵۱

دومین دوران از ائون فانروزویک

بازه زمانی: ۲۵۱ تا ۶۶ میلیون سال پیش

دوره‌های زمانی دوران مزوزویک (از قدیم به جدید):



تریاس: ۱- نخستین دایناسور ۲- نخستین پستاندار

ژوراسیک: نخستین پرنده

کرتاسه: ۱- نخستین گیاهان گل‌دار ۲- انقراض دایناسورها

دایناسورها پستاندارانی بودند که در اوایل مزوزویک ظاهر و در اواخر مزوزویک منقرض شدند.

تست نمونه

۱. برای یافتن نخستین آثار پستانداران رسوبات کدام دوره را باید مطالعه کرد؟ (سراسری ۸۸ با تغییر)

- (۱) تریاس      (۲) کرتاسه      (۳) نئوژن      (۴) سیلورین



۲. از زمان ظهور تریلوبیت‌ها تا نابودی دایناسورها، منطقه زیر چند بار خارج از آب قرار گرفته است؟ (سراسری ۸۹ با تغییر)

- (۱) ۲      (۲) ۳      (۳) ۴      (۴) ۵



مثال	وقایع و پدیده‌های حاصل از حرکت ورقه‌ها	نوع ورقه	نوع حرکت
—	<p>۱ فروزانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای به علت چگالی بیشتر ورقه اقیانوسی</p> <p>۲ تشکیل سنگ‌های آذرین درونی</p> <p>۳ ایجاد آتشفسان‌های انفجاری</p>	۱- یک ورقه اقیانوسی و یک ورقه قاره‌ای (اقیانوسی-قاره‌ای)	
درازگودال ماریانا در غرب اقیانوس آرام	<p>۱ فروزانش یک ورقه به زیر ورقه دیگر</p> <p>۲ ایجاد پدیده‌های آتشفسانی در بستر دریا</p> <p>۳ ایجاد درازگودال‌های اقیانوسی و جزایر قوسی</p> <p>۴ ایجاد زلزله‌های عمیق</p>	۲- دو ورقه اقیانوسی (اقیانوسی-اقیانوسی)	ورقه‌های نزدیک‌شونده (همگرا)
۱ رشته‌کوه هیمالیا: برخورد سرزمین هندوستان به آسیا ۲ رشته‌کوه زاگرس: برخورد ورقه عربستان به ورقه ایران	<p>۱ عدم وجود پدیده فروزانش (به علت چگالی کم دو ورقه)</p> <p>۲ ایجاد کوه</p>	۳- دو ورقه قاره‌ای (قاره‌ای-قاره‌ای)	
وجود گسل‌های متعدد و زلزله‌های مکرر	<p>۱ لغزیدن دو ورقه در کنار یکدیگر</p> <p>۲ عدم تشکیل پوسته جدید و یا عدم تخریب پوسته</p>	دو ورقه قاره‌ای یا دو ورقه اقیانوسی	ورقه‌های امتدادلغز

**حواله‌تون باشه** علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کره، جریان‌های همرفتی موجود در گوشه‌فوقانی یا سست‌کره است.  
(توزیع نامساوی دما در درون زمین)

### ۱. تست نمونه

۱. در برخورد ورقه اقیانوسی با ورقه قاره‌ای
- ۱) ورقه قاره‌ای به زیر ورقه اقیانوسی می‌رود.
- ۲) ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای می‌رود.
- ۳) هر دو ورقه به درون سست‌کره فرو می‌روند.
- ۴) هیچ یک به زیر دیگری فرو نمی‌رود و رسوبات چین می‌خورند.

۲. عامل حرکت‌دهنده ورقه‌های سنگ‌کره کدام است؟

- ۱) چرخش زمین
- ۳) جریان‌های همرفتی سست‌کره
- ۲) اختلاف چگالی ورقه‌ها
- ۴) جزر و مد

۳. پیامد کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

- ۱) همگرایی دو ورقه اقیانوسی: جزایر قوسی
- ۲) همگرایی دو ورقه قاره‌ای: کوه
- ۳) واگرایی دو ورقه اقیانوسی: تشکیل پوسته جدید اقیانوسی
- ۴) همگرایی دو ورقه اقیانوسی و قاره‌ای: پشتلهای میان‌اقیانوسی

## فصل ۲

# منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه


### بسته‌های آموزشی



- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| ۲۵. گوهر (جواهر)         | ۲۰. غلظت کلارک               |
| ۲۶. انواع کانی‌های قیمتی | ۲۱. کانی‌ها و رده‌بندی آن‌ها |
| ۲۷. نفت                  | ۲۲. کانسنگ                   |
| ۲۸. مهاجرت نفت           | ۲۳. انواع کانسنگ‌ها          |
| ۲۹. زغال‌سنگ             | ۲۴. اکتشاف و استخراج معدن    |

**مشاوره** مطالب فصل ۲ بیشتر حفظی هستند؛ ولی در کنار آن‌ها می‌باشد به شکل‌ها و نمودارها و جداول نیز توجه ویژه‌ای داشت. از جمله مباحثی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند می‌توان به غلظت عناصر در پوسته زمین، کانسنگ‌ها و انواع آن‌ها، اکتشاف و استخراج معدن، گوهرها و سوخت‌های فسیلی اشاره کرد. از جمله شاخه‌های علم زمین‌شناسی که با مطالب این فصل مرتبط هستند می‌توان سنگ‌شناسی (پترولولوژی)، زمین‌شناسی اقتصادی، زمین‌شناسی نفت و ژئوشیمی را نام برد.

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	سال
۴	۴	۴	۳	داخل
۴	۴	۴	۲	خارج





از طرفی مهم‌ترین خواص گوهرها، سختی نسبتاً زیاد (ب)، رنگ (ج) و درخشش (الف) آن‌ها است و معمولاً کمیاب هستند (د). در نتیجه گزینه‌های «۱» و «۳» هر دو می‌توانند صحیح باشند؛ ولی از آنجایی که درخشندگی در کریزوبریل وجود دارد گزینه «۱» نیز رد می‌شود.

**۲. گزینه «۱»** برخی خواص مانند بازی رنگ، به کانی‌ها درخشندگی و زیبایی خاصی می‌دهد. مثلاً کریزوبریل درخشندگی چشم‌گربه‌ای دارد.

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۲»: نوع شفاف و قیمتی کانی الیوین، زبرجد نام دارد که رنگ آن سبز زیتونی است. گزینه «۳»: معروف‌ترین و گران‌ترین سیلیکات‌بریلیم به رنگ سبز، زمرد نام دارد.

گزینه «۴»: اپال نوعی گوهر سیلیسی است که درخشندگی رنگین‌کمانی دارد.

## ۲۶

### انواع کانی‌های قیمتی



**۱. مشاوره** خصوصیات هر یک از کانی‌های گوهری بسیار مهم هستند. همچنین شکل‌ها و تصاویر آن‌ها به خوبی به ذهن بسپارید.

#### گوهرها و طبقه‌بندی آن‌ها

سیلیکاتی		زمرد
	۱ نوع کانی: سیلیکاتی ۲ رنگ: سبز ۳ معروف‌ترین و گران‌ترین سیلیکات‌بریلیم	زمرد
	۱ نوع کانی: سیلیکاتی ۲ موجود در سنگ‌های دگرگونی ۳ رنگ: سبز، قرمز، نارنجی ۴ فراوان‌ترین رنگ: قرمز تیره	گارنت
	۱ نوع کانی: سیلیکاتی ۲ ترکیب شیمیایی: $\text{SiO}_2$ ۳ رنگ: دارای رنگ‌های متنوع ۴ نوعی کوارتز نیمه‌قیمتی ۵ دارای نام‌ها و تراش‌های مختلف	عقیق
		زبرجد
		۱ نوع کانی: سیلیکاتی ۲ نوع شفاف و قیمتی الیوین ۳ رنگ: سبز زیتونی

## آزمون عبارات

■ در هریک از عبارت‌های زیر، مورد صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

۱. فراوان‌ترین عنصر پوسته جامد زمین (**سیلیسیم / اکسیژن**) است.

۲. فراوانی میانگین عناصر (**پوسته / گوشه**) زمین با عنوان غلظت کلارک شناخته می‌شود.

۳. طبق تعریف، نفت کانی (**می‌باشد / نمی‌باشد**) و گوگرد کانی (**است / نیست**).

۴. فلدسپارهای (**سدیم و کلسیم / پتاسیم**) پلازیوکلاز نام دارند.

۵. مهم‌ترین کانه کانسنسگ مس (**پیریت / کالکوپیریت**) نام دارد.

۶. از جمله کانی‌های باطله در کالکوپیریت می‌توان (**PbS / FeS<sub>2</sub>**) را نام برد.

۷. در لالجین ذخایر (**میکا / خاک رس**) به فراوانی وجود دارد.

۸. پگماتیت‌ها کانسار مناسبی برای (**زمرد / زبرجد**) هستند.

۹. عناصر (**پلاتین و کروم / قلع و روی**) منشأ گرمابی دارند.

۱۰. محصول نهایی فراوری، (**کنسانتره / کانه آرایی**) نام دارد.

۱۱. کانه (**طلای / آلومینیوم**) نیاز به کانه آرایی ندارد.

۱۲. نرم‌ترین کانی در مقیاس موهس، (**ژیپس / تالک**) نام دارد.

۱۳. کوارتز بنفسنگ به (**لاجورد / آمتیست**) معروف است.

۱۴. الماس در (**پوسته / گوشه**) زمین تشکیل می‌شود.

۱۵. ترکیب شیمیایی (**یاقوت / زمرد**)، اکسید آلومینیوم است.

۱۶. سوخت‌های فسیلی از تجزیه مواد (**معدنی / آلی**) به وجود می‌آیند.

۱۷. نفت خام (**مانند / برخلاف**) زغال‌سنگ، در محیط‌های دریایی کم‌عمق تشکیل می‌شود.

۱۸. عامل مؤثر در مهاجرت ثانویه نفت، (**فشار طبقات فوقانی / اختلاف چگالی**) است.

۱۹. (**سنگ گچ / ریف**) در یک نفت‌گیر به عنوان یک پوش‌سنگ عمل می‌کند.

۲۰. سنگ مخزن در یک نفت‌گیر می‌بایست نفوذپذیری (**کم / زیاد**) و تخلخل (**زیاد / کم**) داشته باشد.

۲۱. زغال‌سنگ سوخت فسیلی است که در محیط‌های (**دریایی / خشکی**) تشکیل می‌شود.

۲۲. با خروج آب و مواد فرآر، تورب به (**بیتومینه / لیگنیت**) تبدیل می‌شود.

۲۳. درصد کربن در لیگنیت (**بیشتر / کمتر**) از بیتومینه است.

■ درستی یا نادرستی هریک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۲۴. بررسی غلظت میانگین عناصر، برای آگاهی از تاریخچه توکین یک منطقه مؤثر است.

۲۵. آلومینیوم در جدول غلظت کلارک، فراوان‌ترین فلز می‌باشد.

۲۶. زمین‌شناسان در پی‌جویی‌های اکتشافی به دنبال یافتن مناطقی با بی‌هنگاری مثبت عنصر هستند.

۲۷. پلازیوکلازها فراوان‌ترین کانی‌های سیلیکاتی هستند.

۲۸. از کانی‌های رسی در ساخت شیشه استفاده می‌شود.

۲۹. عنصر اقتصادی موجود در گالن و هماتیت یکسان است.



**حوالتون باشه**

- ۱ سرعت آب رود، یعنی مسافتی که هر ذره آب در واحد زمان طی می‌کند. این سرعت در نقاط مختلف رود در طول یا عرض و عمق آن متغیر است.
- ۲ در یک نقطه معین از رود، با تغییر عرض، عمق و سرعت، آبدهی رود نیز تغییر می‌کند.

۵ | تست نمونه

۱. عرض رودخانه‌ای در زیر پلی ۱۲ متر است. زمانی که آب با عمق  $5/0$  متر و با سرعت  $5/0$  متر بر ثانیه از زیر پل عبور می‌کند، دبی آب رود چند مترمکعب بر ثانیه است؟ (سراسری ۹۶)

(۱) ۴۸ (۲) ۳۰ (۳) ۴/۸ (۴) ۳

۲. آبدهی قناتی در هر دقیقه  $1800$  لیتر است. اگر عمق و عرض آب در دهانه قنات به ترتیب  $40$  و  $50$  سانتی‌متر باشد، آب با سرعت چند متر بر ثانیه از دهانه قنات خارج می‌شود؟ (سراسری ۹۸)

(۱) ۰/۹ (۲) ۰/۶۶ (۳) ۰/۲ (۴) ۰/۱۵

۳. در یک نقطه معین از رودخانه‌ای در دشت، با تغییر آبدهی، کدام کمیت‌های آب رودخانه نیز تغییر می‌کند؟ (خارج از کشور ۹۸)

(۱) عمق، سرعت (۲) عرض، سرعت (۳) طول، عرض، عمق (۴) عرض، عمق، سرعت

۴. چرا در مناطق گرم و خشک، بیشتر رودها، «موقعی و فصلی» هستند؟ (سراسری ۹۹)

(۱) کاهش میزان بارندگی و تبخیر زیاد (۲) ریزش باران‌های سیلابی و ناگهانی (۳) افزایش طول مدت خشکسالی و تغییرات بستر رود (۴) ذوب ناگهانی برف و بخش انباسته شده در قله‌ها

۵. کدام گزینه براساس عبارت زیر، با «زمان حداکثری آبدهی رودهای کشورمان و دلیل آن» مطابقت بیشتری دارد؟ (خارج از کشور ۹۹)

(۱) بیشترین بارش در کشور ما، مربوط به فصل سرد سال است. (۲) اوایل پاییز → افزایش بارندگی و کاهش نفوذپذیری (۳) اواخر تابستان → کاهش تبخیر و بارش باران (۴) زمستان → بارش برف و کاهش تبخیر

۶. آبدهی قناتی در هر دقیقه  $3000$  لیتر است. اگر عمق و عرض آب در دهانه قنات به ترتیب  $40$  و  $80$  سانتی‌متر باشد، آب تقریباً با سرعت چند متر بر ثانیه خارج می‌شود؟ (سراسری ۱۴۰۰)

(۱) ۰/۶۶ (۲) ۰/۱۵ (۳) ۰/۹ (۴) ۰/۲

۷. لوله‌ای به قطر  $5$  سانتی‌متر در هر ثانیه  $400$  لیتر آب به پره‌های توربینی می‌رساند. سرعت آب در لحظه برخورد به پره‌های توربین حدود چند متر بر ثانیه است؟ (خارج از کشور ۱۴۰۰)

(۱) ۸ (۲) ۵ (۳) ۲ (۴) ۱

۸. پهنا و عمق رود A،  $2$  برابر رود B و سرعت آب در رود A، نصف رود B است. نسبت دبی رود A به رود B کدام است؟ (خارج از کشور ۱۴۰۱)

(۱)  $\frac{1}{2}$  (۲)  $\frac{1}{4}$  (۳)  $\frac{1}{2}$  (۴)  $\frac{1}{8}$

✓ | پاسخ تست نمونه

$$Q = A \times V \Rightarrow Q = 0/5 \text{ m} \times 12 \text{ m} \times 0/5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow Q = 3 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

۱. گزینه «۱»

$$Q = A \times V$$


۲. گزینه «۱»

$$A = 40 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} = 2000 \text{ cm}^2 = 0/2 \text{ m}^2$$

$$\frac{1800 \text{ (Lit)}}{60 \text{ (s)}} = 30 \frac{\text{Lit}}{\text{s}}$$



۱. گزینه «۲» شکل صورت سؤال، مقطع یک رودخانه مارپیچ (دارای انحنا) را نشان می‌دهد. در یک رودخانه مارپیچ، بیشترین سرعت جریان آب در طرف دیواره مقعر یا فرو رفته (کناره کاو) می‌باشد.



۲. گزینه «۳» شکل صورت سؤال یک رودخانه مارپیچ را نشان می‌دهد. مقاطع AB و EF مکان‌هایی هستند که در آن‌ها رودخانه دارای مسیری منحنی شکل است؛ ولی جهت تغیر رود در آن‌ها با هم متفاوت است. در برش‌های CD و GH رودخانه مسیری مستقیم دارد.



## آب زیرزمینی


۱ | مشاوره در این بسته که مطالب مهمی دارد، حتماً به تعاریف و اصطلاحات توجه داشته باشید.

■ آب زیرزمینی: ۱ آبی است که در منافذ و فضاهای خالی لایدهای نزدیک سطح زمین جمع می‌شود و از طریق چاه، چشم و قنات قابل بهره‌برداری است. ۲ حجم کمی از آب کره را تشکیل می‌دهد؛ ولی بزرگ‌ترین ذخیره آب شیرین قابل بهره‌برداری در خشکی‌ها است.

### نحوه توزیع آب زیرزمینی در خاک

منطقه تهویه	۱
منطقه اشباع	۲
سطح ایستابی	۳
حاشیه مویینه	۴

منطقه‌ای در زیر زمین است که منافذ خالی آن با آب و هوا پر شده است.  
منطقه‌ای زیر منطقه تهویه است که همه فضاهای خالی آن با آب پر شده است و تاسنگ بستر ادامه دارد.  
سطح فوقانی منطقه اشباع، اگر بالای نفوذناپذیری محصور نشده باشد. (مرز بین منطقه تهویه و منطقه اشباع)  
نوار باریک و مرطوبی است که منطقه اشباع را به منطقه بالایی (منطقه تهویه) مرتبط می‌کند و سطح ایستابی در فضاهای خالی این منطقه در نوسان است.



■ سطح ایستابی تقریباً از توپوگرافی (عارضه‌گاری) سطح زمین تبعیت می‌کند. نتیجه ← تفاوت عمق سطح ایستابی در نقاط مختلف ← ۱ در نقاط مرتفع و دامنه کوه‌ها؛ در عمق بیشتر ۲ در دره‌ها و نقاط پست: در عمق کمتر

■ ضخامت حاشیه مویینه در رسوبات دانه‌ریز بیشتر از رسوبات دانه‌درشت است.

■ عوامل مؤثر بر تغییرات عمق سطح ایستابی: ۱ موقعیت جغرافیایی منطقه ۲ ارتفاع محل ۳ میزان بارش سالیانه و فصلی ۴ توپوگرافی منطقه ۵ جنس خاک منطقه ۶ میزان نفوذ آب به زمین ۷ تغییرات میزان بهره‌برداری

ظاهرشدن آب زیرزمینی در سطح زمین به علت برخورد سطح ایستابی با سطح زمین	چشمی یا برکه
نتیجه انتباط سطح ایستابی با سطح زمین و یا فرارگیری در نزدیکی آن	باتلاق یا شوره‌زار

قديمي ترين قنات جهان، قنات قصبه گناباد در استان خراسان رضوي است. ★ حواستون باشه



## رفتار مواد در برابر تنفس



**مشاوره** از مطالب این بسته در سال‌های اخیر سؤالات زیادی مطرح شده است. از مطالعه آن غافل نشوید.

۱ کشسان (الاستیک): اجسام با اعمال تنفس، تغییر شکل می‌دهند، ولی با رفع تنفس به طور کامل به حالت اولیه خود برگردند.

۲ خمیرسان (پلاستیک): اجسام در برابر تنفس، تغییر شکل می‌دهند، ولی با رفع تنفس به طور کامل به حالت اولیه خود باز نمی‌گردند. **مثال** چین خوردگی

۳ شکننده: اگر تنفس از حد مقاومت سنگ بیشتر شود، سنگ می‌شکند. **مثال** درزه و گسل



شکننده



خمیرسان



کشسان

## بررسی مقاومت انواع سنگ‌ها در برابر تنفس

ردیف	نوع سنگ	مثال	وضعیت	علت
۱	آذرین	گابرو	تکیه‌گاه مناسب برای سازه‌ها	مقاومت بالا
۲	دگرگونی	شیستها	نامناسب برای پی سازه‌ها	سست و ضعیف بودن
		کوارتزیت، هورنفلس	تکیه‌گاه مناسب برای سازه‌های سنگین	مقاومت زیاد
۳	رسوبی	ماسهسنگ‌ها	مناسب برای ساخت سازه	استحکام زیاد
		سنگ گچ (زیپس)، سنگ نمک (سنگ‌های تبخیری)	عدم مقاومت در برابر تنفس	انحلال‌پذیری
		شیل‌ها	غیر مقاوم	تورق‌پذیری و سست بودن

**حواله‌نامه** پی‌سنگ سد امیرکبیر از جنس سنگ گابرو است. ★

## تست نمونه

۱. کدام گزینه، دلیل مناسبی، برای اهمیت «سد امیرکبیر»، به عنوان سازه مخزنی مهم، در استان البرز است؟ (سراسری ۹۹)
  - ۱) استفاده از کوارتزیت، مقاومت سد را افزایش داده است.
  - ۲) سنگ آهک فاقد حفره، سبب استحکام پی سازه شده است.
  - ۳) سنگ گابرو سبب افزایش مقاومت در پی سنگ شده است.
  - ۴) استحکام لازم سازه، با استفاده از ماسهسنگ افزایش یافته است.



۴. گزینه «۲» گرانیت یک سنگ آذرین است که عناصر اصلی تشکیل دهنده آن عبارتند از: سیلیسیم (Si)، اکسیژن (O) و آلومینیوم (Al).

۵. گزینه «۳» عناصر اصلی: اکسیژن، آهن، کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم

■ عناصر فرعی: تیتانیم، منگنز، فسفر

■ عناصر جزئی: مس، طلا، روی، سرب، کادمیم



## منشأ بیماری‌های زمین‌زاد (As, Cd, Hg)



۶. **مشاوره** مطالب این بسته حفظی است و تجربه نشان داده که طراحان سؤال توجه زیادی به آن داشته‌اند.

ردیف	نام عنصر	نوع عنصر	نوع بی‌亨جاری	مسیر انتقال به بدن	منشأ	عوارض	مثال
۱	آرسنیک (As)	غیرضروری و سمی	آب آلوده به عنصر	مثبت	هوازدگی و اکسیدهشدن کانی‌های آرسنیکدار مانند: سنگ‌های آتشفسانی پیریت زغال‌سنگ	۱ لکه‌های پوستی ۲ سخت‌شدن و شاخی‌شدن کف دست و پا ۳ دیابت ۴ سرطان پوست	۱ خشک‌کردن فلفل قرمز و ذرت به وسیله زغال‌سنگ در جنوب چین ۲ آبیاری مزارع برنج با آب حاوی آرسنیک در بنگال غربی هندوستان
۲	کادمیم (Cd)	سمی و سرطان‌زا	گیاهان خوراکی آب	مثبت	معادن سرب و روی	۱ تغییر شکل و نرمی استخوان‌ها و مفاصل (در زنان مسن) ۲ آسیب‌های کلیوی	ورود کادمیم به مزارع برنج در ژاپن و بروز بیماری ایتای ایتای
۳	جیوه (Hg)	سمی	دهان (آب و غذا) پوست	مثبت	سنگ‌های آتشفسانی چشم‌های آب گرم فرایند ملقمه کردن طلا با جیوه	آسیب به دستگاه‌های عصبی، گوارش و ایمنی	میناماتا در ژاپن (تولد کودکان ناقص)



خشک‌شدن و شاخی‌شدن پوست



میناماتا



## پاسخ تست نمونه ✓

۱. گزینه «۲» مرکز سطحی زمین‌لرزه، نقطه‌ای در سطح زمین است که در بالای کانون قرار دارد. این نقطه دارای کمترین فاصله از کانون می‌باشد. در نتیجه امواج لرزه‌ای زودتر از دیگر نقاط به آن جا می‌رسند.
۲. گزینه «۳» کانون زمین‌لرزه محلی در درون زمین است که انرژی ذخیره شده از آن جا آزاد می‌شود.
۳. گزینه «۳» در هر زمین‌لرزه، مقدار انرژی انباشته شده در سنگ‌ها، به‌طور ناگهانی آزاد می‌شود و به صورت امواج لرزه‌ای به اطراف حرکت می‌کند. علت اصلی زمین‌لرزه حرکت ورقه‌های سنگ‌کره است.



## امواج لرزه‌ای ۶۵

**مشاوره** تجربه نشان داده مطالب این بسته اغلب مورد توجه طراحان سؤال بوده است. ضمن توجه به حفظیات، بررسی شکل‌های امواج را نیز در نظر داشته باشید.

## تقسیم‌بندی امواج لرزه‌ای

- |  |  |
|--|--|
| <p>بیشترین سرعت را دارند.</p> <p>اولین امواج ثبت شده توسط دستگاه‌های لرزه‌نگار هستند.</p> <p>از همه محیط‌ها (جامد، مایع، گاز) عبور می‌کنند.</p> <p>حرکت آن‌ها به موازات سطح زمین (در راستای افق) است.</p> <p>(راستای ارتعاش و انتشار آن‌ها با یکدیگر موازی است).</p> <p>بعد از امواج P ثبت می‌شوند.</p> <p>فقط از محیط‌های جامد عبور می‌کنند.</p> <p>جابجایی ذرات عمود بر راستای انتشار موج است.</p> <p>(راستای ارتعاش و انتشار موج بر یکدیگر عمود است).</p> | <p><b>۱ امواج P یا اولیه (طولی)</b></p> <p><b>۲ امواج درونی:</b> در کانون زمین‌لرزه تولید می‌شوند و در درون زمین منتشر می‌گردند.</p> <p><b>۳ امواج S یا ثانویه (عرضی)</b></p> <p><b>۴ امواج لاو (L)</b> در این امواج، ذرات ماده به موازات سطح زمین جابجا می‌شوند.</p> <p>(جابجایی قائم ندارند).</p> <p>آخرین امواجی هستند که توسط دستگاه‌های لرزه‌نگار ثبت می‌شوند.</p> <p>این امواج مانند حرکت امواج آب دریا، ذرات را در یک مدار دایره‌ای شکل به ارتعاش درمی‌آورند.</p> <p>جهت حرکت دایره‌ای این امواج، خلاف جهت حرکت امواج دریا است.</p> <p>عمق نفوذ و تأثیر امواج ریلی مانند امواج دریا محدود است و از سطح به عمق کاهش می‌یابد.</p> |
|--|--|



## پاسخ تست نمونه ✓

۱. گزینه «۳» پیش‌نstanگرها علائم و نشانه‌هایی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان وقوع زمین‌لرزه را پیش‌بینی کرد.  
پیش‌نstanگرها وقوع زمین‌لرزه عبارت‌اند از: ۱- تغییرات گاز رادون در آب‌های زیرزمینی ۲- ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی ۳- پیش‌لرزه ۴- ناهنجاری در رفتار حیوانات ۵- ابر زمین‌لرزه
۲. گزینه «۴» به برخی از علائم و نشانه‌ها که بتوان با استفاده از آن‌ها وقوع زمین‌لرزه را پیش‌بینی کرد، پیش‌nstanگر می‌گویند.  
برخی از پیش‌nstanگرها وقوع یک زمین‌لرزه عبارت‌ند از: ۱- تغییرات گاز رادون در آب‌های زیرزمینی ۲- ایجاد تغییر در سطح تراز آب زیرزمینی ۳- پیش‌لرزه ۴- ناهنجاری در رفتار حیوانات ۵- ابر زمین‌لرزه



## چین خوردگی

۶۸


**مشاوره** موضوعی بسیار مهم که علی‌رغم توضیح بسیار اندک آن در کتاب درسی، امکان طرح تست‌های مهمی از آن وجود دارد که برای پاسخ به آن‌ها، آگاهی از جدول زمان زمین‌شناسی ضروری است.

■ چین: خمیدگی‌های موجود در سنگ‌ها که در اثر رفتار خمیری‌شکل (پلاستیک) سنگ ایجاد می‌شود.

نتیجه ← ایجاد رشته‌کوهها  
چین خوردگی

## انواع چین


لایه‌های سنگی از حالت افقی خارج شده و بالاتر یا پایین‌تر از سطح اصلی قرار گرفته‌اند.	چین تک‌شیب	۱
لایه‌های سنگی طوری خم شده‌اند که لایه‌های قدیعی‌تر در مرکز چین و لایه‌های جدیدتر در حاشیه چین قرار دارند.	تاقدیس	۲
در لایه‌های سنگی، لایه‌های جدیدتر در مرکز چین و لایه‌های قدیعی‌تر در حاشیه چین قرار دارند.	ناودیس	۳



**حواله‌تون باشه** در چین تک‌شیب، هیچ‌گونه تغییری در نظم و ترتیب لایه‌های سنگی از نظر زمانی وجود ندارد.



۱. به ترتیب لایه‌های A، B، C و D در چه زمان‌هایی باید تهشین شده باشند تا شکل زیر قسمتی از یک تاقدیس را نشان دهد؟ (سراسری ۹۱)



۱۵۱




- ۲) گسل عادی  
۴) ناودیس

۲. شکل زیر کدام یک را نشان می‌دهد؟


- ۱) چین تک‌شیب  
۳) موج ریلی

۳. اگر ماسه‌سنگ در و شیل در تهشین شده باشد، شکل زیر یک ناودیس است. (خارج از کشور ۹۳)




- ۱) کرتاسه - کربونیفر  
۲) کربونیفر - کامبرین  
۳) کربونیفر - سیلورین  
۴) کامبرین - اردوبویسین

۴. به ترتیب سنگ آهک و رس متعلق به کدام زمان باشند، شکل زیر یک تاقدیس است؟ (خارج از کشور ۹۸ با تغییر)




- ۱) تریاس، پرمین  
۲) پالئوزن، کرتاسه  
۳) ژوراسیک، کرتاسه  
۴) ژوراسیک، تریاس




۵. در شکل زیر، ماسه‌سنگ دانه‌ریز، جوان‌تر از ماسه‌سنگ دانه‌درشت است. کدام پدیده‌های زمین‌شناسی قابل شناسایی هستند؟ (سراسری ۱۴۰۰)

- ۱) گسل عادی، تاقدیس  
۳) گسل امتدادلغز، تاقدیس

۶. در شکل زیر، ماسه‌سنگ درشت جوان‌تر از ماسه‌سنگ ریز است. کدام پدیده‌های زمین‌شناسی قابل شناسایی هستند؟ (خارج از کشور ۱۴۰۰)



- ۱) تاقدیس، گسل عادی  
۲) ناودیس، گسل عادی  
۳) تاقدیس، گسل معکوس  
۴) ناودیس، گسل معکوس



**حواله‌تون باشه** موارد نمایش داده شده در نقشه‌های زمین‌شناسی: ۱ جنس و پراکندگی سطحی سنگ‌ها  
۲ روابط سنی آن‌ها ۳ وضعیت شکستگی‌ها و چین‌خوردگی‌ها ۴ موقعیت کانسارها

### ۵ | تست نمونه

۱. دشت‌های پهناور، خشک و کم‌آب از ویژگی‌های کدام پهنه زمین‌ساختی ایران است؟
  - (۱) کپه‌داغ
  - (۲) ایران مرکزی
  - (۳) سواحل خلیج فارس
  - (۴) شرق و جنوب شرق
۲. سنگ‌های اصلی کدام پهنه‌های زمین‌ساختی ایران را به ترتیب سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی تشکیل می‌دهند؟
  - (۱) (سنندج - سیرجان)، البرز، (سهند - بزمان)
  - (۲) (ارومیه - دختر)، البرز، (سنندج - سیرجان)
  - (۳) (سنندج - سیرجان)، ایران مرکزی، (ارومیه - دختر)
  - (۴) (ارومیه - دختر)، زاگرس، (سنندج - سیرجان)
۳. مطالعه کدام پهنه زمین‌ساختی ایران، تاریخچه کامل‌تری از گذشته، در اختیار زمین‌شناسان قرار می‌دهد؟ (سراسری ۱۴۰۰)
  - (۱) البرز
  - (۲) زاگرس
  - (۳) کپه‌داغ
  - (۴) ایران مرکزی
۴. کدام پهنه‌های زمین‌ساختی ایران، توان بیشتری برای استخراج سنگ مرمر مورد نیاز ساختمان‌سازی داخل کشور و صادرات به سایر کشورها را دارند؟
  - (۱) ارومیه - دختر، زاگرس
  - (۲) سنندج - سیرجان، البرز
  - (۳) شرق و جنوب شرق، ایران مرکزی
  - (۴) ایران مرکزی، سنندج - سیرجان
۵. کدام پهنه زمین‌ساختی ایران حاصل فرورانش تیس نوین به زیر ایران مرکزی است؟ (خارج از کشور ۱۴۰۰)
  - (۱) ایران مرکزی
  - (۲) سهند - بزمان
  - (۳) جنوب شرق ایران
  - (۴) سنندج - سیرجان

## پیوست

بخش پیوست در کتاب جمع‌بندی زمین‌شناسی شامل دو قسمت آزمون‌های جامع و واژه‌نامه می‌باشد. در بخش آزمون‌های جامع، به منظور ارزیابی دانش‌آموزان، ۳ آزمون جامع طراحی شده است. مطالعه این آزمون‌ها به همراه پاسخ‌های تشریحی آن‌ها، برای جمع‌بندی نهایی موضوعات کتاب درسی و آمادگی برای پاسخ‌گویی به سوالات کنکور مفید خواهد بود.

در قسمت واژه‌نامه نیز به توضیح مختصر لغات و اصطلاحات مهم کتاب درسی به صورت فصل به فصل پرداخته شده است که مطالعه آن‌ها به یادگیری مطالب کتاب درسی کمک زیادی می‌نماید.



## پاسخ‌نامه تشریحی

### آزمون جامع ۱

شدن و تبلور ماقما، پلاتین که چگالی نسبتاً بالایی دارد، در بخش زیرین ماقما تهنشین می‌شود و این کانسنگ به وجود می‌آید. مولیبدن جزء کانسنگ‌های گرمابی می‌باشد. در اثر تغییرات شیب زمین‌گرمایی در بخش‌های عمیق پوسته، آب‌های گرم، عناصری مانند مولیبدن را به شکل کانسنگ در داخل شکستگی‌های سنگ‌ها تهنشین می‌کند و رگه‌های معدنی تشکیل می‌شود.

**۵. گزینه ۴** «فرآیند جداسازی کانی‌های مفید اقتصادی از باطله، کانه‌آرایی (فراوری) نام دارد. محصول نهایی (کنسانتره)، همان کانهٔ جدا شده از کانسنگ است که برای جداسازی فلز به کارخانهٔ ذوب منتقل می‌شود و یا با تغییر انداک یا به طور مستقیم در صنعت از آن استفاده می‌شود.

**۶. گزینه ۳** «موارد «الف» و «ت» در صورت سؤال درست هستند.

بررسی موارد نادرست:

«ب»: برلیان تراش خاصی از الماس است.

«ب»: کریزوبریل در خشش چشم‌گربه‌ای و اپال در خشش رنگین‌کمانی دارد.

**۷. گزینه ۲**

$$Q = \frac{A \times V}{s}$$

$$V = \frac{km}{h} = ? \frac{m}{s}$$

$$V = \frac{1}{2} \times \frac{1}{36} \Rightarrow V = \frac{m}{s}$$

$$Q = A \times V \Rightarrow Q = 100 \text{ m}^2 \times \frac{m}{s}$$

$$\Rightarrow Q = 200 \frac{m^3}{s}$$

**۸. گزینه ۳** «برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، برای آن‌ها حریم تعیین می‌شود:

**۱. گزینه ۴** طبق قانون دوم کپلر، هنگام گردش یک سیاره به دور خورشید، هرچه سیاره به خورشید نزدیک‌تر باشد، مدار گردش آن به دور خورشید کوچک‌تر است و سیاره فاصله موجود را با سرعت بیشتری طی می‌کند. در نتیجه مدت زمان کمتری طول می‌کشد تا یک بار به دور خورشید بچرخد و سال کوتاه‌تری خواهد داشت. فاصله زمین تا خورشید در اول دی‌ماه به کمترین مقدار خود (۱۴۷ میلیون کیلومتر) می‌رسد.

**۲. گزینه ۱** لایه‌های رسوبی در حالت کلی به صورت افقی و به ترتیب سن و از قدیم به جدید تهنشین می‌شوند. نبود لایه‌های رسوبی یک دورهٔ زمانی زمین‌شناسی می‌تواند به علت فرسایش رسوبات آن دورهٔ زمانی به دلایل مختلف باشد.

لایه‌های رسوبی شکل صورت سؤال از قدیم به جدید به شکل زیر مرتب می‌شوند:

سیلورین - پرمین - تریاس - کرتاسه - پالئوزن  
 الف) بین لایه‌های سیلورین و پرمین، رسوبات دوره‌های دونین و کربونیفر وجود ندارد. ← ۱ مرحله فرسایش  
 ب) بین لایه‌های تریاس و کرتاسه، رسوبات دورهٔ ژوراسیک وجود ندارد. ← ۱ مرحله فرسایش  
 در نتیجه در مجموع شاهد ۲ مرحله فرسایش در منطقه خواهیم بود.

**۳. گزینه ۴** در مرحله بازشدنگی از چرخهٔ ویلسون، تحت تأثیر جریان‌های همرفتی سست‌کره، بخشی از پوستهٔ قاره‌ای شکافته می‌شود و مواد مذاب سست‌کره به سطح زمین می‌رسند. آتش‌شان‌های کنیا و کلیمانجارو در شرق آفریقا نمونه‌ای از این حالت هستند.

**۴. گزینه ۳** «کانسنگ عنصر پلاتین از یک ماقمای در حال سرد شدن تشکیل می‌شود. در این حالت با سرد

## واژه‌نامه

**۸. نیکولاوس کوپرنیک:** ستاره‌شناس لهستانی که نظریه خورشید مرکزی را ارائه کرد. (گردش سیارات به دور خورشید در مدارهایی دایره‌ای)

**۹. یوهانس کپلر:** ریاضی‌دان آلمانی که بیان کرد مدار گردش سیارات به دور خورشید بیضی‌شکل است نه دایره‌مانند و ۳ قانون را برای حرکت سیارات ارائه داد. (قوانين کپلر)

**۱۰. اوج خورشیدی:** طبق قانون دوم کپلر، اوج خورشیدی زمانی است که فاصله زمین تا خورشید به حداقل مقدار خود (۱۵۲ میلیون کیلومتر) می‌رسد که معادل اول تیرماه می‌باشد.

**۱۱. حضیض خورشیدی:** طبق قانون دوم کپلر، حضیض خورشیدی معادل اول دی‌ماه است که در این حالت فاصله زمین تا خورشید به حداقل مقدار خود (۱۴۷ میلیون کیلومتر) می‌رسد.

**۱۲. مدار رأس السرطان:** عرض جغرافیایی  $23^{\circ} 5'$  درجه شمالی را نشان می‌دهد که خورشید در اول تیرماه بر روی آن تابش قائم دارد.

**۱۳. مدار رأس الجدی:** بر روی عرض جغرافیایی  $23^{\circ} 5'$  درجه جنوبی قرار دارد که خورشید در اول دی‌ماه به آن عمود می‌تابد.

**۱۴. دایرة عظيمة روشنایی:** به دلیل انحراف  $23^{\circ} 5'$  درجه‌ای محور زمین، مقدار زاویه تابش خورشید در عرض‌های جغرافیایی مختلف، متفاوت است. در حرکت وضعی زمین در هر لحظه نیمی از زمین مقابل خورشید قرار می‌گیرد و نیمی دیگر تاریک است. به این نیمة روشن زمین، دایرة عظيمة روشنایی می‌گویند.

**۱۵. مدار استوا:** بر روی عرض جغرافیایی صفر درجه قرار دارد و خورشید در اول بهار و اول پاییز بر روی آن تابش قائم دارد.

### فصل ۱: آفرینش کیهان و تکوین زمین

**۱. مهبانگ:** معروف به انفجار بزرگ (Big Bang) که دانشمندان پیدایش جهان را با این نظریه توضیح می‌دهند.

**۲. کهکشان:** از تعداد زیادی ستاره، سیاره و فضای بین ستاره‌ای (غلب گاز و گرد و غبار) تشکیل شده که تحت تأثیر نیروی گرانش متقابل، یکدیگر را نگه داشته‌اند.

**۳. کهکشان راه شیری:** نواری مدهمانند و کمنور می‌باشد که شامل انبوی از اجرام است. شکل آن مارپیچی است و منظومه شمسی ما در لبه یکی از بازوهای آن قرار دارد.

**۴. آلدگی نوری:** نوعی آلدگی است که بر اثر روش شدن بیش از حد یک محیط بر اثر وجود نورهای مصنوعی ایجاد می‌شود. آلدگی نوری یکی از اثرات زندگی صنعتی شهری است و می‌تواند به اکوسیستم آسیب وارد کند. نور زیاد در شهرها باعث ایجاد مشکلاتی در رصد آسمان شب می‌شود.

**۵. بطلمیوس:** دانشمند یونانی که نظریه زمین مرکزی را ارائه کرد. (چرخش سیارات به دور زمین در مدارهایی دایره‌ای شکل)

**۶. ابوسعید سجزی:** ریاضی‌دان و ستاره‌شناس ایرانی که سازنده نوعی اسطرلاپ بود.

**۷. اسطرلاپ:** کلمه‌ای یونانی است و به دستگاه مدرجی گفته می‌شود که از برنز یا برنج و یا آهن و فولاد ساخته شده و برای مطالعات و محاسبات نجومی مانند پیدا کردن ارتفاع، زاویه تابش خورشید، محل ستارگان و سیارات، طول و عرض جغرافیایی محل، تعیین ساعت و طلوع و غروب خورشید و... در هر مکان کاربرد داشته است.