

فصل بر خط راست


قسمت اول: شناخت حرکت

(ابتدا درس مربوط به این قسمت را در جلد آموزش مطالعه نمایید.)

۱) بردار مکان، جابه‌جایی و مسافت

شروع هرکت با مقایم مکان، جابه‌جایی و مسافت! درسته تو علوه^۳ نهم در مورد او نا فوندیم ولی برای بررسی و درک بقیه مقایم تو مبین هرکت امسال فیلی کمکمون می‌کنه!

۱۹۹۷. مطابق شکل دو خودروی A و B روی محور x در یک لحظه نشان داده شده‌اند. اگر مبدأ محور از نقطه $x = 0$ به نقطه $x' = -2\text{m}$ منتقل شود، بردار مکان خودروی A نسبت به نقطه x و بردار مکان خودروی B نسبت به نقطه x' در SI کدام است؟ (برگرفته از کتاب درس)



$$\vec{d}_B = +8\hat{i}, \vec{d}_A = -10\hat{i} \quad (1)$$

$$\vec{d}_B = -6\hat{i}, \vec{d}_A = +12\hat{i} \quad (2)$$

$$\vec{d}_B = -6\hat{i}, \vec{d}_A = +10\hat{i} \quad (3)$$

$$\vec{d}_B = -8\hat{i}, \vec{d}_A = +12\hat{i} \quad (4)$$

۱۹۹۸☆. خودرویی منطبق بر محور x در حال حرکت است. این خودرو بدون تغییر جهت از مکان $x_1 = -4\text{m}$ به مکان $x_2 = +8\text{m}$ می‌رسد. در این صورت چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد بردار مکان خودرو درست است؟

آ) یک بار تغییر جهت داده است.
ب) یک بار به حداقل مقدار خود رسیده است.

ت) همواره در جهت منفی محور است.
پ) همواره در جهت مثبت محور است.


۱) ۲) ۳) ۴) صفر

۲) تعیین مسافت و جابه‌جایی برای مکان موقمه پون تو تعیین دو تاکمیت با ارزش که فیلی زود می‌فونیم بهمون کمک می‌کنه!

۱۹۹۹☆. جسمی از نقطه $O(3\text{m})$ و $A(4\text{m})$ ابتدا جابه‌جایی‌های $\vec{j}_1 = +15\hat{j}(\text{m})$ و $\vec{j}_2 = -10\hat{j}(\text{m})$ را انجام می‌دهد و در نهایت جابه‌جایی $\vec{j}_3 = +d\hat{j}$ را انجام می‌دهد. اگر مسافت پیموده شده برابر 30 m تر باشد، جابه‌جایی \vec{j}_3 در SI کدام است؟ (برگرفته از کتاب درس)

$$+5\hat{j} \quad (1) \quad +10\hat{j} \quad (2) \quad -15\hat{j} \quad (3) \quad -10\hat{j} \quad (4)$$

۲۰۰۰. مطابق شکل گلوله‌ای از ارتفاع h بالای سطح زمین رو به بالا پرتاب می‌شود. بیش ترین فاصله‌ای که نسبت به نقطه پرتاب بالا می‌رود برابر 10 m تر است. اگر مسافت پیموده شده توسط گلوله تا لحظه برخورد به سطح زمین برابر 5 m تر باشد، بردار جابه‌جایی جسم در SI کدام است؟ (فرض کنید مسیر حرکت گلوله خط راست است).



$$+30\hat{j} \quad (1) \quad -30\hat{j} \quad (2)$$

$$-50\hat{j} \quad (3) \quad +50\hat{j} \quad (4)$$

۲۰۰۱☆. جسمی از نقطه $A(3\text{m})$ و $B(4\text{m})$ ابتدا جابه‌جایی $\vec{d}_1 = +12\hat{i}$ و سپس جابه‌جایی $\vec{d}_2 = +16\hat{i}$ را در SI انجام می‌دهد. مسافت پیموده شده چند برابر اندازه جابه‌جایی است؟

$$\frac{1}{7} \quad (1) \quad \frac{1}{4} \quad (2) \quad \frac{5}{7} \quad (3) \quad \frac{6}{7} \quad (4)$$

۲۰۰۲. خودرویی بر یک مسیر مستقیم بین دو نقطه جابه‌جا شده و سپس یک پنجم طول این مسیر را در سوی مخالف باز می‌گردد. در حرکت خودرو نسبت اندازه جابه‌جایی به مسافت پیموده شده کدام است؟ (برگرفته از کتاب درس)

$$\frac{2}{3} \quad (1) \quad \frac{6}{5} \quad (2) \quad \frac{4}{3} \quad (3) \quad \frac{3}{2} \quad (4)$$

۲۰۰۳. دوچرخهسواری در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. در جایه‌جایی بین دو نقطه جهت حرکت آن یک بار تغییر کرده و جایه‌جایی انجام شده توسط آن $\frac{1}{8}$ مسافت پیموده شده است. فاصله نقطه شروع حرکت دوچرخهسوار تا مکان تغییر جهت حرکت، چند برابر فاصله نقطه انتهایی مسیر تا مکان تغییر جهت می‌تواند باشد؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } \frac{7}{8} & \text{(۲) } \frac{9}{7} \\ \text{(۳) } \frac{9}{11} & \text{(۴) } \frac{11}{8} \end{array}$$

۲۰۰۴. خودرویی ابتدا روی یک مسیر سه‌می شکل به طول 200 m حرکت می‌کند و پس از آن یک مسیر نیم‌دایره‌ای را می‌پیماید. اگر مسافت پیموده شده در این حرکت برابر 300 متر باشد، شعاع مسیر نیم‌دایره‌ای چند متر است؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } \frac{\pi}{100} & \text{(۲) } \frac{100}{\pi} \\ \text{(۳) } \frac{\pi}{10} & \text{(۴) } \frac{10}{\pi} \end{array}$$

۲۰۰۵. طول عقره دقيقه‌شمار ساعتی برابر 10 سانتی‌متر است. مسافتی که نوک عقره بین دو لحظه $20:35$ تا $20:33$ می‌پیماید چند برابر جایه‌جایی انجام شده است؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } \frac{\pi\sqrt{2}}{2} & \text{(۲) } \frac{\pi\sqrt{2}}{4} \\ \text{(۳) } \frac{\sqrt{2}}{4\pi} & \text{(۴) } \sqrt{2}\pi \end{array}$$

۲۰۰۶. پوندهای که روی لبه ساختمانی بلند به ارتفاع 50 متر نشسته بود، ابتدا پرواز کرده و به پای ساختمان می‌رسد، سپس 40 متر به سمت شرق حرکت می‌کند و در نهایت 30 متر به سمت شمال می‌رود. جایه‌جایی کل پرنده چند متر است؟
(سازمانی فارج از کشور (یافی) ۹۷)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } 120 & \text{(۲) } 50\sqrt{2} \\ \text{(۳) } 50 & \text{(۴) } 40\sqrt{2} \end{array}$$

۲۰۰۷. نقطه‌ای روی محیط چرخ خودرویی و در تماس با سطح زمین قرار دارد. اگر شعاع چرخ خودرو 20 سانتی‌متر باشد، زمانی که چرخ خودرو نیم دور بچرخد، این نقطه چند سانتی‌متر جایه‌جا می‌شود؟ $(\pi^2 = 10)$
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } 10\sqrt{54} & \text{(۲) } 10\sqrt{26} \\ \text{(۳) } 50\sqrt{26} & \text{(۴) } 20\sqrt{26} \end{array}$$

۲۰۰۸. رابطه بین مکان و زمان متحركی بر روی محور x و در SI به صورت $x = 2t^3 + t - 2$ است. بردار مکان متحرك، در لحظه $t = 2s$ ، بر حسب متر کدام است؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } \vec{d} = -16\hat{i} & \text{(۲) } \vec{d} = +16\hat{i} \\ \text{(۳) } \vec{d} = +18\hat{i} & \text{(۴) } \vec{d} = -18\hat{i} \end{array}$$

۲۰۰۹. رابطه مکان – زمان حرکت جسمی در SI به صورت $x = t^3 - 2t^2 + t$ است. پس از شروع حرکت، فاصله زمانی بین لحظه‌ای که بردار مکان به حداقل مقدار خود می‌رسد تا لحظه‌ای که جسم در مکان $x = +12\text{ m}$ قرار می‌گیرد، چند ثانیه است؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } 2s & \text{(۲) } 1s \\ \text{(۳) } \frac{1}{2}s & \text{(۴) } 3s \end{array}$$

۲۰۱۰. رابطه مکان – زمان حرکت خودرویی بر خط راست در SI به صورت $x = t^2 + 4$ است. در دو ثانیه دوم حرکت، بردار جایه‌جایی خودرو در SI کدام است؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } +16\hat{i} & \text{(۲) } +24\hat{i} \\ \text{(۳) } -16\hat{i} & \text{(۴) } -24\hat{i} \end{array}$$

۲۰۱۱. رابطه مکان – زمان جسمی که روی خط راست حرکت می‌کند در SI به صورت $x = t^2 - 2t + 4$ است. مسافت پیموده شده توسط جسم در ۲ ثانیه اول حرکت، چند متر با جایه‌جایی انجام شده اختلاف دارد؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } ۲ & \text{(۲) } ۱ \\ \text{(۳) } ۳ & \text{(۴) } ۰ \end{array}$$

۲۰۱۲. رابطه مکان – زمان حرکت جسمی در SI به صورت $x = -t^2 + 6t + 6$ است. کدام عبارت در مورد جسم پس از شروع حرکت درست است؟
(برگرفته از کتاب درس)

- (۱) جسم مدت زمانی در جهت منفی محور X و مدت زمانی در جهت مثبت محور X حرکت می‌کند.

(۲) بردار جایه‌جایی جسم در جهت مثبت محور X است.

(۳) جایه‌جایی و مسافت پیموده شده در هر بازه زمانی دلخواه با هم برابر است.

(۴) جسم همواره در جهت منفی محور X حرکت می‌کند.

۲۰۱۳. رابطه بین مکان و زمان حرکت جسمی روی محور x ها در SI به صورت $x = 2\cos 50\pi t$ است. فاصله زمانی بین دو بار عبور از مبدأ محور بر حسب ثانیه کدام گزینه نمی‌تواند باشد؟
(برگرفته از کتاب درس)

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } ۰/۰۲ & \text{(۲) } ۰/۰۴ \\ \text{(۳) } ۰/۰۳ & \text{(۴) } ۰/۱ \end{array}$$

۲۰۱۴. رابطه بین مکان و زمان حرکت جسمی در SI به صورت $x = 0/2\cos 100\pi t + 2\cos 50\pi t$ است. فاصله بین مکان شروع حرکت جسم و مکان جسم در

$$\begin{array}{ll} \text{(۱) } \frac{1}{400}s & \text{(۲) } \text{چند متر است؟} \\ \text{(۳) } 2 + \sqrt{2} & \text{(۴) } 2 - \sqrt{2} \end{array}$$

۲۰۱۵☆ معادله مکان – زمان حرکت خودرویی بر مسیر مستقیم در SI به صورت $5 + 4t + 2tx = 2t^2$ است. در چه لحظه‌ای بر حسب ثانیه دوباره خودرو در مکان اولیه‌اش قرار می‌گیرد؟

(۱) ۱/۷۵

(۲) ۰/۵

(۳) ۰/۲۵

(۴) ۲/۲۵

○ در هر کلت دو جسم اگر مکان‌ها یکسان بشه، می‌گلن دو جسم به هم رسیدن. به تست‌های زیر توجه کنید.

۲۰۱۶☆ معادله مکان – زمان دو متجرک که بر مسیر مستقیم در حال حرکت هستند، در SI به صورت $x_B = 4t^2 + 2t + 2$ و $x_A = 6t + 2$ است. در لحظه‌ای که دو متجرک به هم می‌رسند، مکان متجرک B در SI کدام است؟

$\vec{d}_B = -8\vec{i}$

$\vec{d}_B = -2\vec{i}$

$\vec{d}_B = +8\vec{i}$

$\vec{d}_B = +2\vec{i}$

۲۰۱۷☆ معادله حرکت دو جسم A و B در SI به ترتیب به صورت $x_B = -4t^2 + t + 3$ و $x_A = -4t^2 + 8$ است. در لحظه‌ای که دو جسم به هم می‌رسند، جسم A در چه فاصله‌ای از مکان اولیه خود قرار دارد؟

(۱) ۱۰۰

(۲) ۹۲

(۳) ۱۰۴

(۴) ۱۰۲

۲۰۱۸☆ معادله حرکت جسم A در SI به صورت $\begin{cases} x = -t + 8 \\ y = t^2 - 1 \end{cases}$ است. در چه فاصله‌ای بر حسب متر از (مشابه کنکور قدیم) مبدأ محور این دو جسم به هم می‌رسند؟

(۱) (۴) دو جسم به هم نمی‌رسند.

(۲) ۸

(۳) ۲۳

(۴) ۱۳

(ب) سرعت متوسط

○ برای بررسی حرکت باید بدونیم جسم با بهای روتوفی مدت زمانی انباش می‌ده! بالافره زمان داره وارد مهابرات میشه.

۲۰۱۹☆ با توجه به داده‌های جدول زیر، در مدت ۴ ثانیه سرعت متوسط متجرک A از سرعت متوسط متجرک B و متجرک A و متجرک B است. (برگرفته از کتاب درسی)

مسافت	$(t = 0)$	مکان نهایی ($t = 4s$)	مکان آغازین ($t = 0$)	متجرک A	متجرک B
۲۵m	$-12\vec{i}$	$-6\vec{i}$			
۲۰m	$-14\vec{i}$	$+6\vec{i}$			

(۱) کمتر – دارای تغییر جهت – دارای تغییر جهت

(۲) بیشتر – دارای تغییر جهت – فاقد تغییر جهت

(۳) بیشتر – فاقد تغییر جهت – دارای تغییر جهت

(۴) بیشتر – دارای تغییر جهت – فاقد تغییر جهت

۲۰۲۰☆ دو خودروی A و B در جایه‌جایی بین دو نقطه از مسیرهای متفاوتی استفاده می‌کنند، اما زمان حرکت آن‌ها برابر است. در این صورت چند

مورود از عبارت‌های زیر در مورد حرکت دو خودرو نادرست است؟

(آ) سرعت متوسط دو خودرو کمیتی برداری است. در این صورت چون مسیرها متفاوت است، این کمیت برای دو خودرو یکسان نیست.

(ب) سرعت متوسط دو خودرو در این جایه‌جایی با هم برابر است.

(پ) جایه‌جایی دو خودرو با هم برابر است اما سرعت متوسط می‌تواند متفاوت باشد.

(۱) (۴) صفر (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۲۰۲۱♂ سرعت متوسط خودرویی در جایه‌جایی بین دو نقطه A و B برابر 72km/h است. کدامیک از جملات زیر قطعاً درست است؟

(۱) خودرو در جایه‌جایی بین این دو نقطه توقف نکرده است.

(۲) سرعت خودرو حداقل یکبار 72km/h است.

(۳) فاصله بین دو نقطه از 72km بیشتر نیست.

(۴) خودرو همواره با سرعت 72km/h حرکت کرده است.

۲۰۲۲☆ معادله حرکت متجرکی در SI به صورت $x = 0/25 + \sin \pi t$ است. سرعت متوسط آن در ۵ ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ (kg)

(۱) صفر (۲) $0/05$ (۳) $0/25$ (۴) $0/15$

۲۰۲۳☆ مکان متجرکی روی محور x در لحظه $t = 2s$ برابر 8m و در لحظه $t = 10s$ برابر 16m می‌باشد. سرعت متوسط متجرک در این مدت (kg) چند m/s است؟

(۱) (۴) ۲ (۲) ۱ (۳) ۱ (۴) ۲


۲۰۲۴☆ متجرکی روی محور x حرکت می‌کند و در مبدأ زمان از مکان $x_0 = -40\text{m}$ می‌گذرد و در لحظه $t_1 = 6s$ به مکان $x_1 = 100\text{m}$ می‌رسد و در نهایت در لحظه $t_2 = 10s$ از مکان $x_2 = 20\text{m}$ می‌گذرد. سرعت متوسط این متجرک در SI در این ۱۰ ثانیه، کدام است؟ (سراسری تهریه ۹۸)

(۱) (۴) ۶ (۲) ۱۴ (۳) ۶ (۴) ۲

۲۰۲۵☆ متجرکی در مدت ۱۰ ثانیه بر مسیر مستقیمی به اندازه 100m بر جایه‌جا می‌شود و سپس ۲۰ متر در مدت ۴۰ ثانیه در همان مسیر برمی‌گردد. سرعت متوسط در کل این حرکت چند متر بر ثانیه است؟

(۱) $2/4$ (۲) $4/2$ (۳) $1/6$ (۴) $8/3$

۲۰۲۶. گلوله‌ای از نقطه $O(0,0)$ رو به بالا پرتاب می‌شود و حداکثر ۲۰ متر نسبت به نقطه O بالا می‌رود. اگر زمان حرکت جسم از لحظه پرتاب تا لحظه برخورد به سطح زمین ۵ ثانیه طول کشیده باشد، سرعت متوسط حرکت گلوله در SI کدام است؟ (مسیر حرکت گلوله برخط مستقیم فرض شده است).



$$-\vec{j} \quad (3)$$

$$-2\vec{j} \quad (2)$$

$$+2\vec{j} \quad (1)$$

۲۰۲۷☆. متحرکی مطابق شکل در مدت ۲ ثانیه از نقطه A تا B جابه‌جا می‌شود. سرعت متوسط متحرک در این جابه‌جایی چند متر بر ثانیه است؟

$$12\sqrt{2} \quad (1)$$

$$24 \quad (2)$$

$$12 \quad (3)$$

$$24\sqrt{2} \quad (4)$$

۲۰۲۸✿. متحرکی در صفحه افقی xoy حرکت می‌کند. این متحرک از مبدأ حرکت ابتدا در جهت محور x و سپس در جهت محور y حرکت می‌کند. مسافت پیموده شده در این حرکت $\frac{3}{2}$ برابر جابه‌جایی انجام شده است. اگر زمان انجام جابه‌جایی‌ها روی دو محور یکسان باشد، سرعت متوسط متحرک در جهت محور x چند برابر سرعت متوسط در جهت محور y می‌تواند باشد؟

$$3 + \sqrt{2} \quad (4)$$

$$2 + 3\sqrt{2} \quad (3)$$

$$3 + 2\sqrt{3} \quad (2)$$

$$2 + \sqrt{3} \quad (1)$$

۲۰۲۹. معادله مکان – زمان دو خودروی A و B که در یک راستا حرکت می‌کنند، در SI به صورت $x_A = 9t^2 - 9t + 9$ و $x_B = 3t^2 - 9t + 9$ است. سرعت متوسط متحرک‌ها بین دو لحظه‌ای که از کنار هم عبور می‌کنند، چند متر بر ثانیه است؟

$$+6 \quad (4)$$

$$+9 \quad (3)$$

$$-6 \quad (2)$$

$$-9 \quad (1)$$

۲۰۳۰✿. معادله مکان – زمان حرکت جسمی در SI به صورت $x = 2t^3 - 4t^2 - 18t + 20$ است. سرعت متوسط جسم از لحظه شروع حرکت ($t = 0$) تا چه لحظه‌ای بر حسب ثانیه برابر 42 m/s می‌شود؟

$$1 + \sqrt{30} \quad (4)$$

$$1 + \sqrt{31} \quad (3)$$

$$\sqrt{30} - 1 \quad (2)$$

$$\sqrt{31} \quad (1)$$

۲۰۳۱✿. در شکل مقابل نقطه A روی محیط چرخ خودرویی به قطر 40 سانتی‌متر قرار دارد. سرعت متوسط نقطه A در مدت زمان $\frac{\pi}{3}$ ثانیه که چرخ خودرو یک دور کامل طی کرده باشد، چند m/s است؟

$$0/4 \quad (2)$$

$$4 \quad (4)$$

$$8 \quad (1)$$

$$0/8 \quad (3)$$

(پ) تندی متوسط

۲۰۳۲. تو قسمت قبل با سرعت متوسط آشنا شدیم، حالا با یه مفهوم دیگه باید به بررسی حرکت پردازیم که تفاوتش با سرعت متوسط می‌توانه تو تعیین شکل مسیر حرکت بومون کمک کنه.

۲۰۳۲✿. در حرکت جسم بین دو نقطه، تندی متوسط برابر 7 km/h و سرعت متوسط برابر 5 km/h است. در این صورت کدام گزینه در مورد مسیر حرکت جسم درست است؟ (برگفته از کتاب درسی)

(۱) حرکت بر مسیر مستقیم، بدون تغییر جهت انجام شده است.

(۲) حرکت بر مسیر غیرمستقیم انجام شده است.

(۳) حرکت بر مسیر مستقیم انجام شده است.

۲۰۳۳☆. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد تندی متوسط و سرعت متوسط نادرست است؟

(آ) در جابه‌جایی بین دو نقطه، تندی متوسط می‌تواند صفر باشد.

(ب) در جابه‌جایی بین دو نقطه متوسط و سرعت متوسط می‌تواند برابر باشد.

(پ) اگر جسم بین دو نقطه حرکت رفت و برگشت انجام دهد، سرعت متوسط نصف تندی متوسط است.

(ت) اگر جسمی روی محیط دایره‌ای حرکت کند هنگامی که نصف محیط دایره طی می‌شود، تندی متوسط از سرعت مقدار بیش تری دارد.

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$


۲۰۳۴. متحرکی روی محور x ابتدا جابه‌جایی $\vec{d}_1 = -10\text{m}$ را در مدت ۲ ثانیه انجام می‌دهد، سپس جابه‌جایی $\vec{d}_2 = +20\text{m}$ را در مدت ۳ ثانیه انجام می‌دهد. تندی متوسط در این جابه‌جایی چند متر بر ثانیه است؟

$$5 \quad (4)$$

$$3\sqrt{5} \quad (3)$$


$$6 \quad (2)$$

$$2\sqrt{5} \quad (1)$$




۲۰۳۵. ذرهای مطابق شکل از نقطه A تا نقطه D در مدت ۱۰ ثانیه جابه‌جا می‌شود. تندی متوسط در این جابه‌جایی چند متر بر ثانیه است؟ ($\pi = 3$)

(۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۱/۵
(۴) ۳



- ۲۰۳۶☆. مطابق شکل آونگی به طول ۶۰ سانتی‌متر از حالتی که امتداد آن با محور قائم زاویه ۳ درجه می‌سازد، رها می‌شود. آونگ در مدت $1/2$ ثانیه به حالتی که نخ در راستای قائم قرار می‌گیرد می‌رسد. تندی متوسط حرکت آونگ در این مدت چند متر بر ثانیه است؟

$\frac{\pi}{5}$ (۴) $\frac{\pi}{20}$ (۳) 20π (۲) 5π (۱)



- ۲۰۳۷●. ذرهای منطبق بر محیط مکعبی به ضلع ۶ متر در مدت $10\sqrt{3}$ ثانیه از نقطه A می‌خواهد به رأس کنج مقابل مکعب در آن سوی قطر مکعب برود. کمترین تندی متوسط حرکت ذره چند متر بر ثانیه است؟

$3/6\sqrt{5}$ (۴) $1/8\sqrt{5}$ (۳) 6 (۲) $0/6$ (۱)

○ تو تست‌های زیر داریم تندی متوسط و سرعت متوسط را مقایسه می‌کنیم. هواسمون به شکل مسیر هرکت باشه!

- ۲۰۳۸☆. ذرهای روی خط $y = -2x + 4$ فاصله بین دو نقطه به اندازه ۱۰۰ متر را در مدت ۲۰ ثانیه می‌پیماید. سپس به مدت ۱۰ ثانیه، ۷۰ متر را در همان مسیر برمی‌گردد. تندی متوسط متحرك در این مدت چند برابر سرعت متوسط است؟

$\frac{20}{3}$ (۴) $\frac{3}{20}$ (۳) $\frac{3}{17}$ (۲) $\frac{17}{3}$ (۱)

۲۰۳۹. شناگری در مدت Δt_1 ثانیه طول استخری که برابر ۳۰ متر است را در مسیر مستقیم می‌پیماید. اگر نصف همین مسیر را در برگشت و در مدت Δt_2 ثانیه طی کند، سرعت متوسط آن در کل مسیر چند برابر تندی متوسط آن است؟

$\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{1}{3}$ (۳) 2 (۲) 3 (۱)

- ۲۰۴۰●. ذرهای روی محور x در حرکت است و مسافت ۴۵ متر را در مدت ۹ ثانیه می‌پیماید. سرعت متوسط آن برحسب متر بر ثانیه در کل مسیر حرکت کدام گزینه می‌تواند باشد؟

-۶ (۴) -۸ (۳) +۴ (۲) +۶ (۱)

○ جسمی فاصله بین دو نقطه بر مسیر مستقیم را بدون تغییر جهت به دو صورت زیر طی می‌کند:

- (آ) نصف مسیر را با تندی ثابت 10 m/s و نصف دیگر را با تندی ثابت 20 m/s پیماید.
(ب) نصف زمان حرکت را با تندی ثابت 10 m/s و نصف دیگر زمان را با تندی ثابت 20 m/s پیماید.


تندی متوسط در حالت (ب) چند برابر حالت (آ) است؟

$\frac{9}{8}$ (۴) ۹ (۳) ۸ (۲) $\frac{8}{9}$ (۱)


ت) نمودار مکان – زمان (x-t)

○ نمودار مکان – زمان نشون می‌دهد پهلوی مکان جسم بر هسب زمان تغییر می‌کنه. وقت کنیم که شکل مسیر هرکت رو نشون نمی‌ده.


- ۲۰۴۲☆. نمودارهای مکان – زمان برای چند جسم رسم شده است. چند مورد از نمودارها برای حرکت جسم‌ها، امکان‌پذیر است؟ (برگفته از کتاب دس)




۴ (۴)




۳ (۳)



۲ (۲)






۱ (۱)



نمودار مکان - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. کدام یک از گزینه‌های زیر شکل مسیر (برگرفته از کتاب درسی)

حرکت را درست نشان می‌دهد؟




○ تو بررسی نمودار مکان - زمان و استفاده از آن برای تحلیل حرکت هوازموں فقط به محور X باش، فریب شکل نمودارو نفوریم.

۲۰۴۴☆ نمودارهای مکان - زمان دو جسم A و B مطابق شکل رسم شده است. در بازه زمانی مشخص شده چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟


- (آ) دو جسم بر مسیر مستقیم حرکت نمی‌کنند.
(پ) سرعت متوسط متحرک B از A بیشتر است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴




نمودار مکان - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. در کدام بازه زمانی تندی متوسط جسم صفر است؟

- (۱) $t_3 - t_4$ (۲) $t_1 - t_3$ (۳) $t_2 - t_4$




۲۰۴۶☆ شکل رویه رو نمودار مکان - زمان حرکت جسمی روی خط راست را نشان می‌دهد. در دو ثانیه اول حرکت، جسم در حال حرکت است و در دو ثانیه دوم حرکت علامت سرعت متوسط است.

- (۱) در جهت مثبت محور - منفی
(۳) به سمت مبدأ محور - منفی




۲۰۴۷☆ نمودار مکان - زمان متحرکی سه‌می و مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در کدام بازه زمانی بیشتر است؟

- (۱) صفر تا t_1 (۲) t_1 تا t_2 (۳) t_2 تا t_3



۲۰۴۸☆ نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل رسم شده است. کدام یک از عبارت‌های زیر در مورد این دو متحرک نادرست است؟

- (۱) از لحظه شروع بررسی حرکت تا لحظه t_1 ، مقدار سرعت متوسط دو متحرک با هم برابر است.
(۲) از لحظه t_1 تا لحظه t_3 مقدار سرعت متوسط B از A بیشتر است.
(۳) از لحظه t_2 تا لحظه t_4 سرعت متوسط A از B بیشتر است.
(۴) سرعت متوسط B از A در کل حرکت بیشتر است.



۲۰۴۹☆ نمودار مکان - زمان حرکت جسمی روی خط راست مطابق شکل است. کدام یک از عبارت‌های زیر در بررسی حرکت جسم درست است؟

- (۱) تندی متوسط جسم در مدت ۴ ثانیه برابر صفر است.
(۲) سرعت متوسط در دو ثانیه اول حرکت صفر است.
(۳) در ثانیه سوم حرکت جسم به مبدأ محور نزدیک می‌شود.
(۴) در ثانیه چهارم حرکت علامت سرعت متوسط منفی است.

○ آله رابطه مکان - زمان مشفون باشه برای تحلیل حرکت کافیه نمودار مکان - زمان رو رسم کنیم.

۲۰۵۰☆ معادله مکان - زمان جسمی در SI به صورت $x = -4t^2 + 2t + 4$ است. جایه جایی انجام شده توسط جسم در ۲ ثانیه اول حرکت چند برابر مسافت پیموده شده در این بازه زمانی است؟

- (۱) -۱ (۲) -۴ (۳) +۱ (۴) +۴

۲۰۵۱☆ معادله مکان - زمان جسمی در SI به صورت $x = -t^2 + 4t - 4$ است. در فاصله زمانی بین $t_1 = 0$ و $t_2 = 4$ مسافت طی شده توسط جسم چند متر است؟

- (۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

۲۰۵۲. متحرکی روی محور x حرکت می‌کند و معادله مکان – زمان آن در SI به صورت $-x = -2t^3 + 12t - 40$ است. مسافتی که این متحرک در بازه زمانی صفر تا $t = 5s$ طی می‌کند، چند متر است؟

۲۶ (۴)

۲۴ (۳)

۱۵ (۲)

۱۰ (۱)

۲۰۵۳. معادله مکان – زمان حرکت جسمی در SI به صورت $x = 4t - 4t^2$ است. تندی متوسط جسم در مدت ۴ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۰۵۴. هالا که تحلیل نمودار مکان – زمان رو یاد گرفتیم، می‌ریم سراغ مهاسبه کمیت‌های حرکت از روی این نمودار


۲۰۵۴. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. در مدت زمانی که جسم در فاصله ۳ متری از مبدأ محور قرار دارد، تندی متوسط حرکت جسم چند متر بر ثانیه است؟

۲ (۲)

۴ (۴)

۱ (۱)

۰/۵ (۳)




۲۰۵۵. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. تندی متوسط جسم در مدت زمانی که به مبدأ محور در حال نزدیک شدن است، چند m/s است؟

۱/۴ (۱)

۱/۲۵ (۲)

۲/۵ (۳)

۰/۷ (۴)




۲۰۵۶. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. تندی متوسط جسم در مدت زمانی که در جهت منفی محور حرکت می‌کند، چند متر بر ثانیه است؟


-۸/۳ (۱)

۴/۳ (۲)

-۸/۳ (۳)



۲۰۵۷. نمودار مکان – زمان حرکت دوچرخه‌سواری مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت دوچرخه‌سوار نادرست است؟



(برگرفته از کتاب درس)

آ) در دو ثانیه سوم حرکت، دوچرخه‌سوار ساکن است.

ب) بیشترین فاصله دوچرخه‌سوار از مبدأ محور برابر ۹۰ متر است.


پ) تندی متوسط در کل حرکت صفر است.

ت) در دو ثانیه پنجم حرکت، سرعت متوسط در جهت مثبت محور است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)




۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)



(برگرفته از کتاب درس)


آ) سرعت متوسط بین دو بازه زمانی t_2 تا t_4 صفر است.ب) تندی متوسط در بازه زمانی t_2 تا t_4 صفر است.پ) جهت حرکت در لحظه‌های t_1 و t_5 تغییر کرده است.

ت) سرعت متوسط در کل حرکت مثبت است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)



(برگرفته از کتاب درس)


آ) چند متر است؟ (مکان x فرضی رسم شده است).

۱۰ (۲)

۱۰/۷ (۱)

۲۰/۷ (۳)

۶۱ (۴)



(برگرفته از کتاب درس)

آ) حركت دو برابر مقدار سرعت متوسط در ۶ ثانیه آخر حرکت است. مکان جسم در لحظه $t = 4s$ چند متر است؟

۴۰ ، -۲۰ (۲)

۳۰ ، -۲۰ (۳)


۳۰ (۴)

۲۰۵۹. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. مقدار سرعت متوسط در ۴ ثانیه اول حرکت دو برابر مقدار سرعت متوسط در ۶ ثانیه آخر حرکت است. مکان جسم در لحظه $t = 4s$ چند متر است؟ (مکان x فرضی رسم شده است).

۲۰۶۰. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی در راستای محور افقی به صورت شکل مقابل رسم شده است. در این صورت جسم در مبدأ زمان از متري مبدأ عبور کرده است و مسافت پیموده شده توسط آن در مدت زمان ۱۰ ثانیه برابر متر است.


۱۰ ، -۲۰ (۲)

۳۰ ، -۲۰ (۳)




- ۲۰۶۱☆ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. در مدت زمانی که جسم به مبدأ محور نزدیک می‌شود، سرعت متوسط چند متر بر ثانیه است؟
(برگرفته از کتاب درسی)

- ۲ (۲)
۱ (۴)
۰/۵ (۳)




- ۲۰۶۲ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. تندی متوسط در کل حرکت چند برابر سرعت متوسط در دو ثانیه دوم حرکت است؟

- ۲ (۲)
-۱ (۴)
+۱ (۱)
+۲ (۳)




- ۲۰۶۳☆ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. تندی متوسط جسم در مدت زمان

- حرکت برابر $s/3m$ است. سرعت متوسط آن در این مدت چند متر بر ثانیه است?
-۳ (۲)
+۱ (۱)
-۱ (۴)
+۳ (۳)




- ۲۰۶۴ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی که منطبق بر محور x ها حرکت می‌کند، مطابق شکل است. اختلاف تندی متوسط حرکت جسم و سرعت متوسط حرکت آن در مدت زمان ۱۶ ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟

- $\frac{1}{3}$ (۲)
 $\frac{2}{3}$ (۱)



- ۲۰۶۵☆ نمودار مکان – زمان حرکت خودرویی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. اگر اندازه شیب خطهای m_1 و m_2 به ترتیب برابر $3/5$ و 2 باشد، تندی متوسط خودرو در مدت زمان مشخص شده چند متر بر ثانیه است؟
(برگرفته از کتاب درسی)

- $\frac{1}{3}$ (۲)
 $\frac{2}{3}$ (۱)




- ۲۰۶۶☆ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. تندی متوسط در مدتی که جسم از مبدأ محور دور شده است چند برابر تندی متوسط در مدت زمانی است که جسم به مبدأ محور نزدیک شده است؟

- ۲ (۲)
۲/۵ (۱)
۱ (۳)


۲۰۶۷ معادله مکان – زمان حرکت جسمی در SI به صورت $x = 2t - 2t^2$ است. تندی متوسط جسم پس از ۴ ثانیه چند برابر سرعت متوسط جسم
(برگرفته از کتاب درسی)

- ۱ (۴)
۳ (۳)
۲ (۲)



- ۲۰۶۸☆ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق سهمی شکل مقابل است. تندی متوسط جسم در ۶ ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟
(برگرفته از کتاب درسی)

- ۲/۵ (۲)
۱/۲۵ (۴)
۰ (صفر)



- ۲۰۶۹ با توجه به نمودار مکان – زمان داده شده که مربوط به حرکت جسمی بر مسیر مستقیم است، اگر شیب پاره خط ab برابر $\frac{4}{3}$ باشد، در این صورت $t_2 - t_1$ چند ثانیه است؟

- ۲ (۲)
۳ (۴)
۶ (۳)

○ تو تستای زیر داریم دو تا مفهوم روبرویی می‌کنیم که فیلی برامون اهمیت داره. نویشون با هم فرق داره، یکی برداری، یکی عددي.

- ۲۰۷۰ با توجه به شکل مقابل، عدد نمایش داده شده، حرکت است و در مورد جهت حرکت
(برگرفته از کتاب درسی)

اطلاعاتی به ما گزارش

- (۱) تندی – می‌کند.
(۲) سرعت – نمی‌کند.
(۳) تندی – نمی‌کند.
(۴) سرعت – می‌کند.



(ث) تندی لحظه‌ای و سرعت لحظه‌ای

(برگرفته از کتاب درسی)

۲۰۷۱☆. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟

- (آ) تندی لحظه‌ای با توجه به نوع حرکت می‌تواند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از اندازه سرعت لحظه‌ای باشد.
 (ب) تندی لحظه‌ای همان اندازه سرعت لحظه‌ای است.
 (پ) شیب خط مماس بر نمودار مکان – زمان در هر لحظه تندی لحظه‌ای است.
 (ت) شیب خط مماس بر نمودار مکان – زمان در هر لحظه سرعت لحظه‌ای است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۰۷۲☆. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم بر مسیر مستقیم درست است؟

- (آ) در لحظه تغییر جهت سرعت متحرک صفر می‌شود.
 (ب) ممکن است با صفر شدن سرعت حرکت جسم، جهت حرکت آن تغییر نکند.
 (پ) قبل از تغییر جهت حرکت جسم، حرکت آن به صورت کندشونده انجام می‌شود.
 (ت) اگر تندی حرکت جسم صفر شود، جهت حرکت آن تغییر می‌کند.

۴ (۴)

۳ (۳)


۲ (۲)

۱ (۱)

|| (ج) تعیین سرعت لحظه‌ای به کمک نمودار مکان – زمان

● یکی از مهم‌ترین ابزارهای تو بررسی هرگزه، باهش می‌توانیم کلی اطلاعات در مورد هرگزه به درست بیاریم. هواسمون باشه با شکل مسیر هرگزه اشتباه نشه.

۲۰۷۳. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم درست است؟



(برگرفته از کتاب درسی)

(آ) تندی جسم در لحظه t_3 کوچک‌تر از تندی جسم در لحظه t_1 است.(ب) در لحظه t_2 جهت حرکت جسم تغییر می‌کند.(پ) جسم در لحظه t_3 نسبت به لحظه‌های t_1 و t_2 در فاصله بیشتری نسبت به مبدأ محور قرار دارد.

(ت) ۳ (۳) ۲ (۲) ۱ (۱)

۲۰۷۴☆. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم نادرست است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

(آ) جهت حرکت جسم یک بار تغییر کرده است.


(ب) از لحظه شروع حرکت تا لحظه t تندی جسم در حال کاهش است.

(پ) قبل از تغییر جهت حرکت، جسم در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.

(ت) ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳)

۲۰۷۵. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

(برگرفته از کتاب درسی)



(آ) در سه ثانیه اول حرکت تندی جسم در حال کاهش است.

(ب) در ثانیه چهارم حرکت، سرعت متوسط جسم در جهت مثبت محور است.

(پ) سرعت متوسط بین دو لحظه $t_1 = 1\text{s}$ و $t_2 = 3\text{s}$ با سرعت جسم در لحظه $t = 2\text{s}$ برابر است.(ت) در لحظه $t = 3\text{s}$ سرعت حرکت جسم مثبت است.(آ) در لحظه $t = 3\text{s}$ سرعت حرکت جسم صفر است.(ب) در لحظه $t = 3\text{s}$ سرعت حرکت جسم داده شده درست است.

(پ) در مورد مقایسه سرعت‌ها در دو لحظه نشان داده شده درست است؟

$$\left| \frac{v_1}{v_2} \right| < 1 \quad (۱)$$


$$\left| \frac{v_1}{v_2} \right| > 1 \quad (۲)$$

$$\left| \frac{v_1}{v_2} \right| = 1 \quad (۳)$$

(پ) هر سه حالت ممکن است.

(آ) نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. کدامیک از گزینه‌های زیر،


(برگرفته از کتاب درسی)




۲۰۷۶. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. کدامیک از گزینه‌های زیر،

(آ) در لحظه‌های t_1 و t_3 سرعت جسم با هم برابر است.(ب) در لحظه t_4 سرعت با لحظه شروع حرکت یکسان است.(پ) در لحظه‌های t_1 و t_3 تندی حرکت جسم یکسان است.(ت) در لحظه t_4 سرعت حرکت جسم صفر است.(آ) در لحظه‌های t_1 و t_3 سرعت جسم با هم برابر است.(ب) در لحظه t_4 سرعت با لحظه شروع حرکت یکسان است.(پ) در لحظه‌های t_1 و t_3 تندی حرکت جسم یکسان است.(ت) در لحظه t_4 سرعت حرکت جسم صفر است.

۲۰۷۷. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق سه‌می شکل است. کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت جسم درست است؟

(آ) در لحظه‌های t_1 و t_3 سرعت جسم با هم برابر است.(ب) در لحظه t_4 سرعت با لحظه شروع حرکت یکسان است.(پ) در لحظه‌های t_1 و t_3 تندی حرکت جسم یکسان است.(ت) در لحظه t_4 سرعت حرکت جسم صفر است.(آ) در لحظه‌های t_1 و t_3 سرعت جسم با هم برابر است.(ب) در لحظه t_4 سرعت با لحظه شروع حرکت یکسان است.(پ) در لحظه‌های t_1 و t_3 تندی حرکت جسم یکسان است.(ت) در لحظه t_4 سرعت حرکت جسم صفر است.

۲۰۷۸☆. نمودار مکان – زمان دو متجرک A و B مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر درست است؟



(آ) دو متجرک یک بار در یک مکان قرار گرفته‌اند.

(ب) متجرک B ابتدا در جهت مثبت محور و پس از مدتی در جهت منفی محور حرکت می‌کند.

(پ) متجرک A در لحظه شروع بررسی حرکت، در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.

(ت) در لحظه t_1 ، تندی دو متجرک با هم برابر است.

۴ (۴)


۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

● تستای زیر پهلویان یاد می‌ده پهلوی سرعت و سرعت متوسط رو با استفاده از نمودار $x - t$ مسأله کنیم.

- ۲۰.۷۹ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. سرعت جسم در لحظه $t = 5s$ چند برابر سرعت متوسط آن در کل مدت زمان نشان داده است؟
(برگرفته از کتاب درسی)



- $\frac{1}{2}$ (۲)
 $\frac{1}{3}$ (۱)
۲ (۴)
۳ (۳)

- ۲۰.۸۰ نمودار مکان – زمان متحرکی بر مسیر مستقیم به صورت شکل مقابل است. اگر سرعت متحرک در لحظه $t = 10s$ برابر سرعت متوسط آن بین دو لحظه $t_1 = 5s$ و $t_2 = 12s$ باشد، متحرک در لحظه $t = 12s$ در چند متري مبدأ می‌باشد؟
(kg)

- ۲۴ (۲)
۲۰ (۴)
۲۸ (۱)
۳۶ (۳)

- ۲۰.۸۱ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی روی محور x مطابق شکل است. بردار مکان جسم چه مدت زمانی بر حسب ثانیه در جهت منفی محور است؟
(kg)

- ۴ (۲)
۸ (۴)
۲ (۱)
۶ (۳)

- ۲۰.۸۲ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. اگر سرعت جسم در لحظه $t = 6s$ برابر ۴ متر بر ثانیه باشد، فاصله نقطه x از مکان اولیه جسم چند متر است؟
(برگرفته از کتاب درسی)

- ۱۶ (۱)
۲۶ (۳)
۶ (۲)
۱۰ (۴)

- ۲۰.۸۳ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. سرعت جسم در لحظه $t = 5s$ چند برابر سرعت متوسط در کل حرکت است؟
(kg)


- $\frac{3}{7}$ (۲)
 $\frac{7}{3}$ (۴)
 $\frac{1}{7}$ (۱)
 $\frac{1}{3}$ (۳)

● تستای زیر پهلویان که بحث هر کلت پهلوی تعیین می‌شود، موافق باشد به بحث شب فقط مماس باشد.

- ۲۰.۸۴ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. جهت حرکت جسم چند بار تغییر کرده است؟
(برگرفته از کتاب درسی)

- ۱۱ (۱)
۲۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

- ۲۰.۸۵ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم نادرست است؟ $(\alpha > \beta)$
(kg)



- (۱) در بازه زمانی $(t_1 - t_2)$ جسم در جهت مثبت محور حرکت کرده است.
(۲) در بازه زمانی $(t_2 - t_4)$ جسم در جهت منفی محور حرکت کرده است.
(۳) تندی جسم در بازه زمانی $(t_1 - t_2)$ از بازه زمانی $(t_2 - t_3)$ بزرگ‌تر است.
(۴) جسم در دو بازه زمانی متوقف شده است.


(برگرفته از کتاب درسی)

- ۲۰.۸۶ در چند مورد از نمودارهای مکان – زمان رسم شده، سرعت متوسط همواره با سرعت لحظه‌ای برابر است؟
(kg)




- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴) صفر

- ۲۰.۸۷ نمودار مکان – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. در مدت زمان نشان داده شده، سرعت حرکت جسم چند بار صفر شده است و جهت حرکت جسم چند بار تغییر کرده است؟
(برگرفته از کتاب درسی)



- ۱ - ۱ (۲)
۲ - ۱ (۴)
۲ - ۲ (۳)

۲۰۸۸. خودرویی روی خط راست شروع به حرکت می‌کند و پس از مدتی می‌ایستد. کدام نمودار داده شده می‌تواند مشخص کنندهٔ حرکت خودرو باشد؟



۲۰۸۹☆. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. نسبت سرعت متوسط متحرک پس از تغییر جهت حرکت به سرعت متوسط قبل از تغییر جهت حرکت کدام است؟

$$\begin{array}{ll} -\frac{7}{4} & (2) \\ +\frac{7}{4} & (1) \\ +\frac{4}{7} & (4) \\ -\frac{4}{7} & (3) \end{array}$$

۲۰۹۰. نمودار مکان – زمان حرکت جسمی که بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت این جسم درست است؟

- (آ) بردار مکان جسم در ۶ ثانیه اول حرکت در جهت مثبت محور است.
 (ب) سرعت جسم در لحظه $t = 8\text{s}$ برابر 5m/s است.
 (پ) جهت حرکت جسم دوبار تغییر کرده است.
 (ت) جسم در مدت ۵ ثانیه در جهت منفی محور حرکت کرده است.

$$\begin{array}{ll} 4(4) & 3(3) \\ 2(2) & 1(1) \end{array}$$

(ج) شتاب متوسط

○ تا حالا به این چمله وقت کردن که صفر تا صد یه ماشین چقدر طول می‌کشد؟ تو این پرسش دارید از شتاب هرف می‌زنید. تو تستی زیر کمیتی که تغییر سرعت رو مشاهده می‌کنند، بررسی می‌شود.

۲۰۹۱☆. در چند مورد از حالت‌های زیر، حرکت جسم با شتاب انجام می‌شود؟

- (آ) تندی خودرویی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند، دچار تغییرات شود.
 (ب) جسمی را به طنایی بسته‌ایم و در صفحه‌ای قائم دوران می‌دهیم.
 (پ) جسمی به فنری متصل شده و در حال حرکت رفت و برگشت در راستای قائم است.
 (ت) خودرویی که در مسیر مستقیم با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

$$\begin{array}{ll} 4(4) & 3(3) \\ 2(2) & 1(1) \end{array}$$

۲۰۹۲. مطابق شکل خودرویی بر محور x در حال حرکت است. شتاب متوسط بین دو لحظه

مشخص شده چند متر بر مربع ثانیه است؟

$$\begin{array}{ll} -2/5 & (2) \\ +7/5 & (1) \\ +2/5 & (4) \\ -7/5 & (3) \end{array}$$

جسمی بر مسیر مستقیم طوری حرکت می‌کند که به طور متوسط در هر ثانیه به مقدار سرعت آن 3m/s اضافه می‌شود. اگر در لحظه $t = 4\text{s}$ شروع بررسی حرکت، تندی حرکت جسم 6m/s باشد و جسم در جهت منفی محور حرکت کند، سرعت حرکت جسم در لحظه $t = 7\text{s}$ چند متر بر ثانیه است؟

$$\begin{array}{ll} 9(4) & 18(3) \\ 1(1) & 12(2) \\ 2(2) & 6(1) \end{array}$$

۲۰۹۴. شتاب متوسط متحرکی که در مدت $1/5$ ثانیه از سرعت 1cm/s به 99cm/s می‌رسد، در SI برابر است با:

$$\begin{array}{ll} 200 & 196 \\ 4(4) & 3(3) \\ 1(1) & 2(2) \end{array}$$

۲۰۹۵☆. معادله سرعت – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم و در SI به صورت $v = -2\pi \sin 5\pi t$ است. شتاب متوسط جسم بین دو لحظه $t_1 = 0/25\text{s}$ و $t_2 = 1\text{s}$ چند متر بر مربع ثانیه است؟

$$\begin{array}{ll} -\frac{8\pi}{3} & (4) \\ -0/8\pi & (3) \\ +\frac{8\pi}{3} & (2) \\ +0/8\pi & (1) \end{array}$$

۲۰۹۶. گلوله‌ای را از پایین سطح شبیداری با تندی 5m/s به طرف بالا و مماس بر سطح شبیدار برتاپ می‌کنیم. گلوله پس از $7/10$ ثانیه تغییر جهت می‌دهد و $2/3$ ثانیه پس از آن با تندی 1m/s رو به پایین حرکت می‌کند. شتاب متوسط گلوله در این مدت چند متر بر مربع ثانیه است؟


$$\begin{array}{ll} +4 & (4) \\ -6 & (3) \\ -4 & (2) \\ +6 & (1) \end{array}$$

۲۰۹۷. متحرکی بر مسیر مستقیم، فاصله بین دو نقطه را در مدت زمان 25 ثانیه می‌پیماید. شتاب متوسط متحرک در 5 ثانیه اول حرکت در $\vec{a}_1 = +6\vec{i}$ و در بقیه مدت زمان حرکت برابر $\vec{a}_2 = -0/2\vec{i}$ است. شتاب متوسط متحرک در کل مدت زمان حرکت در SI کدام است؟

$$\begin{array}{ll} \vec{a}_{av} = +\frac{26}{25}\vec{i} & (4) \\ \vec{a}_{av} = +3/2\vec{i} & (3) \\ \vec{a}_{av} = -\frac{26}{25}\vec{i} & (2) \\ \vec{a}_{av} = -3/2\vec{i} & (1) \end{array}$$

۲۰۹۸☆ جسمی مطابق شکل از نقطه A تا نقطه B در مسیر نشان داده شده جایه جا می‌شود. اگر تنیدی حرکت جسم ثابت و برابر 2m/s باشد،

شتاب متوسط بین دو نقطه A و B در SI کدام است؟



$+5\hat{j} \quad (2)$

$+4\hat{j} \quad (4)$

$-1\hat{j} \quad (1)$

$-2\hat{j} \quad (3)$

مکانه جسم تو صفحه هر کلت کنه، به طوری که بدرارهای سرعتش بر هم عمود باشند. برای مهاسبه تغییرات سرعت هواسمون باشه از رابطه دو بدرار عمود بر هم استفاده کنیم.

۲۰۹۹☆ بدرار سرعت حرکت جسمی در SI در دو لحظه $t_1 = 2\text{s}$ و $t_2 = 5\text{s}$ به ترتیب به صورت $\vec{v}_1 = +3(\text{m/s})\hat{i}$ و $\vec{v}_2 = -3(\text{m/s})\hat{j}$ است. شتاب متوسط در این مدت چند متر بر مربع ثانیه است؟

$4\sqrt{2} \quad (4)$

$2\sqrt{2} \quad (3)$

$\sqrt{2} \quad (2)$

$2 \quad (1)$

۲۱۰۰☆ بدرار سرعت جسمی در لحظه $t_1 = 3\text{s}$ به صورت $\vec{v}_1 = -7\hat{i} + 7\hat{j}$ و در لحظه $t_2 = 5\text{s}$ به صورت $\vec{v}_2 = -7\hat{i} + 7\hat{j}$ است. شتاب متوسط جسم بین این دو لحظه چند متر بر مربع ثانیه است؟ (مشابه تمرین ۹۵)

$4\sqrt{2} \quad (4)$


$2\sqrt{5} \quad (3)$

$5 \quad (2)$

$8\sqrt{2} \quad (1)$

برای تعیین شتاب متوسط می‌توئیم از نمودار مکان - زمان استفاده کنیم. هواسمون باشه برای مهاسبه سرعت به شبیه فقط دقت کنیم.

۲۱۰۱☆ نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل است. کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد شتاب متوسط دو متحرک نادرست است؟



(۱) از لحظه شروع بررسی حرکت تا لحظه t_1 ، شتاب متوسط A برابر صفر است.

(۲) از لحظه t_1 تا لحظه t_2 شتاب متوسط B صفر است.

(۳) از لحظه شروع حرکت تا لحظه t_4 شتاب متوسط دو متحرک صفر است.

(۴) گزینه‌های ۲ و ۳


۲۱۰۲ نمودار مکان - زمان حرکت جسمی مطابق شکل رو به رو است. شتاب متوسط جسم بین دو لحظه $t_1 = 0/2\text{s}$ و $t_2 = 0/4\text{s}$ چند متر بر مربع ثانیه است؟

$0/5 \quad (2)$

$0 \quad (1)$

$1 \quad (3)$

۲۱۰۳☆ نمودار مکان - زمان دو جسم A و B مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد مقایسه حرکت دو جسم درست است؟ (برگفته از کتاب درسی)



(آ) از لحظه شروع بررسی حرکت تا لحظه t_1 ، شتاب متوسط دو جسم یک بار صفر شده است.

(ب) شتاب متوسط جسم A از لحظه شروع بررسی حرکت ($t = 0$) تا لحظه t_2 یک بار صفر شده است.

(پ) دو جسم در مدت زمان مشخص شده دو بار در کنار هم و در مبدأ محور قرار گرفته‌اند.

(ت) در مدت زمان $(t_2 - t_1)$ ، سرعت متوسط جسم A مقدار بیش تری از سرعت متوسط جسم B را دارد.

$4 \quad (4)$

$3 \quad (3)$

$2 \quad (2)$

$1 \quad (1)$

۲۱۰۴ نمودار مکان - زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. شتاب متوسط جسم بین دو لحظه $t_1 = 1\text{s}$ و $t_2 = 4\text{s}$ چند سانتی‌متر بر مربع ثانیه است؟

$-\frac{16}{3} \quad (1)$

$+2/5 \quad (4)$

$-2/5 \quad (3)$

۲۱۰۵☆ نمودار مکان - زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل رو به رو است. اندازه شتاب متوسط در بازه زمانی $t_1 = 0/5\text{s}$ تا $t_2 = 1/5\text{s}$ برابر 4m/s^2 است. سرعت در لحظه t_2 چند متر بر ثانیه است؟

$-4 \quad (2)$

$-2 \quad (4)$

$+2 \quad (1)$

$+4 \quad (3)$

۲۱۰۶☆ نمودار مکان - زمان حرکت جسمی در راستای محور x مطابق شکل است. شتاب متوسط از ابتدای حرکت $t = 0$ تا لحظه $t = 6\text{s}$ چند متر بر مربع ثانیه است؟

$-1/25 \quad (1)$

$0/42 \quad (4)$

$1/25 \quad (3)$



(ح) معادله سرعت - زمان

● معادله سرعت - زمان تو ببرسی هر کوت فیلی بهمون کمک می‌کنه، می‌توینیم شتاب، تغییر جهت هر کوت و ... ازش به درست بپاریم.

● ۲۱۰۷. معادله سرعت - زمان متحركی که بر مسیر مستقیم حرکت می‌کند، در SI به صورت $v = 4t - 12$ است. کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

(۱) جسم همواره در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.

(۲) جسم همواره در جهت منفی محور حرکت می‌کند.

(۳) جسم در لحظه $t = 5s$ در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.

● ۲۱۰۸☆. معادله سرعت - زمان جسمی در SI به صورت $v = 4t + 4 - 4t^2$ است. جهت حرکت جسم چند بار تغییر می‌کند؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

● ۲۱۰۹☆. معادله سرعت - زمان حرکت جسمی در مسیر مستقیم به صورت $v = 3t^2 - 12t + 9$ است. اندازه شتاب متوسط متحرك در ثانیه دوم چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) صفر (۲) ۱۲ (۳) ۶ (۴) ۶

● ۲۱۱۰. متحركی در مسیر مستقیم حرکت می‌کند و معادله سرعت - زمان آن در SI به صورت $v = 2t^2 - 4t - 2$ است. شتاب متوسط آن در ۲ ثانیه دوم چند متر بر محدود ثانیه است؟

(۱) ۱ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

● ۲۱۱۱☆. معادله سرعت - زمان حرکت جسمی روی محور x و در SI به صورت $v = 4t^2 - 6t - 6$ است. شتاب متوسط جسم در مدت زمانی که جسم در جهت منفی محور حرکت می‌کند، چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) +۱۶ (۲) +۴ (۳) -۱۶ (۴) -۴

● ۲۱۱۲. معادله سرعت - زمان حرکت جسمی در SI به صورت $v = 2t + \sin \frac{\pi}{4} t$ است. شتاب متوسط جسم در ثانیه دوم حرکت چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) +۱ (۲) -۳ (۳) +۳ (۴) -۱

● ۲۱۱۳☆. معادله سرعت - زمان حرکت جسمی روی خط راست در SI به صورت $v = \frac{\sqrt{t^3}}{\lambda}$ است. شتاب متوسط جسم در مدت ۲ ثانیه پس از تغییر جهت حرکت آن چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) $6\sqrt{3}$ (۲) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (۳) $\frac{3\sqrt{6}}{8}$ (۴) $0/\sqrt{6}$

● ۲۱۱۴. معادله سرعت - زمان حرکت جسمی در SI به صورت $v = -4t^3 + 36$ است. شتاب متوسط جسم در مدت زمانی که جسم در جهت مثبت محور حرکت می‌کند، چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) +۱۲ (۲) +۶ (۳) -۱۲ (۴) -۶

(خ) شتاب لحظه‌ای و نوع حرکت

● تو تستای ابتدایی این بخش یاد می‌گیریم که هر کوت تند یا کند می‌شه و چویت هر کوت په هوری مشخص می‌شه! موافقان باشه علامت شتاب چویت هر کوت رو مشخص نمی‌کنه!

● ۲۱۱۵☆. شکل روبرو، نمودار مکان - زمان جسمی را نشان می‌دهد که در امتداد محور x حرکت می‌کند. در این صورت تندی حرکت رو به است و جسم همواره در جهت محور حرکت می‌کند. (برگفته از کتاب درس)

- (۱) کاهش - مثبت
- (۲) افزایش - مثبت
- (۳) افزایش - منفی

● ۲۱۱۶. چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

(آ) بردار شتاب در هر نقطه از مسیر، بر مسیر حرکت مماس است.

(ب) در صورت تغییر بردار سرعت جسم، حرکت آن شتابدار انجام می‌شود.

(پ) اگر جسمی دارای شتاب باشد، قطعاً حرکت می‌کند.

(ت) یکای شتاب در SI، متر بر مربع ثانیه است.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴


● ۲۱۱۷☆. نمودار مکان - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. کدام یک از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم نادرست است؟ (برگفته از کتاب درس)

(۱) حرکت جسم از لحظه t_1 تا لحظه t_3 ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.

(۲) شتاب متوسط جسم بین دو لحظه t_1 و t_3 برابر صفر است.

(۳) از لحظه شروع حرکت تا لحظه t_1 حرکت تندشونده در جهت مثبت محور است.

(۴) از لحظه t_3 تا لحظه t_5 جسم در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.




۲۱۱۸. معادلهٔ حرکت جسمی که روی محور x حرکت می‌کند در SI به صورت $x = -t^3 + 10t - 16$ است. در بازهٔ زمانی ۶ تا ۷ ثانیه نوع حرکت و (سراسری (یافی فارج از کشیده) ۸۱۴)

جهت حرکت متوجه کدام است؟

- (۱) کندشونده در جهت منفی محور x
- (۲) تندشونده در جهت مثبت محور x

تو تست زیر یاد می‌گیریم په بوری با انها نمودار مکان - زمان علامت شتاب هرکت رو مشخص کنیم.

۲۱۱۹. نمودار مکان - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. کدامیک از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم نادرست است؟



(۱) در لحظه t_1 شتاب حرکت جسم در جهت منفی محور است.


(۲) در لحظه t_2 شتاب و سرعت حرکت جسم صفر است.

(۳) بین دو لحظه t_1 و t_2 ابتدا حرکت جسم تندشونده و سپس کندشونده است.

(۴) بین دو لحظه t_2 و t_3 جسم در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.

د) نمودار سرعت - زمان

۲۱۲۰. شیب نمودار سرعت - زمان برامون مهمه و اطلاعات ثوبی تو بررسی شتاب بومون می‌ده.




نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. نسبت مدت زمانی

که علامت شتاب جسم منفی است، به مدت زمانی که علامت شتاب جسم مثبت است، کدام

گزینه است؟ (برگفته از کتاب درس)

- (۱) $\frac{1}{4}$
- (۲) $\frac{1}{3}$
- (۳) $\frac{1}{2}$
- (۴) $\frac{1}{4}$

۲۱۲۱. نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. چند مورد از عبارت‌های زیر دربارهٔ حرکت جسم نادرست است؟



(آ) علامت بردار مکان جسم در دو ثانیه اول حرکت منفی است.

(ب) در دو ثانیه دوم حرکت، جسم تندشونده در جهت منفی محور حرکت می‌کند.

(پ) در لحظه $t = 2s$ علامت شتاب حرکت جسم تغییر می‌کند.

(ت) علامت شتاب متوسط در مدت زمان ۶ ثانیه مثبت است.

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۲۱۲۲☆. معادلهٔ شتاب - زمان حرکت متوجه کی در SI به صورت $a = 12t - 4$ می‌باشد. اگر متوجه همواره در جهت مثبت محور حرکت کند، در کدامیک از لحظات زیر (بر حسب ثانیه) سرعت متوجه در حال کاهش است؟ (سراسری (یافی فارج از کشیده) ۹۶، با تغییر)

- (۱) ۰/۲
- (۲) ۰/۵
- (۳) ۰/۴
- (۴) ۱/۵

۲۱۲۳☆. معادلهٔ حرکت متوجه کی که روی محور x حرکت می‌کند، در SI به صورت $x = -t^3 + 6t + 20$ است. در کدام فاصلهٔ زمانی برحسب ثانیه، حرکت این متوجه کندشونده است؟ ($t < t$)

- (۱) $t < 3$
- (۲) $t < 4$
- (۳) $6 < t < 2$
- (۴) $3 < t < 6$

۲۱۲۴. نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. در این صورت کدامیک از گزینه‌های زیر در لحظه t نادرست است؟

- (۱) تندی حرکت جسم صفر است.
- (۲) شتاب حرکت جسم صفر است.
- (۳) جهت سرعت حرکت جسم تغییر کرده است.
- (۴) جهت شتاب حرکت جسم تغییر کرده است.

۲۱۲۵☆. نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. در این صورت چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت جسم درست است؟

- (آ) شتاب حرکت جسم چهار بار صفر شده است.
- (ب) علامت شتاب حرکت جسم سه بار تغییر کرده است.


(پ) حرکت جسم بین دو لحظه t_1 تا t_3 همواره کندشونده در جهت منفی محور است.

(ت) علامت بردار مکان جسم بین دو لحظه t_4 و t_5 می‌تواند منفی باشد.

- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۴

۲۱۲۶☆. نمودار سرعت - زمان متوجه کی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. در بازهٔ زمانی بین t_1 و t_2 حرکت متوجه شونده و در محور x است. (سراسری تمدنی ۸۶)

- (۱) کند-جهت مثبت
- (۲) تند-جهت منفی
- (۳) کند-جهت منفی



نمودار سرعت - زمان متغیری که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل است. در چه فاصله

(سیاسی ریاضی ۸۶)

زمانی بردار شتاب متغیر در جهت مثبت محور x است؟

(۱) صفر تا t_1

(۲) صفر تا t_2

(۳) t_2 تا t_3

(۴) t_3 تا t_4

اگر معادله سرعت - زمان رو بهمون دادن، برای بررسی هرگز کافی نمودار سرعت - زمان رو رسم نمی‌شود. پراهمیت‌ترین نمودار تو بررسی هرگز است، سرعت - زمان!!

معادله سرعت - زمان حرکت جسمی در SI به صورت $v = 16 - 4t^2$ است. حرکت این جسم از لحظه شروع بررسی حرکت تا لحظه $t = 8s$ به مدت چند ثانیه تندشونده در جهت مثبت محور است؟

(۱) صفر

(۲) ۶

(۳) ۲

(۴) ۱

معادله سرعت - زمان حرکت جسمی در SI به صورت $v = t^2 - 8t + 15$ است. در مدت زمان ۷ ثانیه، این جسم به مدت ثانیه حرکت کندشونده دارد و به مدت ثانیه در جهت مثبت محور حرکت می‌کند.

(۱) ۳ - ۴

(۲) ۵ - ۴

(۳) ۴ - ۵

(۴) ۴ - ۳

تو نمودار سرعت - زمان هواسمون باشه که برای تعیین نوع هرگز دنبال شیب فقط نریم.

نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل روبرو است. در مدت زمانی که حرکت جسم تندشونده در جهت مثبت محور است، شتاب متوسط آن چند m/s^2 است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

(۱) -۱

(۲) +۱

(۳) -۳

(۴) +۳

نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. شتاب متوسط حرکت آن قبل از لحظه تغییر جهت حرکت است؟

(برگرفته از کتاب درسی)

(۱) $\frac{5}{27}$

(۲) $\frac{2}{3}$

(۳) $\frac{3}{27}$

(۴) $\frac{5}{5}$


نمودار سرعت - زمان حرکت خودرویی بر محور x مطابق شکل مقابل است. اختلاف شتاب حرکت خودرو بین دو لحظه $t = 5s$ و $t = 2s$ چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) ۱۰

(۲) ۵

(۳) ۹

(۴) ۴/۵



نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. از لحظه‌ای که جهت بردار شتاب جسم برای اولین بار تغییر جهت می‌دهد تا لحظه‌ای که برای دومین بار جهت

حرکت جسم تغییر می‌کند، شتاب متوسط چند متر بر مربع ثانیه است؟

(۱) +۸

(۲) $-\frac{5}{2}$

(۳) $+\frac{5}{3}$

(۴) -۸


نمودار سرعت - زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است. از لحظه شروع به حرکت می‌کند مطابق شکل است. از لحظه شروع حرکت تا لحظه $t = 3t$ جهت بردار مکان، شتاب حرکت و

جهت حرکت به ترتیب چند بار تغییر می‌کند؟

(۱) صفر، ۱، ۲

(۲) ۲، ۱، صفر

(۳) ۱، ۱، ۱




نمودار سرعت - زمان متغیری بر مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است. تندی متوسط آن در مدت زمانی که حرکت آن تندشونده در جهت منفی محور است، چند متر بر ثانیه است؟


(۱) ۶

(۲) ۱۲

(۳) ۴

(۴) ۸






۲۱۳۶. شکل رویه‌رو، نمودار سرعت – زمان متحركة است که روی محور x حرکت می‌کند. مسافتی که متحرك در ۵ ثانیه اول پیموده است، چند متر است؟
 (سازمانی ریاضی فارغ‌التحصیلی ۹۸)

۲۱ (۲)

۲۹ (۴)

۱۰ (۱)

۲۵ (۳)




۲۱۳۷. نمودار سرعت – زمان برای سه متحرك مطابق شکل رسم شده است. کدام گزینه در مورد مقایسه مقدار سرعت متوسط متحرك‌ها در بازه زمانی $(t_1 - t_2)$ درست است؟

$$v_{av_B} > v_{av_A} > v_{av_C} \quad (۲)$$

$$v_{av_A} < v_{av_C} < v_{av_B} \quad (۱)$$

$$v_{av_A} = v_{av_C} > v_{av_B} \quad (۴)$$

$$v_{av_A} > v_{av_C} > v_{av_B} \quad (۳)$$




۲۱۳۸. نمودار سرعت – زمان متحركة که در مسیری مستقیم در حرکت است، بهصورت شکل مقابل است. اگر سرعت متوسط متحرك در این ۲۵ ثانیه برابر 10 m/s باشد، بیشینه سرعت متحرك در ضمن حرکت، چند متر بر ثانیه است؟
 (سازمانی تجربی ۹۸)

۲۵ (۲)

۵۰ (۴)

۲ (۱)

۴۰ (۳)




۲۱۳۹. نمودار سرعت – زمان متحركة که بر مسیری مستقیم حرکت می‌کند، بهصورت شکل مقابل است. مسافت پیموده شده توسط این متحرك در بازه زمانی 8 s تا 20 s ، چند متر است؟
 (سازمانی ریاضی ۹۸)

۱۷۶ (۲)

۱۹۲ (۴)

۱۶۰ (۱)

۱۸۰ (۳)




۲۱۴۰. خودرویی روی محور افقی در حال حرکت است. اگر نمودار سرعت – زمان آن مطابق شکل باشد، سرعت متوسط خودرو در مدتی که در جهت منفی محور حرکت می‌کند، چند برابر تندی متوسط آن در کل مدت زمان حرکت است؟

+۱ (۲)

+۲ (۴)

-۱ (۱)

-۲ (۳)




۲۱۴۱. نمودار سرعت – زمان حرکت خودرویی که بر روی خط راست حرکت می‌کند، مطابق شکل است. شتاب متوسط خودرو در مدتی که در جهت منفی محور حرکت می‌کند با شتاب متوسط خودرو در مدتی که در جهت مثبت محور حرکت می‌کند برابر است. در چه لحظه‌ای جهت حرکت خودرو تغییر کرده است؟

۲۸/۸ (۳)

۱۴/۴ (۲)

۵۵/۴ (۱)




۲۱۴۲. نمودار سرعت – زمان متحركة که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط آن در مدت 20 s چند متر بر ثانیه است؟
 (kg)

۲/۵ (۲)

۱۵ (۴)

۰/۵ (۱)

۱۰ (۳)




۱۵ (۴)

۲۱۴۳. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی روی خط راست مطابق شکل است. مقدار جابه‌جاوی جسم در مدت 4 s ثانیه برابر -40 m است. اگر مساحت سطح زیر نمودار در دو ثانیه دوم حرکت برابر 10 m واحد باشد، اختلاف تندی متوسط جسم در مدت زمانی که جسم در جهت منفی محور حرکت می‌کند با سرعت متوسط در مدت زمانی که جسم در جهت مثبت محور حرکت می‌کند، چند متر بر ثانیه است؟

۲۰ (۳)

۳۰ (۲)

۴۰ (۱)



۱۵ (۴)


۲۱۴۴. نمودار سرعت – زمان حرکت خودرویی مطابق شکل است. تندی متوسط خودرو تا لحظه‌ای که جهت حرکت جسم تغییر می‌کند، چند برابر سرعت متوسط جسم در مدت زمانی است که حرکت جسم در جهت مثبت محور بهصورت کندشونده انجام می‌شود؟

۱/۲۵ (۲)


۲/۵ (۴)

۱ (۱)

۰/۸ (۳)



.۲۱۴۵. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. مساحت سطح زیر نمودار در ثانیه دوم حرکت برابر 8 واحد SI است. شتاب متوسط جسم در مدت زمانی که جسم در جهت منفی محور حرکت می‌کند و تندی متوسط آن از لحظه $t_1 = 1s$ تا $t_2 = 4s$ به ترتیب چند واحد SI است؟ (شکل نمودار به صورت یکتابع کسینوسی است).



.۲۱۴۶☆. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. اگر شتاب متوسط از لحظه شروع حرکت تا لحظه $t = 10s$ ، از شتاب حرکت جسم در لحظه شروع حرکت $2m/s^2$ بیشتر باشد، تندی حرکت جسم در لحظه شروع حرکت چند متر بر ثانیه است؟


۶۰ (۴)

۸ - ۴ (۳)

۸ - ۲ (۲)

۴ - ۲ (۱)

.۲۱۴۷. نمودار سرعت – زمان متحركی که بر خط راست حرکت می‌کند مطابق سهیمی شکل مقابل است. شتاب متوسط بین دو لحظه t_1 و t_2 کدام است؟



۴) صفر

-۲۷ (۳)

- $\frac{v}{2}$ (۲)- v (۱)

.۲۱۴۸☆. نمودار سرعت – زمان متحركی بر خط راست مطابق سهیمی شکل مقابل است. کدام گزینه در مورد این متحرك درست است؟

$a_{av(t_1-t_2)} < 0$, $a_{av(t_2)} = 0$

$a_{av(t_1-t_2)} = a_{av(t_2-t_3)}$

$a_{av(t_1-t_3)} = 2a_{(t_2)}$

$a_{av(t_1-t_3)} = a_{(t_2)} = 0$


.۲۱۴۹. نمودار سرعت – زمان متحركی که بر خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل است. شتاب متوسط و سرعت متوسط در بازه زمانی $t_1 = 2s$ تا $t_2 = 4s$ به ترتیب از راست به چپ چند واحد SI است؟

۵ (۲)

۵ (۳)

(۱) صفر، ۵

(۳) صفر، صفر




.۲۱۵۰☆. نمودار سرعت – زمان حرکت دو جسم A و B که بر مسیر مستقیم و از مبدأ محور شروع به حرکت کرده‌اند نشان داده شده است. در لحظه $t = 10s$ فاصله دو جسم از یکدیگر چند متر است؟

۷۵ (۲)

۲/۵ (۴)

۵ (۱)

۳/۵ (۳)




.۲۱۵۱. نمودار سرعت – زمان متحركی که بر روی خط راست حرکت می‌کند مطابق شکل است. مدت زمان لازم برای پیمودن نیمة دوم مسیر چند ثانیه است؟

۴/۷۵ (۲)

۴ (۴)

۳/۲۵ (۱)

۱/۵ (۳)




.۲۱۵۲. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. جسم در لحظه شروع حرکت در فاصله 5 متری سمت چپ مبدأ محور قرار گرفته است و تندی متوسط آن در دو ثانیه اول برابر $5m/s$ می‌باشد. در لحظه‌ای که جهت حرکت جسم تغییر می‌کند بدار مکان آن در SI کدام است؟

$\vec{d} = +19\vec{i}$


$\vec{d} = +21\vec{i}$

$\vec{d} = +23\vec{i}$

$\vec{d} = +29\vec{i}$




.۲۱۵۳. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. تندی متوسط آن در قسمت کندشونده حرکت برابر $10m/s$ و مسافت پیموده شده در این قسمت برابر با مسافت پیموده شده در سه ثانیه اول حرکت است. سرعت متوسط در کل مدت زمان حرکت چند متر بر ثانیه است؟

- $\frac{71}{11}$ (۴)

۵ (۳)


۷/۱ (۲)

 $\frac{50}{11}$ (۱)- $\frac{24}{9}$ (۴)+ $\frac{24}{9}$ (۳)

+ ۵ (۲)

- ۵ (۱)


.۲۱۵۴. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی روی محور X مطابق شکل است. تندی متوسط جسم در مدت زمانی که متحرك به صورت کندشونده در جهت مثبت محور حرکت می‌کند چند برابر سرعت متوسط آن در کل مدت زمان حرکت است؟



۴ (۴)

۲۱۵۵. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی مطابق شکل است. اگر بین دو لحظه $t_1 = 4s$ و $t_2 = 12s$ شتاب متوسط برابر $2m/s^2$ و مسافت پیموده شده در قسمتی که شتاب متوسط منفی است برابر ۱۲ واحد SI باشد، تندی متوسط از لحظه‌ای که جسم تغییر جهت می‌دهد تا لحظهٔ توقف نهایی چند متر بر ثانیه است؟


۱ (۲) ۲ (۳) ۰/۵ (۳)



۴ (۴)

۲۱۵۶. نمودار سرعت – زمان حرکت خودرویی روی خط راست مطابق شکل است. اگر اندازهٔ شتاب متوسط حرکت در قسمت‌های (۱) و (۲) به ترتیب $2m/s^2$ و $1m/s^2$ باشد، تندی متوسط حرکت خودرو در ثانیهٔ آخر حرکت چند متر بر ثانیه است؟


۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۳ (۳)



-۷ (۴)


۲۱۵۷. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی منطبق بر محور X مطابق شکل است. اگر تندی متوسط جسم بین دو لحظه $t_1 = 4s$ و $t_2 = 12s$ برابر $6m/s$ باشد، شتاب متوسط در دو ثانیهٔ اول حرکت چند متر بر مربع ثانیه است؟

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) +۷ (۳)




-۷ (۴)

۲۱۵۸. دو متحرک A و B در یک لحظه و از یک مکان روی محور افقی حرکت می‌کنند. اگر نمودار سرعت – زمان دو متحرک مطابق شکل باشد، در کدام لحظه دو متحرک بیشترین فاصله از یکدیگر را دارند؟

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) t_3 (t_2) t_1 (t_4) t_2 (t_3)

-۷ (۴)

۲۱۵۹. نمودار سرعت – زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند مطابق شکل مقابله است. سرعت متوسط جسم در مدت ۸ ثانیه نشان داده شده چند متر بر ثانیه است؟

۱ (۲) ۲ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) t_3 (t_2) t_1 (t_4) t_2 (t_3)

-۷ (۴)

۲۱۶۰. معادله سرعت – زمان متحرکی در SI به صورت $v = 2t^2 - 12t + 20$ است. کمترین تندی این متحرک، چند متر بر ثانیه است؟

(سراسری ریاضی ۹۷، با تغییر)

۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۲) ۴ (۳) ۰ (۱) صفر

۲۱۶۱. معادله سرعت – زمان جسمی که روی محور X حرکت می‌کند، در SI به صورت $v = 6t - 3t^2$ است. در بازه زمانی بین $t = 0$ تا $t = 2s$ جهت شتاب عوض نمی‌شود.

(سراسری تجربی فارغ از کشیور ۹۰، با تغییر)

۰ ≤ $t \leq 2$

- (۱) جهت شتاب عوض نمی‌شود.
(۲) حرکت ابتدا کندشونده و سپس تندشونده می‌شود.
(۳) جهت حرکت یک بار عوض می‌شود.

۲۱۶۲. معادله سرعت – زمان متحرکی که روی محور X حرکت می‌کند در SI به صورت $v = 200 - 8t^2$ است. کدام گزینه زیر درست است؟

(سراسری ریاضی فارغ از کشیور ۹۱، با تغییر)

- (۱) از صفر تا ۵ ثانیه حرکت تندشونده است.
(۲) حرکت ابتدا در جهت مثبت محور X، سپس در جهت منفی محور X است.

(۱) بزرگی شتاب در حال کاهش است.
(۳) در لحظه $t = 5s$ جهت شتاب تغییر می‌کند.


۲۱۶۳. معادله سرعت – زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند در SI به صورت $v = 6t + 9 - t^3$ است. در مورد حرکت این متحرک کدام گزینه درست نیست؟

(سراسری ریاضی ۹۱، با تغییر)


- (۱) در لحظه $t = 3s$ جهت حرکت عوض می‌شود.
(۲) در بازه زمانی $t = 0$ تا $t = 3s$ حرکت کندشونده و در جهت مثبت محور X است.

(۱) در لحظه $t = 3s$ جهت حرکت عوض می‌شود.
(۳) در بازه زمانی $t = 0$ تا $t = 3s$ بزرگی شتاب در حال کاهش است.


ذ) نمودار شتاب – زمان



۲۱۶۴. نمودار سرعت – زمان حرکت جسمی بر مسیر مستقیم مطابق شکل است. نمودار شتاب – زمان آن کدام گزینه است؟



۲۱۶۵☆ نمودار شتاب – زمان حرکت خودرویی که روی خط راست شروع به حرکت می‌کند مطابق شکل است. نمودار سرعت – زمان آن کدام گزینه است؟



۲۱۶۶ نمودار شتاب – زمان حرکت دو خودروی A و B مطابق شکل است. در مورد مقایسه شتاب متوسط دو خودرو از مبدأ زمان تا لحظه t کدام گزینه درست است؟

- (۱) خودروی A مقدار بیشتری دارد.
 (۲) خودروی B مقدار بیشتری دارد.
 (۳) برای دو خودرو یکسان است.
 (۴) هر سه گزینه می‌تواند درست باشد.
- ۲۱۶۷☆ نمودار شتاب – زمان حرکت متغیری که در مسیر مستقیم حرکت می‌کند به صورت شکل مقابل است، حرکت متحرک در بازه زمانی صفر تا t_۱ چگونه است؟ (سراسری ریاضی فارغ‌التحصیلی ۸۶)

- (۱) تندشونده
 (۲) کندشونده
 (۳) کندشونده سپس تندشونده
 (۴) بستگی به سرعت اولیه دارد.

۲۱۶۸跛 نمودار شتاب – زمان حرکت متغیری که از حالت سکون بر مسیر مستقیم به حرکت درآمده به صورت شکل مقابل است. چند ثانیه پس از لحظه t = ۰ سرعت متحرک صفر می‌شود؟ (kg)

- ۲۰ (۱)
 ۲۴ (۲)
 ۱۶ (۳)

۲۱۶۹ نمودار شتاب – زمان حرکت جسمی که در حال حرکت خلاف جهت منفی محور است مطابق شکل می‌باشد. نوع حرکت جسم در بازه زمانی (t_۱ - t_۲) کدام است؟

- (۱) کندشونده
 (۲) ابتدا کندشونده، سپس تندشونده
 (۳) ابتدا تندشونده، سپس کندشونده

۲۱۷۰☆ معادله شتاب – زمان حرکت جسمی در SI به صورت a = 2t - 4 است. اگر جسم از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد، علامت شتاب حرکت در لحظه t = ۰ تغییر می‌کند و حرکت جسم در دو ثانیه دوم حرکت است.

- (۱) کندشونده t = ۲s
 (۲) کندشونده t = ۴s
 (۳) تندشونده t = ۲s ، تندشونده t = ۴s
 (۴) تندشونده

۲۱۷۱☆ متغیری از حالت سکون در مسیر مستقیم به حرکت درمی‌آید و نمودار شتاب – زمان آن مطابق شکل است. در کدام لحظه بر حسب ثانیه جهت سرعت تغییر می‌کند؟

- ۱۸ (۱)
 ۳ (۲)
 ۹ (۳)

۲۱۷۲跛 خودرویی با سرعت اولیه $\vec{v} = +5 \text{ m/s}$ بر روی محور x در حال حرکت است و بردار شتاب آن بر حسب زمان به صورت $\vec{a} = 2\sin 5^\circ \pi t \hat{i}$ می‌باشد. از لحظه t_۱ = ۰ تا لحظه t_۲ = ۰/۰۳s نوع حرکت جسم چگونه است؟

- (۱) کندشونده
 (۲) تندشونده
 (۳) ابتدا تندشونده و سپس کندشونده

قلمروی دوم: حرکت با سرعت ثابت

(ابتدا درس مربوط به این قسمت را در جلد آموزش مطالعه نمایید.)

۱) مفهوم حرکت با سرعت ثابت

۲۱۷۳ کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد حرکت با سرعت ثابت درست نیست؟
 (۱) جایه‌جایی با زمان متناسب است.
 (۲) حرکت بدون شتاب انجام می‌شود.
 (۳) شتاب حرکت ثابت است.

۲۱۷۴☆ چند مورد از عبارت‌های زیر در مورد حرکت با سرعت ثابت درست است؟


- (۱) مقدار سرعت متوسط و تندی متوسط یکسان است.
 (۲) اگر جسم در جهت ثابت محور حرکت کند، بردار مکان آن ثابت است.
 (۳) در یک بازه زمانی مشخص، نسبت مسافت پیموده شده به جایه‌جایی انجام شده می‌تواند برابر منفی یک باشد.
 (۴) خودرویی منطبق بر محور x، در جهت ثابت محور حرکت می‌کند و جایه‌جایی‌های انجام شده توسط آن در بازه‌های زمانی یکسان برابر است.

- ۱ (۱)
 ۲ (۲)
 ۳ (۳)
 ۴ (۴)

پاسخ فصل



حرکت بر خط راست



طول مسیر پیموده شده با مسافت برابر است. در این صورت داریم:
 $l = h + 20 \Rightarrow 50 = h + 20 \Rightarrow h = 30\text{m}$
 گلوله از نقطه پرتاب تا لحظه برخورد به سطح زمین در جهت منفی محور قائم جابه‌جا شده است. در این صورت بردار جابه‌جای گلوله برابر است با:
 $\vec{d} = -30\hat{j}$

۲۰۰۱

با توجه به شکل مسیر حرکت جسم می‌توان نوشت:


$$\begin{aligned} d &= \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{(-12)^2 + (16)^2} \\ &= \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} \Rightarrow d = 20\text{m} \\ x(\text{m}) &= l = d_1 + d_2 = 12 + 16 = 28\text{m} \end{aligned}$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\frac{1}{d} = \frac{28}{20} = \frac{14}{10} = \frac{7}{5}$$

۲۰۰۲


مسافت، کمیتی نرده‌ای و جابه‌جایی، کمیتی برداری است.
 در این صورت می‌توان نوشت:



$$\left. \begin{aligned} l &= \overline{AB} + \frac{1}{5} \overline{AB} = \frac{6}{5} \overline{AB} \\ d &= AC = \overline{AB} - \frac{1}{5} \overline{AB} = \frac{4}{5} \overline{AB} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{d}{l} = \frac{\frac{4}{5} \overline{AB}}{\frac{6}{5} \overline{AB}} = \frac{2}{3}$$

۲۰۰۳

فرض کنیم دو چرخه‌سوار مسیری مطابق شکل زیر را روی محور x پیموده باشد. اگر نقطه A به عنوان نقطه شروع حرکت، نقطه B مکان تغییر جهت و نقطه C مکان انتهایی مسیر حرکت انتخاب شده باشد، با توجه به مفهوم مسافت و جابه‌جایی داریم:



$$l = l_1 + l_2 \Rightarrow \frac{d}{l} = \frac{|l_1 - l_2|}{l_1 + l_2} = \frac{1}{8} \Rightarrow \frac{l_1 - l_2}{l_1 + l_2} = \pm \frac{1}{8}$$

۱۹۹۷

نکته: برای مشخص کردن بردار مکان کافی است از مبدأ محور، برداری به محل (مکان) جسم رسم کنیم. البته باید توجه داشت که بردار مکان تابع مبدأ محور است و در صورت تغییر آن، بردار مکان نیز تغییر می‌کند. از طرفی جهت حرکت جسم در تعیین بردار مکان تأثیری ندارد و بردار مکان در لحظه رسم می‌شود.

برای رسم بردار مکان، از مبدأ O برای خودروی A و از مبدأ O' برای خودروی B بردارها را رسم می‌کنیم. در این صورت داریم:

$$\begin{aligned} \vec{d}_A &= +10\hat{i} \\ \vec{d}_B &= (-8 - (-2))\hat{i} = -6\hat{i} \end{aligned}$$

۱۹۹۸

(آ) در مکان‌های مثبت علامت بردار مکان مثبت و در مکان‌های منفی علامت بردار مکان منفی است. با توجه به مکان‌های داده شده بردار مکان از مثبت به منفی تغییر علامت داده است. یعنی بردار مکان یک بار تغییر جهت داده است. (درست)

(ب) هنگامی که جسم از مبدأ محور عبور می‌کند مکان جسم $x = 0$ است. در این صورت بردار مکان دارای حداقل مقدار خود می‌شود. (درست)
 پ و ت) با توجه به تغییر علامت مکان خودرو، بردار مکان نمی‌تواند همواره در جهت مثبت یا منفی باشد. (نادرست)

۱۹۹۹

نکته: مسافت، کمیتی عددی است که برای تعیین آن باید شکل مسیر حرکت را ابتدا مشخص کنیم. یعنی برای تعیین مسافت باید به چگونگی شکل حرکت جسم در تغییر مکان بین دو نقطه دقت کنیم.

با توجه به شکل مسیر پیموده شده توسط جسم داریم:
 $l = 15 + 10 + d_3 = 30 \Rightarrow d_3 = 5\text{m} \Rightarrow \vec{d}_3 = +5\hat{j}$
 (تغییر مکان x برای بهتر نشان داده شدن مسیر انتخاب شده است و جسم در محور x جابه‌جایی ندارد).

۲۰۰۰

نکته: جابه‌جایی کمیتی برداری است که برای رسم آن کافی است پاره‌خطی را از نقطه ابتدایی به نقطه انتهایی در حرکت رسم کنیم. باید توجه داشت که بردار جابه‌جایی مستقل از مسیر حرکت جسم است. برای تعیین مسافت پیموده شده شکل مسیر حرکت اهمیت پیدا می‌کند و برای محاسبه آن باید به طور دقیق مسیر حرکت را بررسی کرد.



تست‌های کنکور سراسری ۱۴۰۰ رشته تجربی

۳۷۳۸. نیتوئیم $NP^{۳۷}$ ایزوتوپ ناپایداری است که واپاشی آن از طریق گسیل 3α و یک ذره β^- صورت می‌گیرد. در این واپاشی، هستهٔ نهایی به ترتیب چند نوترون و چند پروتون دارد؟
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰

(۴) ۸۸ و ۱۳۷

(۳) ۸۷ و ۱۳۷

(۲) ۸۸ و ۱۳۶

(۱) ۸۷ و ۱۳۶

نمودار مکان - زمان متحركی مطابق شکل است. تندی متوسط در کدام‌یک از بازه‌های زمانی مشخص شده در گزینه‌ها بیشتر است؟
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰

(۲) صفر تا ۶

(۴) ۶ تا ۱۰

(۱) صفر تا ۲

(۳) ۲ تا ۱۰

نمودار سرعت - زمان متحركی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل، قسمتی از یک سیمه‌ی است. کدام مورد درست است؟
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰

(۱) در بازه صفر تا t_1 تندی در حال کاهش است.(۲) بزرگی شتاب در لحظه صفر و t_2 برابر است.(۳) در بازه صفر تا t_2 شتاب خلاف جهت محور x است.(۴) بزرگی شتاب متوسط در بازه t_1 تا t_2 بیشتر از بزرگی شتاب متوسط در بازه صفر تا t_2 است.

متحركی روی محور x در حال حرکت است. بردار شتاب متوسط آن در بازه زمانی $t_2 = 10s$ برابر \vec{I} و در بازه زمانی $t_1 = 5s$ برابر \vec{I} است. بردار شتاب متوسط آن در بازه زمانی $t_3 = 12s$ برابر \vec{I} تا $t_1 = 5s$ برابر \vec{I} است. بردار شتاب متوسط آن در بازه زمانی $t_3 = 12s$ تا $t_2 = 10s$ برابر \vec{I} است. کدام است؟
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰

(۴) \vec{I} (۳) \vec{I} (۲) $-\frac{16}{7}\vec{I}$ (۱) $-\frac{2}{7}\vec{I}$

نمودار مکان - زمان دو متحرك A و B مطابق شکل است. اگر در لحظه $t = 0$ فاصله دو متحرك ۱۵۰ متر باشد و تندی متحرك A، ۲ برابر تندی متحرك B باشد، فاصله دو متحرك در لحظه $t = 20s$ چند متر است؟
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰

(۲) ۱۰۰

(۴) ۲۰۰

(۱) ۵۰

(۳) ۱۵۰

مطابق شکل، به جسمی به جرم $36kg$ که روی سطح افقی ساکن است، نیروی افقی $F = 177N$ وارد می‌شود و تندی جسم 4 ثانیه پس از شروع حرکت به $3m/s$ می‌رسد. نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، چند نیوتون است؟ ($g = 10m/s^2$)
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰



(۲) ۳۹۰

(۴) ۵۰۰

(۱) ۳۶۰

(۳) ۴۰۰

وزنه‌ای به جرم m را به یک فنر که ثابت آن $k = 200 N/m$ و طول آن $50cm$ است، می‌بندیم و از سقف یک آسانسور ساکن آویزان می‌کنیم. وقتی وزنه ساکن می‌شود، طول فنر به $65cm$ می‌رسد. آسانسور با چه شتابی بر حسب متر بر مربع ثانیه حرکت کند که طول فنر به $60cm$ برسد؟ ($g = 10m/s^2$)
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰


$$\vec{a} = \frac{2}{3} \vec{j}$$

$$\vec{a} = -\frac{2}{3} \vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{1}{3} \vec{j}$$

$$\vec{a} = -\frac{1}{3} \vec{j}$$

در شکل زیر، جسم در آستانه حرکت رو به بالا قرار دارد و نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند، برابر R است. اگر $F = 2N$ کاهش دهیم، نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، برابر R' می‌شود، R' / R کدام است؟ ($g = 10m/s^2$ ، $\mu_k = 0.5$ ، $\mu_s = 0.2$)
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰



$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{2}$$


مطابق شکل، نوسانگری روی محور x حرکت هماهنگ ساده انجام می‌دهد. اگر حداقل زمانی که طول می‌کشد تا نوسانگر از مکان $x_1 = 1cm$ در جهت مثبت محور x عبور کند و به مکان $x_2 = -1cm$ برسد، برابر ۲ ثانیه باشد، انرژی مکانیکی نوسانگر چند میلی‌ژول است؟ ($\pi^3 = 10$)
 (۱) سراسری تجربی - ۱۴۰۰

(۲) ۰/۲

(۴) ۰/۸

(۱) ۰/۱

(۳) ۰/۴





تست‌های کنکور سراسری ۱۴۰۰ رشته ریاضی

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)


۳۷۶۶. کدام موارد درست است؟

- الف) در واپاشی β^- ، الکترون گسیل شده در هسته مادر وجود ندارد و همچنین یکی از الکترون‌های مداری اتم نیست.
 ب) در واپاشی β^+ ، ذره گسیل شده توسط هسته، جرم یکسان با الکترون دارد.
 پ) اغلب هسته‌ها پس از واپاشی بتا، در حالت پایدار قرار می‌گیرند.
 ت) در واپاشی β^+ ، یکی از نوترون‌های درون هسته، به یک پروتون و یک بوزیترون تبدیل می‌شود.

۴) ب و پ

۳) ب و ت

۲) الف و ب



شکل مقابل، نمودار سرعت - زمان متحرکی است که روی محور x حرکت می‌کند. تندی متوسط متحرک در مدتی که در خلاف جهت محور حرکت می‌کند، چند متر بر ثانیه است؟

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

۳۷۶۷

(۱) صفر

(۲) ۶

(۳) ۸

(۴) ۹

۳۷۶۸. متحرکی روی محور x با شتاب ثابت حرکت می‌کند. اگر سرعت متحرک در لحظه $t = 0$ در جهت محور x باشد و بردار سرعت متوسط در ۱۰ ثانیه اول حرکت برابر $\vec{v}_{av} = 7/5 \text{ m/s}$ و تندی متوسط در این بازه $8/5 \text{ m/s}$ باشد، مسافت طی شده در ۲ ثانیه اول حرکت چند متر است؟

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)


۳۵) ۴

۲۵) ۳

۱۵) ۲

۵) ۱

۳۷۶۹. نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل است. جایه‌جایی متحرک در بازه زمانی $s_1 = 0$ تا $t_1 = 8\text{s}$ چند برابر مسافت طی شده در این بازه زمانی است؟



(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

(۱) $\frac{5}{17}$ (۲) $\frac{8}{17}$ (۳) $\frac{9}{14}$ (۴) $\frac{5}{14}$

۳۷۷۰. متحرکی با شتاب ثابت روی محور x حرکت می‌کند و در لحظه‌های $t_1 = 3\text{s}$ و $t_2 = 5\text{s}$ از مبدأ محور عبور می‌کند و در لحظه‌ای که به مکان $-1\text{m} = x$ می‌رسد، جهت حرکتش عوض می‌شود. تندی متوسط متحرک از لحظه $s = t_1 = 5\text{s}$ تا $s = t_2 = 3\text{s}$ چند متر بر ثانیه است؟

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

۶) ۴

۱۷) ۳

۳) ۲

(۱) $\frac{12}{5}$

۳۷۷۱. شکل مقابل، تغییرات نیروی کشسانی سه فنر را بر حسب تغییر طول آن‌ها نشان می‌دهد. اگر نیروی کشسانی $F_e = 30\text{ N}$ طول فنر S_2 را ۴ سانتی‌متر افزایش دهد، طول فنرهای S_1 و S_3 را به ترتیب چند سانتی‌متر افزایش می‌دهد؟

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

(۱) ۶ و ۳

(۲) ۲ و ۹

(۳) ۲ و ۸

۳۷۷۲. چوب مکعب شکلی به جرم 5 kg را به نخی بسته و با نیروی ثابت و افقی 15 N روی سطح افقی می‌کشیم و از حال سکون به حرکت در می‌آوریم و بعد از ۲ ثانیه نخ پاره می‌شود. اگر ضریب اصطکاک جنبشی $\mu = 1/2$ باشد، کل مسافتی که چوب از ابتدای حرکت تا لحظه ایستادن طی می‌کند، چند متر است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

۳) ۴

۲/۵) ۳

۲) ۲

(۱) $1/5$

۳۷۷۳. فنر سبکی با ثابت $m = 200\text{ N/m}$ به سقف آسانسور بسته شده است و از آن وزنه $m = 5\text{ kg}$ آویزان است و آسانسور با شتاب رو به پایین 2 m/s^2 پایین می‌آید و طول فنر L_1 است. وقتی این آسانسور با شتاب 1 m/s^2 کندشونده پایین می‌آید، طول فنر L_2 می‌شود. اختلاف L_2 و L_1 چند سانتی‌متر است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

۲/۵) ۴

۵) ۳

۷/۵) ۲

۱۵) ۱

۳۷۷۴. معادله حرکت نوسانگری در SI به صورت $x = 0.02 \cos \frac{\pi}{2} t$ است. تندی متوسط نوسانگر در بازه زمانی $s = t_2 - t_1 = \frac{25}{12}\text{ s}$ چند سانتی‌متر بر ثانیه است؟

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

۸) ۴

۴) ۳

۲) ۲

(۱) ۱

۳۷۷۵. شکل رو به رو، تصویری از یک موج عرضی در یک ریسمان کشیده شده را در لحظه t_1 نشان می‌دهد. در لحظه $s = t_2 + \frac{9}{400}\text{ s}$ کدام مورد، درست است؟

(۱) تندی ذره B، صفر است.
 (۲) تندی ذره A، بیشینه است.
 (۳) حرکت ذره A، تندشونده است.

(سراسری ریاضی - ۱۴۰۰)

(۲) تندی ذره A، بیشینه است.

(۳) حرکت ذره B، تندشونده است.

- ۳۷۹۷** هواپیمایی به جرم 60 تن با قندی 80 m/s از باند فرودگاه بلند می‌شود و در مدت 600 متری از سطح زمین می‌رسد. در این یک دقیقه، کار نیروی وزن روی هواپیما چند ژول است و انرژی مکانیکی هواپیما چند ژول افزایش می‌یابد؟ ($\text{سراسری ریاضی} - ۱۴۰۰$)

$$\text{۱) } ۹/۳۶ \times 10^8 \quad \text{۲) } ۹/۳۶ \times 10^8 \quad \text{۳) } ۲/۱۶ \times 10^8 \quad \text{۴) } ۹/۳۶ \times 10^8$$

- ۳۷۹۸** در شکل روبرو، دو مایع به حالت تعادل قرار دارند. اگر چگالی آنها $\rho_1 = 1/2\text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 = 1\text{ g/cm}^3$ باشد، فشار پیمانه‌ای گاز چند پاسکال است؟ ($\text{سراسری ریاضی} - ۱۴۰۰$) ($\text{g} = 10\text{ N/kg}$)


$$\text{۱) } ۳۰۰ \quad \text{۲) } ۳۶۰ \quad \text{۳) } ۵۰۰ \quad \text{۴) } ۵۸۰$$

- ۳۷۹۹** اگر در عمق 5 سانتیمتری مایعی، فشار 100 کیلوپاسکال و در عمق 20 سانتیمتری آن فشار 106 کیلوپاسکال باشد، فشار هوا در محیط ($\text{سراسری ریاضی} - ۱۴۰۰$)

$$\text{۱) } ۹۶ \quad \text{۲) } ۹۷ \quad \text{۳) } ۹۸ \quad \text{۴) } ۹۹$$

- ۳۸۰۰** ۲۰ گرم یخ در دمای صفر درجه سلسیوس (نقطه ذوب) قرار دارد. چند ژول گرما لازم است تا آن را ذوب کرده و دمای آب حاصل را به 50°C برساند؟ ($L_F = 236\text{ J/g}$ ، $c = 4200\text{ J/g}^\circ\text{C}$) ($\text{سراسری ریاضی} - ۱۴۰۰$)

$$\text{۱) } ۱0920 \quad \text{۲) } ۹050 \quad \text{۳) } 8190 \quad \text{۴) } 7560$$



پاسخ تست‌های کنکور سراسری ۱۴۰۰

اکنون برای محاسبه شتاب متوسط در بازه زمانی ($t_2 - t_1$) داریم:

$$a_{av} = \frac{v_{t_2} - v_{t_1}}{t_2 - t_1} = \frac{-16}{7} \text{ m/s}^2 \Rightarrow \vec{a}_{av} = -\frac{16}{7} \hat{i}$$

(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۴۲

$x_{B'} - x_A = 150\text{ m}$ با توجه به نمودار می‌توان نوشت:

$$v_A = 2 | v_B | \Rightarrow -\frac{x_A}{\Delta t} = 2 \left(\frac{x_B}{\Delta t} \right) \Rightarrow x_B = -2x_A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_A = -50\text{ m} \\ v_A = 10\text{ m/s} \end{cases}, \quad \begin{cases} x_B = 100\text{ m} \\ v_B = -50\text{ m/s} \end{cases}$$

با استفاده از معادله حرکت با سرعت ثابت داریم:

$$x_A = v_A t + x_{A'} \Rightarrow x_A = 10t - 50$$

$$x_B = v_B t + x_{B'} \Rightarrow x_B = -5t + 100$$

در لحظه $t = 20\text{ s}$ داریم: $t = 20\text{ s}$

$$x_A = 10(20) - 50 = 150\text{ m}$$

$$x_B = -5(20) + 100 = 0$$

$$\Rightarrow x_A - x_B = 150\text{ m}$$

(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۴۳

ابتدا شتاب حرکت جسم را حساب می‌کنیم:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{3 - 0}{4} = \frac{3}{4} \text{ m/s}^2$$

با استفاده از قانون دوم نیوتون داریم:

$$a = \frac{F_{net}}{m} \Rightarrow \frac{3}{4} = \frac{177 - f_k}{36} \Rightarrow f_k = 150\text{ N}$$

برای محاسبه نیروی سطح بر جسم می‌توان نوشت:

$$R = \sqrt{F_N^2 + f_k^2} = \sqrt{(360)^2 + (150)^2} = 30\sqrt{169} = 390\text{ N}$$


(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۴۴

در لحظه‌ای که وزنه ساکن است، داریم:

$$F_e = mg \xrightarrow{F_e = kx} 200 \cdot (0.65 - 0.5) = m \cdot 10 \Rightarrow m = 3\text{ kg}$$

(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۳۸

با گسیل سه ذره α ، عدد جرمی 12 واحد و عدد اتمی 6 واحد کاهش می‌یابد. هم‌چنین با گسیل یک ذره β^- ، عدد اتمی یک واحد افزایش می‌یابد. در این صورت عدد جرمی 12 واحد کاهش و عدد اتمی 5 واحد کاهش خواهد یافت.



(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۳۹

با توجه به نمودار و رابطه محاسبه شتاب متوسط ($s_{av} = \frac{1}{\Delta t}$) مشخص

می‌شود نسبت مسافت پیموده شده به زمان در گزینه (۳) از بقیه بیشتر است.

(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۴۰

(۱) در بازه صفر تا t_1 شتاب در حال افزایش است.

(۲) در لحظه‌های صفر و t_1 ، شیب خط مماس بر نمودار مخالف یکدیگر است و در لحظه t_1 شیب خط مماس بر نمودار صفر است.

(۳) در بازه زمانی صفر تا t_1 شتاب در جهت منفی محور X است.

(۴) شیب خط واصل بین دو لحظه (t_1, t_2) مقدار کمتری از شیب خط واصل بین دو

لحظه (t_1, t_2) دارد.

(۴) (۳) (۲) (۱) ۳۷۴۱

با توجه به رابطه محاسبه شتاب متوسط ($a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$) می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} \frac{v_{t_0} - v_{t_5}}{10 - 5} = -4 \Rightarrow v_{t_0} - v_{t_5} = -20 \\ \frac{v_{t_2} - v_{t_0}}{12 - 10} = 2 \Rightarrow v_{t_2} - v_{t_0} = 4 \end{cases} \xrightarrow{\oplus} v_{t_2} - v_{t_5} = -16$$